# Análisis estadístico.
# Salud
# 2010

Ma. Concepción Valdez Muñiz

El contenido forma parte de los insumos para la elaboración del Informe del estado del desarrollo social del DF, es responsabilidad de los autores y no representa necesariamente la posición de Evalúa DF.

# Introducción

En el marco del proyecto del Informe del Estado de Desarrollo Social del Distrito Federal, para el capítulo de derechos, participación ciudadana y cohesión social, el cual tiene como objetivo: Analizar el desarrollo social de la Ciudad de México –a partir de la orientación de la política social de desarrollo social- en tanto que estrategia para la garantía de los derechos sociales universales, para el fortalecimiento de la cohesión social y el impulso a la participación de la ciudadana y, como consecuencia de estos tres elementos, para la construcción de ciudadanía. Se decidió hacer una búsqueda y selección de información – datos estadísticos- correspondientes a la Salud[1] en el distrito Federal para hacer un análisis cuantitativo sobre el avance en el cumplimiento del derecho.

Las pretensiones de la búsqueda y análisis fueron que el producto resultante sirviera de insumo para complementar el análisis cualitativo realizado a partir del análisis del marco normativo y programático así como los esfuerzos institucionales que realiza el Gobierno del Distrito Federal.

[1]El derecho a la Salud es un derecho social establecido tanto en instrumentos normativos internacionales como en el marco normativo local. La Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal lo coloca como uno de los derechos a los que hay que dar cumplimiento.

# Diseño Metodológico.

Para dar respuesta al objetivo específico: Valorar los avances en cuanto al cumplimiento de derechos en el DF, en particular de salud, educación, vivienda y trabajo, por medio de la medición de algunos indicadores seleccionados, el análisis del desempeño de las instituciones encargadas de garantizarlos y la perspectiva de derechos en los programas de desarrollo social.

Se hizo una búsqueda de información en dos fuentes principales de información:

1. Encuesta Nacional de Salud 2000, (ENSA) elaborada por el Instituto de Salud.
2. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, (ENSANUT) elaborada por el Instituto de Salud.

La búsqueda, organización y presentación de la información se realizó por grupos poblacionales:

1. Niños;
2. Adolescentes y.
3. Adultos.

El trabajo de recopilación se hizo tanto de datos nacionales como de la entidad, con el objetivo de tener un referente de contrastación, sobre el avance que ha tenido el Distrito federal en materia de cumplimiento al derecho. Por tanto se hará el análisis privilegiando los indicadores referentes a la situación de la salud en la Ciudad. También es motivo de interés ponderar aquellas variables que puedan explicar la situación del derecho. Partiendo de estas precisiones mencionaremos aspectos relevantes por cada uno de los grupos poblacionales.

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ..... 2
DISEÑO METODOLÓGICO ..... 3
NIÑOS-ASPECTOS RELEVANTES ..... 10
ATENCIÓN PRENATAL ..... 10
CARTILLA DE VACUNACIÓN ..... 23
ENFERMEDADES ..... 52
DAÑOS A LA SALUD POR ACCIDENTES ..... 64
ADOLESCENTES-ASPECTOS RELEVANTES ..... 65
DEL CONSUMO DE CIGARROS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS ..... 78
VIDA SEXUAL, ANTICONCEPTIVOS Y EMBARAZOS ..... 111
ACCIDENTES Y VIOLENCIA ..... 121
ADULTOS-ASPECTOS RELEVANTES ..... 187
2006 ..... 311
COMPARATIVOS: ..... 313

# PARTE

# I

# NIÑOS

**Distrito Federal. Distribución de mujeres con un hijo menor de un año que recibieron atención prenatal, según el lugar en el que se les proporcionó la atención**

| Lugar de atención | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| IMSS | 40,055 | 35.0 |
| SSA Centro de salud u hospital | 36,858 | 32.2 |
| Gobierno del Distrito Federal | 6,095 | 5.3 |
| ISSSTE | 2,902 | 2.5 |
| Marina /Defensa | 1,451 | 1.3 |
| Consultorio u hospital privado | 19,445 | 17.0 |
| Cruz Roja | 2,902 | 2.5 |
| Otra | 4,644 | 4.1 |
| Total | 114,352 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución de mujeres con un hijo que recibieron atención prenatal, según el lugar en el que se les proporcionó la atención**

| Institución | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| IMSS Sol. | 5,428 | 3.3 |
| IMSS | 55,886 | 33.7 |
| SSA | 45,528 | 27.4 |
| DDF | 1,365 | .8 |
| ISSSTE | 6,602 | 4.0 |
| Marina/Defensa | 1,750 | 1.1 |
| Privado | 47,736 | 28.7 |
| Otra | 1,750 | 1.1 |
| Total | 166,045 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de mujeres con un hijo menor de un año que recibieron atención prenatal, según el lugar en el que se les proporcionó la atención**

| Lugar de atención | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| IMSS Oportunidades | 30,897 | 1.8 |
| IMSS | 429,276 | 25.3 |
| SSA Centro de salud u hospital | 603,950 | 35.7 |
| Seguro Popular de Salud | 67,649 | 4.0 |
| Gobierno del Distrito Federal | 8,466 | .5 |
| ISSSTE Estatal | 19,000 | 1.1 |
| ISSSTE | 14,367 | .8 |
| Marina /Defensa | 2,985 | .2 |
| PEMEX | 2,958 | .2 |
| Consultorio u hospital privado | 375,125 | 22.2 |
| Cruz Roja | 7,821 | .5 |
| Otra | 113,082 | 6.7 |
| No responde | 7,014 | .4 |
| No sabe | 10,897 | .6 |
| Total | 1,693,487 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución de mujeres con un hijo que recibieron atención prenatal, según el lugar en el que se les proporcionó la atención**

| | | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Válidos | IMSS Sol. | 128,926 | 5.8 |
| | IMSS | 598,645 | 27.0 |
| | SSA | 779,948 | 35.1 |
| | DIF | 21,297 | 1.0 |
| | DDF | 3,665 | .2 |
| | INI | 3,768 | .2 |
| | ISSSTE Estatal | 6,920 | .3 |
| | ISSSTE | 40,723 | 1.8 |
| | Marina/Defensa | 8,120 | .4 |
| | PEMEX | 8,641 | .4 |
| | Privado | 541,964 | 24.4 |
| | Cruz Roja | 4,903 | .2 |
| | Otra | 50,386 | 2.3 |
| | No sabe | 3,434 | .2 |
| | No responde | 18,214 | .8 |
| | Total | 2,219,554 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Aspectos Relevantes:**

i. Ha disminuido en un 11.7% las mujeres que recibieron atención prenatal en los períodos de 2000 a 2006 en el sector privado.
ii. Aumentó en el mismo período la atención prenatal en el sector público sobre todo en los Centros de Salud y en hospitales del gobierno del Distrito Federal, el aumento fue de 4.8% y 4.5%, respectivamente en este período.
*iii.* Con respecto a la atención recibida por las mujeres en el sector privado en el 2006, el Distrito Federal, está por arriba en 6.5% con respecto al porcentaje nacional

## *Niños*

## *Atención prenatal*

**Distrito Federal. Distribución de la población de cero a cuatro años, según condición de poseer o no la Cartilla Nacional de Vacunación**

| Condición de posesión | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí, ha visto la cartilla | 482,663 | 77.2 |
| No tiene cartilla | 16,543 | 2.6 |
| Sí, pero no ha visto la cartilla | 126,031 | 20.2 |
| Total | 625,237 | 100.0 |

Fuente:Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Población de cero a cuatro años, según condición de poseer o no la Cartilla Nacional de Vacunación por edad**

| Edad | ha visto la car | No tiene cartilla | Sí, pero no ha visto la cartilla | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 94,905 | 0 | 25,251 | 120,156 |
| 1 | 78,073 | 9,288 | 17,126 | 104,487 |
| 2 | 100,576 | 2,902 | 25,612 | 129,090 |
| 3 | 115,361 | 4,353 | 27,570 | 147,284 |
| 4 | 93,748 | 0 | 30,472 | 124,220 |
| Total | 482,663 | 16,543 | 126,031 | 625,237 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución de la población de cero a cuatro años, según condición de poseer o no la Cartilla Nacional de Vacunación por edad**

| Edad | ha visto la car | No tiene cartilla | Sí, pero no ha visto la cartilla | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 79.0 | 0.0 | 21.0 | 100.0 |
| 1 | 74.7 | 8.9 | 16.4 | 100.0 |
| 2 | 77.9 | 2.2 | 19.8 | 100.0 |
| 3 | 78.3 | 3.0 | 18.7 | 100.0 |
| 4 | 75.5 | 0.0 | 24.5 | 100.0 |
| Total | 77.2 | 2.6 | 20.2 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución de la población de cero a cinco años, según condición de poseer o no la Cartilla Nacional de Vacunación**

| Condición | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mostró CNV | 637,584 | 81.6 |
| Tiene CNV pero no la mostró | 124,909 | 16.0 |
| No tiene CNV | 17,511 | 2.2 |
| No responde | 1,277 | .2 |
| Total | 781,281 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Población de cero a cinco años, según condición de poseer o no la Cartilla Nacional de Vacunación por edad**

| Edad en años | Cartilla Nacional de Vacunación | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mostró CNV | Tiene CNV pero no la mostró | No tiene CNV | No responde | |
| 0 | 143,041 | 26,051 | 5,678 | - | 174,770 |
| 1 | 97,034 | 13,923 | 7,697 | - | 118,654 |
| 2 | 113,830 | 35,822 | - | - | 149,652 |
| 3 | 146,947 | 30,806 | - | - | 177,753 |
| 4 | 133,045 | 18,307 | 4,136 | 1,277 | 156,765 |
| 5 | 3,687 | - | - | - | 3,687 |
| Total | 637,584 | 124,909 | 17,511 | 1,277 | 781,281 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución de Población de cero a cinco años, según condición de poseer o no la Cartilla Nacional de Vacunación por edad**

| Edad en años | Cartilla Nacional de Vacunación | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mostró CNV | Tiene CNV pero no la mostró | No tiene CNV | No responde | |
| 0 | 81.8 | 14.9 | 3.2 | - | 100.0 |
| 1 | 81.8 | 11.7 | 6.5 | - | 100.0 |
| 2 | 76.1 | 23.9 | - | - | 100.0 |
| 3 | 82.7 | 17.3 | - | - | 100.0 |
| 4 | 84.9 | 11.7 | 2.6 | 0.8 | 100.0 |
| 5 | 100.0 | - | - | - | 100.0 |
| Total | 81.6 | 16.0 | 2.2 | 0.2 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de la población de cero a nueve años, según condición de poseer o no la Cartilla Nacional de Vacunación**

| | | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Válidos | Mostró CNV | 9,265,864 | 81.5 |
| | Tiene CNV pero no la mostró | 1,614,773 | 14.2 |
| | No tiene CNV | 405,571 | 3.6 |
| | No responde | 82,767 | .7 |
| | Total | 11,368,975 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Población de cero a nueve años, según condición de poseer o no la Cartilla Nacional de Vacunación por edad**

| Edad en años | Cartilla Nacional de Vacunación | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mostró CNV | Tiene CNV pero no la mostró | No tiene CNV | No responde | |
| 0 | 1,979,558 | 262,463 | 159,032 | 4,588 | 2,405,641 |
| 1 | 1,680,304 | 262,305 | 78,631 | 5,422 | 2,026,662 |
| 2 | 1,811,985 | 324,971 | 35,820 | 9,427 | 2,182,203 |
| 3 | 1,874,229 | 354,872 | 61,440 | 18,897 | 2,309,438 |
| 4 | 1,881,847 | 397,293 | 70,648 | 36,254 | 2,386,042 |
| 5 | 15,910 | 6,568 | - | 3,235 | 25,713 |
| 6 | 6,716 | 3,416 | - | 2,069 | 12,201 |
| 7 | 2,313 | 488 | - | - | 2,801 |
| 8 | 5,050 | 2,397 | - | 628 | 8,075 |
| 9 | 7,952 | - | - | 2,247 | 10,199 |
| Total | 9,265,864 | 1,614,773 | 405,571 | 82,767 | 11,368,975 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de Población de cero a nueve años, según condición de poseer o no la Cartilla Nacional de Vacunación por edad**

| Edad en años | Cartilla Nacional de Vacunación | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mostró CNV | Tiene CNV pero no la mostró | No tiene CNV | No responde | |
| 0 | 82.3 | 10.9 | 6.6 | 0.2 | 100.0 |
| 1 | 82.9 | 12.9 | 3.9 | 0.3 | 100.0 |
| 2 | 83.0 | 14.9 | 1.6 | 0.4 | 100.0 |
| 3 | 81.2 | 15.4 | 2.7 | 0.8 | 100.0 |
| 4 | 78.9 | 16.7 | 3.0 | 1.5 | 100.0 |
| 5 | 61.9 | 25.5 | - | 12.6 | 100.0 |
| 6 | 55.0 | 28.0 | - | 17.0 | 100.0 |
| 7 | 82.6 | 17.4 | - | - | 100.0 |
| 8 | 62.5 | 29.7 | - | 7.8 | 100.0 |
| 9 | 78.0 | - | - | 22.0 | 100.0 |
| Total | 81.5 | 14.2 | 3.6 | 0.7 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de la población de cero a cuatro años, según condición de poseer o no la Cartilla Nacional de Vacunación**

| Condición de posesión | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí, ha visto la cartilla | 7,933,815 | 83.3 |
| No tiene cartilla | 238,352 | 2.5 |
| Sí, pero no ha visto la cartilla | 1,339,993 | 14.1 |
| No responde | 6,386 | .1 |
| No sabe | 9,936 | .1 |
| Total | 9,528,482 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Población de cero a cuatro años, según condición de poseer o no la Cartilla Nacional de Vacunación por edad**

| Edad | ha visto la ca | No tiene cartilla | Sí, pero no ha visto la cartilla | No responde | No sabe | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,427,317 | 62,441 | 239,544 | 0 | 2,838 | 1,732,140 |
| 1 | 1,515,116 | 45,024 | 224,489 | 924 | 2,643 | 1,788,196 |
| 2 | 1,592,620 | 30,590 | 276,061 | 2,292 | 483 | 1,902,046 |
| 3 | 1,714,235 | 52,704 | 289,656 | 0 | 1,910 | 2,058,505 |
| 4 | 1,684,527 | 47,593 | 310,243 | 3,170 | 2,062 | 2,047,595 |
| Total | 7,933,815 | 238,352 | 1,339,993 | 6,386 | 9,936 | 9,528,482 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución de población de cero a cuatro años, según condición de poseer o no la Cartilla Nacional de Vacunación por edad**

| Edad | Sí, ha visto la cartilla | No tiene cartilla | Sí, pero no ha visto la cartilla | No responde | No sabe | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 82.4 | 3.6 | 13.8 | 0.0 | 0.2 | 100.0 |
| 1 | 84.7 | 2.5 | 12.6 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 2 | 83.7 | 1.6 | 14.5 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |
| 3 | 83.3 | 2.6 | 14.1 | 0.0 | 0.1 | 100.0 |
| 4 | 82.3 | 2.3 | 15.2 | 0.2 | 0.1 | 100.0 |
| Total | 83.3 | 2.5 | 14.1 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Aspectos relevantes:**

i. En 2006, el 2.6% de los niños de cero a tres años no poseían una cartilla de vacunación; aunque disminuye este porcentaje a 0 al llegar a los cuatro años
ii. En el mismo año el 20.2%, asegura tenerla, pero no la ha visto.
iii. Con respecto al comparativo entre 2000 y 2006, hubo una variación en el Distrito Federal sobre posesión de cartilla de vacunación, pasó de 2.2% al 2.6%
iv. Comparando el Distrito Federal con respecto al porcentaje nacional, sobre posesión de cartilla de vacunación, el DF aumentó en relación a los que no poseían dicho documento, mientras, que a nivel nacional, si hubo una disminución en los períodos de 2000 y 2006, de 3.6% a 2.5%, un 1% que no se reflejó en la Ciudad.

## *Niños*

## *Cartilla de Vacunación*

**Distrito Federal. Proporción de niños que manifestaron algún problema de salud en las últimas dos semanas previas a la encuesta**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 296,626 | 23.31 |
| No | 975,910 | 76.69 |
| Total | 1,272,536 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de niños que describen cuál fue el último problema de salud que tuvo en las últimas dos semanas previas a la encuesta**

| Problemas de Salud | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Infecciones respiratorias | 149,769 | 50.5 |
| Neumonía o Bronconeumonía | 3,193 | 1.1 |
| Tos, catarro, dolor de garganta | 105,790 | 35.7 |
| Asma | 1,742 | .6 |
| Diarrea | 20,605 | 6.9 |
| Otro problema | 15,527 | 5.2 |
| Total | 296,626 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Número de niños que describen cuál fue el último problema de salud que tuvo en las últimas dos semanas previas a la encuesta, por edad y sexo**

| Sexo | | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 0 a 4 años | 5 a 9 años | |
| Hombre | Infecciones respiratorias | 64,145 | 16,834 | 80,979 |
| | Neumonía o Bronconeumonía | 1,742 | 1,451 | 3,193 |
| | Tos, catarro, dolor de garganta | 27,574 | 30,041 | 57,615 |
| | Diarrea | 7,255 | 0 | 7,255 |
| | Otro problema | 2,902 | 6,530 | 9,432 |
| | Total | 103,618 | 54,856 | 158,474 |
| Mujer | Infecciones respiratorias | 47,311 | 21,479 | 68,790 |
| | Tos, catarro, dolor de garganta | 28,295 | 19,880 | 48,175 |
| | Asma | 0 | 1,742 | 1,742 |
| | Diarrea | 13,350 | 0 | 13,350 |
| | Otro problema | 4,353 | 1,742 | 6,095 |
| | Total | 93,309 | 44,843 | 138,152 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de niños que manifestaron algún problema de salud en las últimas dos semanas previas a la encuesta**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 3,191,813 | 15.8 |
| No | 17,015,271 | 84.2 |
| No responde | 4,508 | .0 |
| No sabe | 2,383 | .0 |
| Total | 20,213,975 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de niños que manifestaron algún problema de salud en las últimas dos semanas previas a la encuesta**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 3,191,813 | 15.8 |
| No | 17,015,271 | 84.2 |
| No responde | 4,508 | .0 |
| No sabe | 2,383 | .0 |
| Total | 20,213,975 | 100.0 |

Fuente: Dirección de Estadísticas DF con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de niños que describen cuál fue el último problema de salud que tuvo en las últimas dos semanas previas a la encuesta**

| Problemas de Salud | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Infecciones respiratorias | 1,179,936 | 5.8 |
| Neumonía o Bronconeumonía | 28,396 | .1 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva cronica (bronquitis crónica | 10,249 | .1 |
| Cáncer o tumores malignos | 411 | .0 |
| Tos, catarro, dolor de garganta | 1,312,670 | 6.5 |
| Tuberculosis | 444 | .0 |
| Enfermedades de corazón | 5,221 | .0 |
| Fiebre reumatica | 2,130 | .0 |
| Infección de oido | 11,654 | .1 |
| Conjuntivitis | 7,888 | .0 |
| Asma | 21,947 | .1 |
| Diarrea | 180,278 | .9 |
| Enfermedades renales | 3,692 | .0 |
| Infección de vías urinarias | 9,159 | .0 |
| Gastritis o úlcera gástrica | 1,237 | .0 |
| Colitis | 1,529 | .0 |
| Parasitosis intestinal | 12,880 | .1 |
| Obesidad | 125 | .0 |
| Dolor de cabeza o cefalea sin otra manisfestación | 20,210 | .1 |
| Fiebre sin otra manofestación | 20,383 | .1 |
| Enfermedad exantematica (varicela, rubéola, escarlatina) | 13,706 | .1 |
| Hepatitis | 4,676 | .0 |
| Alergias | 34,684 | .2 |
| Problemas de la piel | 16,559 | .1 |
| Enfermedad bucodental | 18,442 | .1 |
| Dengue | 5,391 | .0 |
| Intoxicación por veneno de alacrán, serpiente, araña | 600 | .0 |
| Lesión física por accidente | 37,731 | .2 |
| Lesión física por agresión | 534 | .0 |
| Estrés | 767 | .0 |
| Susto, empacho, mal de ojo o aire | 1,130 | .0 |
| Otro problema | 216,948 | 1.1 |
| No especificado | 2,821 | .0 |
| Total | 3,184,428 | 15.8 |

Fuente:Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Número de niños que describen cuál fue el último problema de salud que tuvo en las últimas dos semanas previas a la encuesta, por edad y sexo**

| Problemas de Salud | Grupos quinquenales | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 a 4 años | | 5 a 9 años | | | |
| | HOMBRE | MUJER | HOMBRE | MUJER | HOMBRE | MUJER |
| Infecciones respiratorias | 340,247 | 356,132 | 240,851 | 242,706 | 581,098 | 598,838 |
| Neumonía o Bronconeumonía | 13,750 | 3,457 | 8,991 | 2,198 | 22,741 | 5,655 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva cronica (bronquitis crónica | 3,167 | 3,026 | 2,610 | 1,446 | 5,777 | 4,472 |
| Cáncer o tumores malignos | | 411 | | - | | 411 |
| Tos, catarro, dolor de garganta | 340,057 | 366,705 | 326,747 | 279,161 | 666,804 | 645,866 |
| Tuberculosis | | - | | 444 | | 444 |
| Enfermedades de corazón | 214 | 108 | 73 | 4,826 | 287 | 4,934 |
| Fiebre reumatica | 1,166 | - | 317 | 647 | 1,483 | 647 |
| Infección de oido | 7,182 | 314 | 1,965 | 2,193 | 9,147 | 2,507 |
| Conjuntivitis | 3,350 | 1,128 | - | 3,410 | 3,350 | 4,538 |
| Asma | 3,543 | 411 | 14,688 | 3,305 | 18,231 | 3,716 |
| Diarrea | 81,396 | 66,356 | 20,475 | 12,051 | 101,871 | 78,407 |
| Enfermedades renales | 1,644 | - | 287 | 1,761 | 1,931 | 1,761 |
| Infección de vías urinarias | 1,214 | 826 | 4,673 | 2,446 | 5,887 | 3,272 |
| Gastritis o úlcera gástrica | 363 | - | 471 | 403 | 834 | 403 |
| Colitis | - | - | 1,260 | 269 | 1,260 | 269 |
| Parasitosis intestinal | 2,682 | 6,040 | 633 | 3,525 | 3,315 | 9,565 |
| Obesidad | - | | 125 | | 125 | |
| Dolor de cabeza o cefalea sin otra manisfestación | 843 | 422 | 8,458 | 10,487 | 9,301 | 10,909 |
| Fiebre sin otra manofestación | 10,371 | 4,759 | 918 | 4,335 | 11,289 | 9,094 |
| Enfermedad exantematica (varicela, rubéola, escarlatina) | 2,464 | 3,492 | 6,398 | 1,352 | 8,862 | 4,844 |
| Hepatitis | - | 1,852 | 1,830 | 994 | 1,830 | 2,846 |
| Alergias | 17,010 | 6,801 | 7,611 | 3,262 | 24,621 | 10,063 |
| Problemas de la piel | 2,530 | 3,152 | 5,990 | 4,887 | 8,520 | 8,039 |
| Enfermedad bucodental | - | 2,678 | 11,316 | 4,448 | 11,316 | 7,126 |
| Dengue | - | 1,750 | 1,585 | 2,056 | 1,585 | 3,806 |
| Intoxicación por veneno de alacrán, serpiente, araña | 600 | | - | | 600 | |
| Lesión física por accidente | 5,566 | 7,266 | 13,477 | 11,422 | 19,043 | 18,688 |
| Lesión física por agresión | 131 | | 403 | | 534 | |
| Estrés | - | | 767 | | 767 | |
| Susto, empacho, mal de ojo o aire | 158 | - | - | 972 | 158 | 972 |
| Otro problema | 61,752 | 52,663 | 57,665 | 44,868 | 119,417 | 97,531 |
| No especificado | | 952 | | 1,869 | | 2,821 |
| Total | 901,400 | 890,701 | 740,584 | 651,743 | 1,641,984 | 1,542,444 |

Fuente: Elaboración propia DF con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de niños que describen cuál fue el último problema de salud que tuvo en las últimas dos semanas previas a la encuesta, por edad y sexo**

| Problemas de Salud | Grupos quinquenales | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 a 4 años | | 5 a 9 años | | | |
| | HOMBRE | MUJER | HOMBRE | MUJER | HOMBRE | MUJER |
| Infecciones respiratorias | 58.6 | 59.5 | 41.4 | 40.5 | 35.4 | 38.8 |
| Neumonía o Bronconeumonía | 60.5 | 61.1 | 39.5 | 38.9 | 1.4 | 0.4 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva cronica (bronquitis crónica | 54.8 | 67.7 | 45.2 | 32.3 | 0.4 | 0.3 |
| Cáncer o tumores malignos | - | 100.0 | - | - | - | 0.0 |
| Tos, catarro, dolor de garganta | 51.0 | 56.8 | 49.0 | 43.2 | 40.6 | 41.9 |
| Tuberculosis | - | - | - | 100.0 | - | 0.0 |
| Enfermedades de corazón | 74.6 | 2.2 | 25.4 | 97.8 | 0.0 | 0.3 |
| Fiebre reumatica | 78.6 | - | 21.4 | 100.0 | 0.1 | 0.0 |
| Infección de oido | 78.5 | 12.5 | 21.5 | 87.5 | 0.6 | 0.2 |
| Conjuntivitis | 100.0 | 24.9 | - | 75.1 | 0.2 | 0.3 |
| Asma | 19.4 | 11.1 | 80.6 | 88.9 | 1.1 | 0.2 |
| Diarrea | 79.9 | 84.6 | 20.1 | 15.4 | 6.2 | 5.1 |
| Enfermedades renales | 85.1 | - | 14.9 | 100.0 | 0.1 | 0.1 |
| Infección de vías urinarias | 20.6 | 25.2 | 79.4 | 74.8 | 0.4 | 0.2 |
| Gastritis o úlcera gástrica | 43.5 | - | 56.5 | 100.0 | 0.1 | 0.0 |
| Colitis | - | - | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 0.0 |
| Parasitosis intestinal | 80.9 | 63.1 | 19.1 | 36.9 | 0.2 | 0.6 |
| Obesidad | - | - | 100.0 | - | 0.0 | - |
| Dolor de cabeza o cefalea sin otra manisfestación | 9.1 | 3.9 | 90.9 | 96.1 | 0.6 | 0.7 |
| Fiebre sin otra manofestación | 91.9 | 52.3 | 8.1 | 47.7 | 0.7 | 0.6 |
| Enfermedad exantematica (varicela, rubéola, escarlatina) | 27.8 | 72.1 | 72.2 | 27.9 | 0.5 | 0.3 |
| Hepatitis | - | 65.1 | 100.0 | 34.9 | 0.1 | 0.2 |
| Alergias | 69.1 | 67.6 | 30.9 | 32.4 | 1.5 | 0.7 |
| Problemas de la piel | 29.7 | 39.2 | 70.3 | 60.8 | 0.5 | 0.5 |
| Enfermedad bucodental | - | 37.6 | 100.0 | 62.4 | 0.7 | 0.5 |
| Dengue | - | 46.0 | 100.0 | 54.0 | 0.1 | 0.2 |
| Intoxicación por veneno de alacrán, serpiente, araña | 100.0 | - | - | - | 0.0 | - |
| Lesión física por accidente | 29.2 | 38.9 | 70.8 | 61.1 | 1.2 | 1.2 |
| Lesión física por agresión | 24.5 | - | 75.5 | - | 0.0 | - |
| Estrés | - | - | 100.0 | - | 0.0 | - |
| Susto, empacho, mal de ojo o aire | 100.0 | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.1 |
| Otro problema | 51.7 | 54.0 | 48.3 | 46.0 | 7.3 | 6.3 |
| No especificado | - | 33.7 | - | 66.3 | - | 0.2 |
| Total | 54.9 | 57.7 | 45.1 | 42.3 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia DF con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Porcentaje de la población menor de cinco años que presentó enfermedad diarreica durante las últimas dos semanas previas a la entrevista**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 104,773 | 16.8 |
| No | 520,464 | 83.2 |
| Total | 625,237 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Población menor de cinco años que presentó enfermedad diarreica durante las últimas dos semanas previas a la entrevista, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | MUJER | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 0 | 6,095 | 50,499 | 56,594 | 22,347 | 41,215 | 63,562 |
| 1 | 20,896 | 31,344 | 52,240 | 8,706 | 43,541 | 52,247 |
| 2 | 6,095 | 53,992 | 60,087 | 10,448 | 58,555 | 69,003 |
| 3 | 14,512 | 68,348 | 82,860 | 4,353 | 60,071 | 64,424 |
| 4 | 6,968 | 53,259 | 60,227 | 4,353 | 59,640 | 63,993 |
| Total | 54,566 | 257,442 | 312,008 | 50,207 | 263,022 | 313,229 |

Fuente: Elaboración propia DF con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Porcentaje de la población menor de cinco años que presentó enfermedad diarreica durante las últimas dos semanas previas a la entrevista, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | MUJER | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 0 | 10.8 | 89.2 | 100.0 | 35.2 | 64.8 | 100.0 |
| 1 | 40.0 | 60.0 | 100.0 | 16.7 | 83.3 | 100.0 |
| 2 | 10.1 | 89.9 | 100.0 | 15.1 | 84.9 | 100.0 |
| 3 | 17.5 | 82.5 | 100.0 | 6.8 | 93.2 | 100.0 |
| 4 | 11.6 | 88.4 | 100.0 | 6.8 | 93.2 | 100.0 |
| Total | 17.5 | 82.5 | 100.0 | 16.0 | 84.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Porcentaje de la población menor de seis años que presentó enfermedad diarreica durante las últimas dos semanas previas a la entrevista**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 96,314 | 12.3 |
| No | 684,967 | 87.7 |
| Total | 781,281 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Población menor de seis años que presentó enfermedad diarreica durante las últimas dos semanas previas a la entrevista, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | MUJER | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 0 | 1,365 | 77,419 | 78,784 | 8,859 | 87,127 | 95,986 |
| 1 | 11,287 | 43,714 | 55,001 | 4,391 | 59,262 | 63,653 |
| 2 | 4,935 | 79,046 | 83,981 | 17,041 | 48,630 | 65,671 |
| 3 | 9,923 | 79,459 | 89,382 | 15,194 | 73,177 | 88,371 |
| 4 | 11,412 | 73,074 | 84,486 | 11,907 | 60,372 | 72,279 |
| 5 | - | 3,687 | 3,687 | | | |
| Total | 38,922 | 356,399 | 395,321 | 57,392 | 328,568 | 385,960 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución de Población menor de seis años que presentó enfermedad diarreica durante las últimas dos semanas previas a la entrevista, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | MUJER | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 0 | 1.7 | 98.3 | 100.0 | 9.2 | 90.8 | 100.0 |
| 1 | 20.5 | 79.5 | 100.0 | 6.9 | 93.1 | 100.0 |
| 2 | 5.9 | 94.1 | 100.0 | 25.9 | 74.1 | 100.0 |
| 3 | 11.1 | 88.9 | 100.0 | 17.2 | 82.8 | 100.0 |
| 4 | 13.5 | 86.5 | 100.0 | 16.5 | 83.5 | 100.0 |
| 5 | - | 100.0 | 100.0 | | | |
| Total | 9.8 | 90.2 | 100.0 | 14.9 | 85.1 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Porcentaje de la población menor de cinco años que presentó enfermedad diarreica durante las últimas dos semanas previas a la entrevista**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 1,225,233 | 6.1 |
| No | 8,294,377 | 41.0 |
| No . | 6,210 | .0 |
| No sabe | 2,662 | .0 |
| Total | 9,528,482 | 47.1 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Porcentaje de la población menor de cinco años que presentó enfermedad diarreica durante las últimas dos semanas previas a la entrevista, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | | | MUJER | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | No responde | No sabe | Total | Sí | No | No responde | No sabe | Total |
| 0 | 15.9 | 84.0 | - | 0.1 | 100.0 | 17.5 | 82.5 | - | - | 100.0 |
| 1 | 20.1 | 79.8 | 0.2 | - | 100.0 | 19.8 | 80.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 2 | 14.4 | 85.6 | - | - | 100.0 | 10.9 | 89.0 | - | 0.1 | 100.0 |
| 3 | 11.7 | 88.2 | - | 0.0 | 100.0 | 8.6 | 91.4 | - | - | 100.0 |
| 4 | 6.3 | 93.4 | 0.2 | 0.1 | 100.0 | 6.2 | 93.7 | 0.1 | - | 100.0 |
| Total | 13.4 | 86.5 | 0.1 | 0.0 | 100.0 | 12.3 | 87.6 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Porcentaje de la población menor de 10 años que presentó enfermedad diarreica durante las últimas dos semanas previas a la entrevista**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 1,317,950 | 11.6 |
| No | 9,990,983 | 87.8 |
| No sabe | 503 | .0 |
| No responde | 66,843 | .6 |
| Total | 11,376,279 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de Población menor de 10 años que presentó enfermedad diarreica durante las últimas dos semanas previas a la entrevista, por edad y sexo**

| Edad | Hombre | | | | Mujer | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Si | No | No responde | Total | Si | No | No sabe | No responde | Total |
| 0 | 14.4 | 85.5 | 0.0 | 100.0 | 13.7 | 86.2 | 0.0 | 0.1 | 100.0 |
| 1 | 17.5 | 82.2 | 0.3 | 100.0 | 18.7 | 81.2 | - | 0.1 | 100.0 |
| 2 | 12.5 | 87.4 | 0.1 | 100.0 | 12.9 | 86.7 | 0.0 | 0.3 | 100.0 |
| 3 | 7.4 | 92.2 | 0.4 | 100.0 | 9.2 | 90.3 | - | 0.6 | 100.0 |
| 4 | 5.8 | 93.1 | 1.1 | 100.0 | 6.1 | 91.9 | - | 1.9 | 100.0 |
| 5 | - | 94.0 | 6.0 | 100.0 | - | 76.2 | - | 23.8 | 100.0 |
| 6 | - | 75.5 | 24.5 | 100.0 | - | 100.0 | - | - | 100.0 |
| 7 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | - | 100.0 |
| 8 | - | 56.2 | 43.8 | 100.0 | 36.5 | 63.5 | - | - | 100.0 |
| 9 | - | 65.3 | 34.7 | 100.0 | - | 100.0 | - | - | 100.0 |
| Total | 11.3 | 88.2 | 0.5 | 100.0 | 11.9 | 87.4 | 0.0 | 0.7 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Porcentaje de la población menor de 10 años que presentó enfermedad respiratoria aguda durante las dos semanas previas a la entrevista**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 655,354 | 51.5 |
| No | 611,956 | 48.1 |
| No responde | 5,226 | .4 |
| Total | 1,272,536 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Porcentaje de la población menor de 10 años que presentó enfermedad respiratoria aguda durante las dos semanas previas a la entrevista, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | | MUJER | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | No responde | Total | Sí | No | Total |
| 0 | 70.3 | 29.7 | - | 100.0 | 49.3 | 50.7 | 100.0 |
| 1 | 73.9 | 26.1 | - | 100.0 | 53.9 | 46.1 | 100.0 |
| 2 | 73.4 | 26.6 | - | 100.0 | 52.6 | 47.4 | 100.0 |
| 3 | 59.5 | 40.5 | - | 100.0 | 62.8 | 37.2 | 100.0 |
| 4 | 55.7 | 44.3 | - | 100.0 | 63.3 | 36.7 | 100.0 |
| 5 | 46.6 | 43.2 | 10.2 | 100.0 | 48.2 | 51.8 | 100.0 |
| 6 | 42.4 | 57.6 | - | 100.0 | 46.3 | 53.7 | 100.0 |
| 7 | 61.3 | 38.7 | - | 100.0 | 34.4 | 65.6 | 100.0 |
| 8 | 32.0 | 68.0 | - | 100.0 | 46.4 | 53.6 | 100.0 |
| 9 | 30.0 | 70.0 | - | 100.0 | 35.7 | 64.3 | 100.0 |
| Total | 53.5 | 45.7 | 0.8 | 100.0 | 49.6 | 50.4 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Porcentaje de la población menor de seis años que presentó enfermedad respiratoria aguda durante las dos semanas previas a la entrevista**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 221,667 | 28.4 |
| No | 559,614 | 71.6 |
| Total | 781,281 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Población menor de seis años que presentó enfermedad respiratoria aguda durante las dos semanas previas a la entrevista, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | MUJER | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 0 | 21,343 | 57,441 | 78,784 | 18,209 | 77,777 | 95,986 |
| 1 | 17,113 | 37,888 | 55,001 | 20,781 | 42,872 | 63,653 |
| 2 | 18,888 | 65,093 | 83,981 | 29,838 | 35,833 | 65,671 |
| 3 | 24,488 | 64,894 | 89,382 | 13,208 | 75,163 | 88,371 |
| 4 | 32,299 | 52,187 | 84,486 | 21,813 | 50,466 | 72,279 |
| 5 | 3,687 | - | 3,687 | | | |
| Total | 117,818 | 277,503 | 395,321 | 103,849 | 282,111 | 385,960 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución de Población menor de seis años que presentó enfermedad respiratoria aguda durante las dos semanas previas a la entrevista, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | MUJER | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 0 | 27.1 | 72.9 | 100.0 | 19.0 | 81.0 | 100.0 |
| 1 | 31.1 | 68.9 | 100.0 | 32.6 | 67.4 | 100.0 |
| 2 | 22.5 | 77.5 | 100.0 | 45.4 | 54.6 | 100.0 |
| 3 | 27.4 | 72.6 | 100.0 | 14.9 | 85.1 | 100.0 |
| 4 | 38.2 | 61.8 | 100.0 | 30.2 | 69.8 | 100.0 |
| 5 | 100.0 | - | 100.0 | | | |
| Total | 29.8 | 70.2 | 100.0 | 26.9 | 73.1 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Porcentaje de la población menor de 10 años que presentó enfermedad respiratoria aguda durante las dos semanas previas a la entrevista**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 8,622,655 | 42.7 |
| No | 11,569,943 | 57.2 |
| No | 14,471 | .1 |
| No sabe | 6,906 | .0 |
| Total | 20,213,975 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Población menor de 10 años que presentó enfermedad respiratoria aguda durante las dos semanas previas a la entrevista, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | | | MUJER | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | No responde | No sabe | Total | Sí | No | No responde | No sabe | Total |
| 0 | 459,405 | 447,794 | - | 685 | 907,884 | 383,134 | 441,122 | - | - | 824,256 |
| 1 | 434,432 | 442,099 | 924 | 3,378 | 880,833 | 459,728 | 446,389 | 1,246 | - | 907,363 |
| 2 | 422,768 | 549,412 | - | - | 972,180 | 459,572 | 470,294 | - | - | 929,866 |
| 3 | 475,627 | 577,090 | - | - | 1,052,717 | 473,052 | 532,736 | - | - | 1,005,788 |
| 4 | 454,040 | 582,438 | 2,464 | - | 1,038,942 | 448,389 | 560,264 | - | - | 1,008,653 |
| 5 | 485,540 | 631,270 | 5,226 | 623 | 1,122,659 | 452,761 | 659,986 | - | - | 1,112,747 |
| 6 | 460,524 | 560,216 | 206 | - | 1,020,946 | 410,039 | 635,806 | - | - | 1,045,845 |
| 7 | 383,880 | 640,153 | - | - | 1,024,033 | 380,168 | 584,441 | - | - | 964,609 |
| 8 | 416,515 | 643,921 | - | - | 1,060,436 | 400,915 | 710,445 | - | - | 1,111,360 |
| 9 | 336,880 | 768,799 | - | - | 1,105,679 | 425,286 | 685,268 | 4,405 | 2,220 | 1,117,179 |
| Total | 4,329,611 | 5,843,192 | 8,820 | 4,686 | 10,186,309 | 4,293,044 | 5,726,751 | 5,651 | 2,220 | 10,027,666 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Porcentaje de la población menor de 10 años que presentó enfermedad respiratoria aguda durante las dos semanas previas a la entrevista, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | | | MUJER | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | No responde | No sabe | Total | Sí | No | No responde | No sabe | Total |
| 0 | 50.6 | 49.3 | - | 0.1 | 100.0 | 46.5 | 53.5 | - | - | 100.0 |
| 1 | 49.3 | 50.2 | 0.1 | 0.4 | 100.0 | 50.7 | 49.2 | 0.1 | - | 100.0 |
| 2 | 43.5 | 56.5 | - | - | 100.0 | 49.4 | 50.6 | - | - | 100.0 |
| 3 | 45.2 | 54.8 | - | - | 100.0 | 47.0 | 53.0 | - | - | 100.0 |
| 4 | 43.7 | 56.1 | 0.2 | - | 100.0 | 44.5 | 55.5 | - | - | 100.0 |
| 5 | 43.2 | 56.2 | 0.5 | 0.1 | 100.0 | 40.7 | 59.3 | - | - | 100.0 |
| 6 | 45.1 | 54.9 | 0.0 | - | 100.0 | 39.2 | 60.8 | - | - | 100.0 |
| 7 | 37.5 | 62.5 | - | - | 100.0 | 39.4 | 60.6 | - | - | 100.0 |
| 8 | 39.3 | 60.7 | - | - | 100.0 | 36.1 | 63.9 | - | - | 100.0 |
| 9 | 30.5 | 69.5 | - | - | 100.0 | 38.1 | 61.3 | 0.4 | 0.2 | 100.0 |
| Total | 42.5 | 57.4 | 0.1 | 0.0 | 100.0 | 42.8 | 57.1 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Porcentaje de la población menor de 10 años que presentó enfermedad respiratoria aguda durante las dos semanas previas a la entrevista**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 4,378,799 | 38.5 |
| No | 6,918,783 | 60.8 |
| No sabe | 3,909 | .0 |
| No responde | 74,171 | .7 |
| Total | 11,375,662 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Población menor de 10 años que presentó enfermedad respiratoria aguda durante las dos semanas previas a la entrevista, por edad y sexo**

| Edad | Hombre | | | | Mujer | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | No responde | Total | Sí | No | No sabe | No responde | Total |
| 0 | 509,694 | 696,303 | 1,070 | 1,207,067 | 468,804 | 727,219 | - | 2,551 | 1,198,574 |
| 1 | 399,223 | 626,970 | 3,418 | 1,029,611 | 445,519 | 550,183 | - | 1,349 | 997,051 |
| 2 | 423,981 | 707,698 | 351 | 1,132,030 | 445,746 | 600,896 | 960 | 5,197 | 1,052,799 |
| 3 | 463,637 | 699,108 | 5,806 | 1,168,551 | 390,688 | 742,565 | 2,563 | 6,290 | 1,142,106 |
| 4 | 422,654 | 768,461 | 13,711 | 1,204,826 | 391,411 | 769,488 | 386 | 24,821 | 1,186,106 |
| 5 | 7,021 | 7,249 | 905 | 15,175 | 4,636 | 3,397 | - | 2,505 | 10,538 |
| 6 | 2,504 | 3,863 | 2,069 | 8,436 | 229 | 3,536 | - | - | 3,765 |
| 7 | 488 | 445 | - | 933 | 938 | 930 | - | - | 1,868 |
| 8 | 670 | 1,747 | 1,881 | 4,298 | - | 3,777 | - | - | 3,777 |
| 9 | - | 4,234 | 2,247 | 6,481 | 956 | 714 | - | - | 1,670 |
| Total | 2,229,872 | 3,516,078 | 31,458 | 5,777,408 | 2,148,927 | 3,402,705 | 3,909 | 42,713 | 5,598,254 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Aspectos relevantes:**

i. **En el Distrito Federal durante 2006, de los niños entre 0 y 9 años, que padecieron enfermedades un 94% se concentran sus problemas de salud en: infecciones respiratorias, neumonía o bronconeumonía, tos, catarro, dolor de garganta, Diarrea, sólo el 6% mencionó otro tipo de enfermedades.**

ii. **Durante 2006, por grupos quinquenales, resalta la población de niños entre 0 y 4 años con mayores problemas de salud con respecto a los de 5 a 9 años, el primero grupo tuvo 79.2% de padecimientos que giran en torno infecciones respiratorias, mientras que sólo el 21.8% del segundo grupo tuvo problemas de este tipo. La situación se vuelve extrema con respecto a la diarrea, los del primer grupo quinquenal, sin importar sexo, fueron los que tuvieron este síntoma, en el segundo grupo, no se reportó ningún porcentaje.**

iii. **En cuanto a las enfermedades que se presentan de acuerdo al sexo es de llamar la atención que en 2006 las únicas que presentaron asma, de acuerdo, a la Encuesta, fueron las niñas de 5 a 9 años. En relación a la diarrea son los niños de 0 a 4 años quienes más presentan tal problema con un 82.5%, sólo el 16% de las niñas del mismo quinquenio reportaron tal situación.**

iv. **Haciendo un comparativo en 2006 a nivel nacional sólo el 15.8% manifestó tener los problemas de salud ya mencionados, mientras que en el Distrito Federal hay un aumento de casi 8 puntos porcentuales, lo que coloca al DF por arriba en términos por lo menos de manifestación de este tipo de enfermedades con un 23.31%.**

v. **La proporción de niños menores de 10 años en el Distrito Federal que presentó enfermedad respiratoria aguda fue del 51.5 por ciento, lo cual lo coloca a la Ciudad por arriba en 8.8 puntos porcentuales arriba del promedio nacional.**

**Distrito Federal. Porcentaje de la población menor de 10 años que presentó algún daño a la salud debido a un accidente en el último año**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 66,174 | 5.2 |
| No | 1,206,362 | 94.8 |
| Total | 1,272,536 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Población menor de 10 años que presentó algún daño a la salud debido a un accidente en el último año, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | MUJER | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 0 | 0 | 56,594 | 56,594 | 0 | 63,562 | 63,562 |
| 1 | 1,451 | 50,789 | 52,240 | 2,177 | 50,070 | 52,247 |
| 2 | 11,608 | 48,479 | 60,087 | 0 | 69,003 | 69,003 |
| 3 | 6,531 | 76,329 | 82,860 | 10,157 | 54,267 | 64,424 |
| 4 | 0 | 60,227 | 60,227 | 1,451 | 62,542 | 63,993 |
| 5 | 1,451 | 49,925 | 51,376 | 3,484 | 91,279 | 94,763 |
| 6 | 1,451 | 60,800 | 62,251 | 4,935 | 63,417 | 68,352 |
| 7 | 4,353 | 51,516 | 55,869 | 2,902 | 48,184 | 51,086 |
| 8 | 3,193 | 59,356 | 62,549 | 1,742 | 58,913 | 60,655 |
| 9 | 3,193 | 77,055 | 80,248 | 6,095 | 54,055 | 60,150 |
| Total | 33,231 | 591,070 | 624,301 | 32,943 | 615,292 | 648,235 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Porcentaje de la población menor de 10 años que presentó algún daño a la salud debido a un accidente en el último año, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | MUJER | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | 2.8 | 97.2 | 100.0 | 4.2 | 95.8 | 100.0 |
| 2 | 19.3 | 80.7 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3 | 7.9 | 92.1 | 100.0 | 15.8 | 84.2 | 100.0 |
| 4 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 2.3 | 97.7 | 100.0 |
| 5 | 2.8 | 97.2 | 100.0 | 3.7 | 96.3 | 100.0 |
| 6 | 2.3 | 97.7 | 100.0 | 7.2 | 92.8 | 100.0 |
| 7 | 7.8 | 92.2 | 100.0 | 5.7 | 94.3 | 100.0 |
| 8 | 5.1 | 94.9 | 100.0 | 2.9 | 97.1 | 100.0 |
| 9 | 4.0 | 96.0 | 100.0 | 10.1 | 89.9 | 100.0 |
| Total | 5.3 | 94.7 | 100.0 | 5.1 | 94.9 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Porcentaje de la población menor de 10 años que presentó algún daño a la salud debido a un accidente en el último año**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 154,887 | 9.8 |
| No | 1,409,608 | 89.4 |
| No responde | 12,937 | .8 |
| Total | 1,577,432 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Población menor de 10 años que presentó algún daño a la salud debido a un accidente en el último año, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Si | No | No responde | Total | Si | No | responde | Total |
| 0 | 7,572 | 71,212 | 2,730 | 81,514 | 7,289 | 88,697 | - | 95,986 |
| 1 | 7,972 | 47,029 | - | 55,001 | 2,086 | 61,567 | - | 63,653 |
| 2 | 1,618 | 82,363 | - | 83,981 | 9,455 | 56,216 | - | 65,671 |
| 3 | 14,331 | 75,051 | - | 89,382 | 11,676 | 76,695 | - | 88,371 |
| 4 | 5,321 | 82,223 | 2,912 | 90,456 | 9,766 | 62,513 | - | 72,279 |
| 5 | 12,150 | 73,069 | - | 85,219 | - | 91,256 | - | 91,256 |
| 6 | 5,342 | 84,992 | - | 90,334 | 16,098 | 58,150 | - | 74,248 |
| 7 | 15,048 | 54,428 | 3,592 | 73,068 | 4,412 | 62,803 | 2,090 | 69,305 |
| 8 | 14,850 | 57,868 | - | 72,718 | 1,633 | 74,636 | - | 76,269 |
| 9 | 3,267 | 77,955 | - | 81,222 | 5,001 | 70,885 | 1,613 | 77,499 |
| Total | 87,471 | 706,190 | 9,234 | 802,895 | 67,416 | 703,418 | 3,703 | 774,537 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución de Población menor de 10 años que presentó algún daño a la salud debido a un accidente en el último año, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Si | No | No responde | Total | Si | No | No responde | Total |
| 0 | 9.3 | 87.4 | 3.3 | 100.0 | 7.6 | 92.4 | - | 100.0 |
| 1 | 14.5 | 85.5 | - | 100.0 | 3.3 | 96.7 | - | 100.0 |
| 2 | 1.9 | 98.1 | - | 100.0 | 14.4 | 85.6 | - | 100.0 |
| 3 | 16.0 | 84.0 | - | 100.0 | 13.2 | 86.8 | - | 100.0 |
| 4 | 5.9 | 90.9 | 3.2 | 100.0 | 13.5 | 86.5 | - | 100.0 |
| 5 | 14.3 | 85.7 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 |
| 6 | 5.9 | 94.1 | - | 100.0 | 21.7 | 78.3 | - | 100.0 |
| 7 | 20.6 | 74.5 | 4.9 | 100.0 | 6.4 | 90.6 | 3.0 | 100.0 |
| 8 | 20.4 | 79.6 | - | 100.0 | 2.1 | 97.9 | - | 100.0 |
| 9 | 4.0 | 96.0 | - | 100.0 | 6.5 | 91.5 | 2.1 | 100.0 |
| Total | 10.9 | 88.0 | 1.2 | 100.0 | 8.7 | 90.8 | 0.5 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Porcentaje de la población menor de 10 años que presentó algún daño a la salud debido a un accidente en el último año**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 1,048,144 | 5.2 |
| No | 19,145,468 | 94.7 |
| No responde | 18,110 | .1 |
| No sabe | 2,253 | .0 |
| Total | 20,213,975 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Población menor de 10 años que presentó algún daño a la salud debido a un accidente en el último año, por edad y sexo**

| Edad | HOMBRE | | | | | MUJER | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | No responde | No sabe | Total | Sí | No | No responde | No sabe | Total |
| 0 | 20,578 | 886,123 | 498 | 685 | 907,884 | 30,280 | 793,271 | 705 | - | 824,256 |
| 1 | 37,318 | 842,591 | 924 | - | 880,833 | 36,399 | 869,718 | 1,246 | - | 907,363 |
| 2 | 76,801 | 895,379 | - | - | 972,180 | 53,304 | 876,562 | - | - | 929,866 |
| 3 | 73,598 | 977,716 | 1,403 | - | 1,052,717 | 49,940 | 955,848 | - | - | 1,005,788 |
| 4 | 58,774 | 977,704 | 2,464 | - | 1,038,942 | 51,445 | 956,635 | 573 | - | 1,008,653 |
| 5 | 63,634 | 1,057,900 | 1,125 | - | 1,122,659 | 57,219 | 1,050,930 | 4,598 | - | 1,112,747 |
| 6 | 39,397 | 981,549 | - | - | 1,020,946 | 42,340 | 1,001,937 | - | 1,568 | 1,045,845 |
| 7 | 75,476 | 948,059 | 498 | - | 1,024,033 | 40,748 | 923,861 | - | - | 964,609 |
| 8 | 72,797 | 984,071 | 3,568 | - | 1,060,436 | 50,630 | 1,060,222 | 508 | - | 1,111,360 |
| 9 | 70,978 | 1,034,701 | - | - | 1,105,679 | 46,488 | 1,070,691 | - | - | 1,117,179 |
| Total | 589,351 | 9,585,793 | 10,480 | 685 | 10,186,309 | 458,793 | 9,559,675 | 7,630 | 1,568 | 10,027,666 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Porcentaje de la población menor de 10 años que presentó algún daño a la salud debido a un accidente en el último año**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 1,626,781 | 7.1 |
| No | 21,181,766 | 92.1 |
| No sabe | 4,435 | .0 |
| No responde | 193,050 | .8 |
| Total | 23,006,032 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Población menor de 10 años que presentó algún daño a la salud debido a un accidente en el último año, por edad y sexo**

| Edad | Hombre | | | | | Mujer | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Si | No | No sabe | No responde | Total | Si | No | No sabe | responde | Total |
| 0 | 59,415 | 1,149,099 | - | 6,171 | 1,214,685 | 42,402 | 1,154,706 | - | 3,257 | 1,200,365 |
| 1 | 79,508 | 969,285 | - | 6,756 | 1,055,549 | 58,070 | 941,093 | - | 3,238 | 1,002,401 |
| 2 | 93,951 | 1,039,112 | - | 6,076 | 1,139,139 | 73,466 | 981,664 | 76 | 15,024 | 1,070,230 |
| 3 | 109,513 | 1,056,520 | - | 11,900 | 1,177,933 | 82,172 | 1,055,792 | - | 10,403 | 1,148,367 |
| 4 | 97,368 | 1,108,281 | 505 | 15,147 | 1,221,301 | 82,515 | 1,106,602 | 386 | 10,921 | 1,200,424 |
| 5 | 84,222 | 1,068,012 | - | 9,291 | 1,161,525 | 79,238 | 1,066,138 | 1,387 | 11,960 | 1,158,723 |
| 6 | 101,934 | 1,097,706 | 1,017 | 10,908 | 1,211,565 | 85,818 | 1,036,031 | - | 6,959 | 1,128,808 |
| 7 | 116,122 | 1,009,537 | - | 14,743 | 1,140,402 | 61,844 | 1,025,653 | 461 | 9,721 | 1,097,679 |
| 8 | 100,781 | 1,060,537 | 603 | 7,476 | 1,169,397 | 64,296 | 1,097,444 | - | 10,796 | 1,172,536 |
| 9 | 92,595 | 1,094,371 | - | 5,262 | 1,192,228 | 61,551 | 1,064,183 | - | 17,041 | 1,142,775 |
| Total | 935,409 | 10,652,460 | 2,125 | 93,730 | 11,683,724 | 691,372 | 10,529,306 | 2,310 | 99,320 | 11,322,308 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de Población menor de 10 años que presentó algún daño a la salud debido a un accidente en el último año, por edad y sexo**

| Edad | Hombre | | | | | Mujer | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Si | No | No sabe | No responde | Total | Si | No | No sabe | No responde | Total |
| 0 | 4.9 | 94.6 | - | 0.5 | 100.0 | 3.5 | 96.2 | - | 0.3 | 100.0 |
| 1 | 7.5 | 91.8 | - | 0.6 | 100.0 | 5.8 | 93.9 | - | 0.3 | 100.0 |
| 2 | 8.2 | | - | 0.5 | 100.0 | 6.9 | 91.7 | 0.0 | 1.4 | 100.0 |
| 3 | 9.3 | 89.7 | - | 1.0 | 100.0 | 7.2 | 91.9 | - | 0.9 | 100.0 |
| 4 | 8.0 | 90.7 | 0.0 | 1.2 | 100.0 | 6.9 | 92.2 | 0.0 | 0.9 | 100.0 |
| 5 | 7.3 | 91.9 | - | 0.8 | 100.0 | 6.8 | 92.0 | 0.1 | 1.0 | 100.0 |
| 6 | 8.4 | 90.6 | 0.1 | 0.9 | 100.0 | 7.6 | 91.8 | - | 0.6 | 100.0 |
| 7 | 10.2 | 88.5 | - | 1.3 | 100.0 | 5.6 | 93.4 | 0.0 | 0.9 | 100.0 |
| 8 | 8.6 | 90.7 | 0.1 | 0.6 | 100.0 | 5.5 | 93.6 | - | 0.9 | 100.0 |
| 9 | 7.8 | 91.8 | - | 0.4 | 100.0 | 5.4 | 93.1 | - | 1.5 | 100.0 |
| Total | 8.0 | 91.2 | 0.0 | 0.8 | 100.0 | 6.1 | 93.0 | 0.0 | 0.9 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Aspectos relevantes:**

i. Durante 2006, el Distrito Federal en términos porcentuales, respecto a accidentes en niños de 0 a menores de 10 años, tenían el mismo porcentaje que a nivel nacional, es decir 5.2.
ii. Sin embargo, mientras que a nivel nacional el porcentaje de los accidentes, decreció, el 1. 9%, el Distrito Federal logro disminuir en 4.6% la incidencia en este problema.
iii. Entre 2000 y 2006 la población de menores de 10 años que sufrió un accidente durante el último año disminuyó en el Distrito Federal, pasó de 9.2% a 4.8%.
iv. Las edades en dónde se concentra la mayor cantidad de niños que tienen accidentes es de 2 y 3 años y esencialmente es en niños, y en el caso de las niñas es sustancialmente a los 3 años. No se reporta ningún porcentaje de niñas accidentadas a los dos años.

# ADOLESCENTES

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 10 a 19 años según consumo de 5 cajetillas de cigarros o más en su vida**

| Consumo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 214,919 | 14.9 |
| No | 313,970 | 21.8 |
| Nunca ha fumado | 910,442 | 63.3 |
| Total | 1,439,331 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Población de 10 a 19 años según consumo de 5 cajetillas de cigarros o más en su vida por grupos de edad y sexo**

| Sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Sí | 6,386 | 141,890 | 148,276 |
| | No | 71,719 | 76,800 | 148,519 |
| | Nunca ha fumado | 294,862 | 180,842 | 475,704 |
| | Total | 372,967 | 399,532 | 772,499 |
| Mujer | Sí | 2,902 | 63,741 | 66,643 |
| | No | 59,018 | 106,433 | 165,451 |
| | Nunca ha fumado | 251,174 | 183,564 | 434,738 |
| | Total | 313,094 | 353,738 | 666,832 |

Fuente: Elaboración propiacon base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 10 a 19 años según consumo de 5 cajetillas de cigarros o más en su vida por grupos de edad y sexo**

| Sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Sí | 1.7 | 35.5 | 19.2 |
| | No | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| | Nunca ha fumado | 79.1 | 45.3 | 61.6 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Sí | 0.9 | 18.0 | 10.0 |
| | No | 18.8 | 30.1 | 24.8 |
| | Nunca ha fumado | 80.2 | 51.9 | 65.2 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 10 a 19 años según consumo de 5 cajetillas de cigarros o más en su vida**

| Consumo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nunca ha fumado | 745,330 | 45.4 |
| Sí | 163,623 | 10.0 |
| No | 612,124 | 37.3 |
| No responde | 120,805 | 7.4 |
| Total | 1,641,882 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Población de 10 a 19 años según consumo de 5 cajetillas de cigarros o más en su vida por grupos de edad y sexo**

| Sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Nunca ha fumado | 188,796 | 154,555 | 343,351 |
| | Sí | 7,897 | 75,311 | 83,208 |
| | No | 171,589 | 149,448 | 321,037 |
| | No responde | 28,707 | 36,033 | 64,740 |
| | Total | 396,989 | 415,347 | 812,336 |
| Mujer | Nunca ha fumado | 262,499 | 139,480 | 401,979 |
| | Sí | 1,856 | 78,559 | 80,415 |
| | No | 118,271 | 172,816 | 291,087 |
| | No responde | 7,816 | 48,249 | 56,065 |
| | Total | 390,442 | 439,104 | 829,546 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución de Población de 10 a 19 años según consumo de 5 cajetillas de cigarros o más en su vida por grupos de edad y sexo**

| Sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Nunca ha fumado | 47.6 | 37.2 | 42.3 |
| | Sí | 2.0 | 18.1 | 10.2 |
| | No | 43.2 | 36.0 | 39.5 |
| | No responde | 7.2 | 8.7 | 8.0 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Nunca ha fumado | 67.2 | 31.8 | 48.5 |
| | Sí | 0.5 | 17.9 | 9.7 |
| | No | 30.3 | 39.4 | 35.1 |
| | No responde | 2.0 | 11.0 | 6.8 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 10 a 19 años según consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida**

| Consumo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nunca ha tomado | 1,035,176 | 71.9 |
| Sí | 217,557 | 15.1 |
| No | 186,598 | 13.0 |
| Total | 1,439,331 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Población de 10 a 19 años según consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida por grupos de edad y sexo**

| sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Nunca ha tomado | 336,975 | 199,021 | 535,996 |
| | Sí | 15,383 | 118,485 | 133,868 |
| | No | 20,609 | 82,026 | 102,635 |
| | Total | 372,967 | 399,532 | 772,499 |
| Mujer | Nunca ha tomado | 307,290 | 191,890 | 499,180 |
| | Sí | 1,451 | 82,238 | 83,689 |
| | No | 4,353 | 79,610 | 83,963 |
| | Total | 313,094 | 353,738 | 666,832 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 10 a 19 años según consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida por grupos de edad y sexo**

| sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Nunca ha tomado | 90.3 | 49.8 | 69.4 |
| | Sí | 4.1 | 29.7 | 17.3 |
| | No | 5.5 | 20.5 | 13.3 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Nunca ha tomado | 98.1 | 54.2 | 74.9 |
| | Sí | 0.5 | 23.2 | 12.6 |
| | No | 1.4 | 22.5 | 12.6 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 10 a 19 años según consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nunca toma | 1,042,629 | 63.5 |
| 1 a 2 veces al año | 244,821 | 14.9 |
| 3 a 6 veces al año | 57,421 | 3.5 |
| 7 a 11 veces al año | 21,323 | 1.3 |
| Una vez al mes | 78,443 | 4.8 |
| 2 o 3 veces al mes | 36,858 | 2.2 |
| 1 a 2 veces por semana | 31,402 | 1.9 |
| Diariamente | 2,171 | .1 |
| No responde | 126,814 | 7.7 |
| Total | 1,641,882 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Población de 10 a 19 años según consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida por grupos de edad y sexo**

| sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Nunca toma | 306,905 | 202,485 | 509,390 |
| | 1 a 2 veces al año | 37,408 | 61,150 | 98,558 |
| | 3 a 6 veces al año | 6,346 | 12,320 | 18,666 |
| | 7 a 11 veces al año | - | 8,706 | 8,706 |
| | Una vez al mes | 6,071 | 49,207 | 55,278 |
| | 2 o 3 veces al mes | 3,655 | 18,103 | 21,758 |
| | 1 a 2 veces por semana | 7,897 | 21,334 | 29,231 |
| | No responde | 28,707 | 42,042 | 70,749 |
| | Total | 396,989 | 415,347 | 812,336 |
| Mujer | Nunca toma | 343,024 | 190,215 | 533,239 |
| | 1 a 2 veces al año | 34,034 | 112,229 | 146,263 |
| | 3 a 6 veces al año | 1,856 | 36,899 | 38,755 |
| | 7 a 11 veces al año | 1,856 | 10,761 | 12,617 |
| | Una vez al mes | - | 23,165 | 23,165 |
| | 2 o 3 veces al mes | 1,856 | 13,244 | 15,100 |
| | 1 a 2 veces por semana | - | 2,171 | 2,171 |
| | Diariamente | - | 2,171 | 2,171 |
| | No responde | 7,816 | 48,249 | 56,065 |
| | Total | 390,442 | 439,104 | 829,546 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución de Población de 10 a 19 años según consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida por grupos de edad y sexo**

| sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Nunca toma | 77.3 | 48.8 | 62.7 |
| | 1 a 2 veces al año | 9.4 | 14.7 | 12.1 |
| | 3 a 6 veces al año | 1.6 | 3.0 | 2.3 |
| | 7 a 11 veces al año | - | 2.1 | 1.1 |
| | Una vez al mes | 1.5 | 11.8 | 6.8 |
| | 2 o 3 veces al mes | 0.9 | 4.4 | 2.7 |
| | 1 a 2 veces por semana | 2.0 | 5.1 | 3.6 |
| | No responde | 7.2 | 10.1 | 8.7 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Nunca toma | 87.9 | 43.3 | 64.3 |
| | 1 a 2 veces al año | 8.7 | 25.6 | 17.6 |
| | 3 a 6 veces al año | 0.5 | 8.4 | 4.7 |
| | 7 a 11 veces al año | 0.5 | 2.5 | 1.5 |
| | Una vez al mes | - | 5.3 | 2.8 |
| | 2 o 3 veces al mes | 0.5 | 3.0 | 1.8 |
| | 1 a 2 veces por semana | - | 0.5 | 0.3 |
| | Diariamente | - | 0.5 | 0.3 |
| | No responde | 2.0 | 11.0 | 6.8 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

Aspectos relevantes:

i. En la Encuesta de 2006, el 63.3% de los adolescentes (personas entre 10 y 19 años) indicaron que nunca habían fumado, lo cual también nos muestra que el 36.7% de este grupo de población alguna vez sí lo ha hecho.
ii. De 2000 a 2006 en el Distrito Federal los adolescentes que mencionaron haber fumado aumentó de 36.7% a 45.4%
iii. En 2000 un alto porcentaje del grupo poblacional de adolescentes entre 10 y 19 años; no responde la pregunta.
iv. Haciendo un comparativo en 2006, en el Distrito Federal, entre grupos de 10 a 14 y de 15 a 19 años, es en el segundo grupo quinquenal dónde encontramos mayor cantidad de adolescentes que indicaron fumar y sobresale el hecho de que sean más hombres que mujeres, en proporción casi 2 a 1.
v. En 2006 en el Distrito, el porcentaje de la población entre 10 y 19 años que indicaron nunca haber consumido bebidas alcohólicas era de 71.9 % lo cual es menor al porcentaje nacional de 82.3%.
vi. Entre 2000 y 2006, la cantidad porcentual de adolescentes que indicaron haber consumido por lo menos una vez alcohol aumentó de 63.5% a 71.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pastillas o pildoras | 360,926 | 33.5 |
| Dispositivo, DIU, aparatito | 86,532 | 8.0 |
| Inyecciones | 7,508 | .7 |
| Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 21,199 | 2.0 |
| Preservativo o condón | 571,105 | 53.0 |
| Operación femenina u OTB | 15,560 | 1.4 |
| Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | 5,551 | .5 |
| Retiro o coito interrumpido | 4,080 | .4 |
| No responde | 4,342 | .4 |
| Total | 1,076,803 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método y sexo**

| Sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Pastillas o pildoras | 43,379 | 89,097 | 132,476 |
| | Dispositivo, DIU, | 1,740 | 3,005 | 4,745 |
| | Inyecciones | 3,481 | - | 3,481 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 3,528 | 3,155 | 6,683 |
| | Preservativo o condón | 134,102 | 238,381 | 372,483 |
| | Operación femenina u OTB | 3,528 | 6,010 | 9,538 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | - | 5,551 | 5,551 |
| | Total | 189,758 | 345,199 | 534,957 |
| Mujer | Pastillas o pildoras | 75,803 | 152,647 | 228,450 |
| | Dispositivo, DIU, | 9,672 | 72,115 | 81,787 |
| | Inyecciones | 1,856 | 2,171 | 4,027 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | - | 14,516 | 14,516 |
| | Preservativo o condón | 78,955 | 119,667 | 198,622 |
| | Operación femenina u OTB | 3,851 | 2,171 | 6,022 |
| | Retiro o coito interrumpido | - | 4,080 | 4,080 |
| | No responde | - | 4,342 | 4,342 |
| | Total | 170,137 | 371,709 | 541,846 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución de Adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método y sexo**

| Sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Pastillas o pildoras | 22.9 | 25.8 | 24.8 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| | Inyecciones | 1.8 | - | 0.7 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 1.9 | 0.9 | 1.2 |
| | Preservativo o condón | 70.7 | 69.1 | 69.6 |
| | Operación femenina u OTB | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | - | 1.6 | 1.0 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Pastillas o pildoras | 44.6 | 41.1 | 42.2 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | 5.7 | 19.4 | 15.1 |
| | Inyecciones | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | - | 3.9 | 2.7 |
| | Preservativo o condón | 46.4 | 32.2 | 36.7 |
| | Operación femenina u OTB | 2.3 | 0.6 | 1.1 |
| | Retiro o coito interrumpido | - | 1.1 | 0.8 |
| | No responde | - | 1.2 | 0.8 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método**

| Método anticonceptivo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pastillas o píldoras | 821,205 | 77.9 |
| Dispositivo, DIU o aparatito | 65,077 | 6.2 |
| Inyecciones | 14,223 | 1.3 |
| Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | 5,804 | .6 |
| Preservativo o condón | 143,816 | 13.6 |
| Operación femenina o OTB | 3,679 | .3 |
| Total | 1,053,804 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método y sexo**

| sexo | Metódo anticonceptivo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Pastillas o píldoras | 123,941 | 282,606 | 406,547 |
| | Dispositivo, DIU o aparatito | 2,177 | 28,081 | 30,258 |
| | Inyecciones | 3,484 | 4,353 | 7,837 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | 4,353 | 1,451 | 5,804 |
| | Preservativo o condón | 53,414 | 44,694 | 98,108 |
| | Operación femenina o OTB | - | 3,679 | 3,679 |
| | Total | 187,369 | 364,864 | 552,233 |
| Mujer | Pastillas o píldoras | 125,999 | 288,659 | 414,658 |
| | Dispositivo, DIU o aparatito | 10,157 | 24,662 | 34,819 |
| | Inyecciones | - | 6,386 | 6,386 |
| | Preservativo o condón | 29,747 | 15,961 | 45,708 |
| | Total | 165,903 | 335,668 | 501,571 |

Fuente: Elaboración propiacon base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método y sexo**

| sexo | Metódo anticonceptivo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Pastillas o píldoras | 66.1 | 77.5 | 73.6 |
| | Dispositivo, DIU o aparatito | 1.2 | 7.7 | 5.5 |
| | Inyecciones | 1.9 | 1.2 | 1.4 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | 2.3 | 0.4 | 1.1 |
| | Preservativo o condón | 28.5 | 12.2 | 17.8 |
| | Operación femenina o OTB | - | 1.0 | 0.7 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Pastillas o píldoras | 75.9 | 86.0 | 82.7 |
| | Dispositivo, DIU o aparatito | 6.1 | 7.3 | 6.9 |
| | Inyecciones | - | 1.9 | 1.3 |
| | Preservativo o condón | 17.9 | 4.8 | 9.1 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pastillas o píldoras | 29,238 | 2.0 |
| Pastilla o píldora de emergencia o del día después | 2,902 | .2 |
| Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | 2,177 | .2 |
| Preservativo o condón | 167,602 | 11.6 |
| Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | 1,742 | .1 |
| Nada | 58,218 | 4.0 |
| Total | 261,879 | 18.2 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual por sexo**

| sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Pastillas o píldoras | - | 15,107 | 15,107 |
| | Pastilla o píldora de emergencia o del día después | - | 2,902 | 2,902 |
| | Preservativo o condón | 5,320 | 117,740 | 123,060 |
| | Nada | - | 28,265 | 28,265 |
| | Total | 5,320 | 164,014 | 169,334 |
| Mujer | Pastillas o píldoras | - | 14,131 | 14,131 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | - | 2,177 | 2,177 |
| | Preservativo o condón | 4,353 | 40,189 | 44,542 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | - | 1,742 | 1,742 |
| | Nada | - | 29,953 | 29,953 |
| | Total | 4,353 | 88,192 | 92,545 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual por sexo**

| sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Pastillas o píldoras | - | 9.2 | 8.9 |
| | Pastilla o píldora de emergencia o del día después | - | 1.8 | 1.7 |
| | Preservativo o condón | 100.0 | 71.8 | 72.7 |
| | Nada | - | 17.2 | 16.7 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Pastillas o píldoras | - | 16.0 | 15.3 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | - | 2.5 | 2.4 |
| | Preservativo o condón | 100.0 | 45.6 | 48.1 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | - | 2.0 | 1.9 |
| | Nada | - | 34.0 | 32.4 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual**

| Uso de condón | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nada | 102,443 | 46.1 |
| Preservativo o condón | 119,882 | 53.9 |
| Total | 222,325 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual por sexo**

| Sexo | Uso de condón | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Nada | - | 31,357 | 31,357 |
| | Preservativo o condón | 3,720 | 74,442 | 78,162 |
| | Total | 3,720 | 105,799 | 109,519 |
| Mujer | Nada | | 71,086 | 71,086 |
| | Preservativo o condón | | 41,720 | 41,720 |
| | Total | | 112,806 | 112,806 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución de Adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual por sexo**

| Sexo | Uso de condón | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Nada | - | 29.6 | 28.6 |
| | Preservativo o condón | 100.0 | 70.4 | 71.4 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Nada | | 63.0 | 63.0 |
| | Preservativo o condón | | 37.0 | 37.0 |
| | Total | | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de mujeres de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, según si han estado embarazadas alguna vez**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 41,363 | 2.9 |
| No | 51,182 | 3.6 |
| Total | 92,545 | 6.4 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Mujeres de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, según si han estado embarazadas alguna vez**

| | Grupos quinquenales | | |
|---|---|---|---|
| | 10 a 14 años | 15 a 19 años | Total |
| Sí | - | 41,363 | 41,363 |
| No | 4,353 | 46,829 | 51,182 |
| Total | 4,353 | 88,192 | 92,545 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución de Mujeres de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, según si han estado embarazadas alguna vez**

| | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|
| | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Sí | - | 46.9 | 44.7 |
| No | 100.0 | 53.1 | 55.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de mujeres de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, según si han estado embarazadas alguna vez**

| Embarazos | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 49,891 | 44.2 |
| No | 62,915 | 55.8 |
| Total | 112,806 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución de Mujeres de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, según si han estado embarazadas alguna vez**

| Embarazos | Grupos quinquenales | Total | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| | 15 - 19 | | |
| Sí | 49,891 | 49,891 | 44.2 |
| No | 62,915 | 62,915 | 55.8 |
| | 112,806 | 112,806 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de las mujeres de 12 a 19 años que fueron revisadas durante su embarazo por personal médico**

| Personal que reviso | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Médico | 19,885 | 1.4 |
| Sistema | 1,419,446 | 98.6 |
| Total | 1,439,331 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Mujeres de 12 a 19 años que fueron revisadas durante su embarazo por personal médico**

| Personal que reviso | Grupos quinquenales | Total |
|---|---|---|
| | 15 a 19 años | |
| Médico | 19,885 | 19,885 |
| Total | 19,885 | 19,885 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de las mujeres de 12 a 19 años que fueron revisadas durante su embarazo por personal médico**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Médico | 40,871 | 2.5 |
| Perdidos de Sistema | 1,601,011 | 97.5 |
| Total | 1,641,882 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Mujeres de 12 a 19 años que fueron revisadas durante su embarazo por personal médico**

| Personal que reviso | Grupos quinquenales | Total |
|---|---|---|
| | 15 - 19 | |
| Médico | 40,871 | 40,871 |
| | 40,871 | 40,871 |

Fuente: Dirección de Estadísticas DF con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de adolescentes de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, que utilizan algún método para no tener hijos**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 105,470 | 40.3 |
| No | 97,060 | 37.1 |
| Está embarazada | 7,546 | 2.9 |
| No tiene pareja | 51,803 | 19.8 |
| Total | 261,879 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Adolescentes de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, que utilizan algún método para no tener hijos por sexo**

| sexo | | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Sí | 5,320 | 58,217 | 63,537 |
| | No | - | 63,558 | 63,558 |
| | No tiene pareja | - | 42,239 | 42,239 |
| | Total | 5,320 | 164,014 | 169,334 |
| Mujer | Sí | - | 41,933 | 41,933 |
| | No | 4,353 | 29,149 | 33,502 |
| | Está embarazada | - | 7,546 | 7,546 |
| | No tiene pareja | - | 9,564 | 9,564 |
| | Total | 4,353 | 88,192 | 92,545 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de adolescentes de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, que utilizan algún método para no tener hijos**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pastillas o pildoras | 3,720 | 4.6 |
| Inyecciones | 10,955 | 13.5 |
| Dispositivo, DIU, | 20,349 | 25.1 |
| Preservativo o condón | 41,418 | 51.2 |
| Retiro o coito interrumpido | 4,510 | 5.6 |
| Total | 80,952 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Adolescentes de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, que utilizan algún método para no tener hijos por sexo**

| Sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Pastillas o pildoras | 3,720 | - | 3,720 |
| | Inyecciones | - | 8,556 | 8,556 |
| | Preservativo o condón | - | 21,484 | 21,484 |
| | Total | 3,720 | 30,040 | 33,760 |
| Mujer | Inyecciones | | 2,399 | 2,399 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | | 20,349 | 20,349 |
| | Preservativo o condón | | 19,934 | 19,934 |
| | Retiro o coito interrumpido | | 4,510 | 4,510 |
| | Total | | 47,192 | 47,192 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución de Adolescentes de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, que utilizan algún método para no tener hijos por sexo**

| Sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Pastillas o pildoras | 100.0 | - | 11.0 |
| | Inyecciones | - | 28.5 | 25.3 |
| | Preservativo o condón | - | 71.5 | 63.6 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Inyecciones | | 5.1 | 5.1 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | | 43.1 | 43.1 |
| | Preservativo o condón | | 42.2 | 42.2 |
| | Retiro o coito interrumpido | | 9.6 | 9.6 |
| | Total | | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de adolescentes de 12 a 19 años, según conocimiento de algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Condones? | 1,018,705 | 87.4 |
| Retiro o venirse afuera? | 4,353 | .4 |
| Relaciones sólo con tu pareja? | 23,124 | 2.0 |
| No tener relaciones sexuales? | 48,439 | 4.2 |
| Otro? | 1,451 | .1 |
| No responde | 68,911 | 5.9 |
| Total | 1,164,983 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Adolescentes de 12 a 19 años, según conocimiento de algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual por sexo y grupos de edad**

| sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Condones? | 179,403 | 366,369 | 545,772 |
| | Retiro o venirse afuera? | - | 4,353 | 4,353 |
| | Relaciones sólo con tu pareja? | 4,353 | 8,323 | 12,676 |
| | No tener relaciones sexuales? | 17,240 | 5,391 | 22,631 |
| | No responde | 26,122 | 15,096 | 41,218 |
| | Total | 227,118 | 399,532 | 626,650 |
| Mujer | Condones? | 140,530 | 332,403 | 472,933 |
| | Relaciones sólo con tu pareja? | 8,706 | 1,742 | 10,448 |
| | No tener relaciones sexuales? | 17,827 | 7,981 | 25,808 |
| | Otro? | - | 1,451 | 1,451 |
| | No responde | 17,532 | 10,161 | 27,693 |
| | Total | 184,595 | 353,738 | 538,333 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de adolescentes de 12 a 19 años, según conocimiento de algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual por sexo y grupos de edad**

| sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Condones? | 79.0 | 91.7 | 87.1 |
| | Retiro o venirse afuera? | - | 1.1 | 0.7 |
| | Relaciones sólo con tu pareja? | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
| | No tener relaciones sexuales? | 7.6 | 1.3 | 3.6 |
| | No responde | 11.5 | 3.8 | 6.6 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Condones? | 76.1 | 94.0 | 87.9 |
| | Relaciones sólo con tu pareja? | 4.7 | 0.5 | 1.9 |
| | No tener relaciones sexuales? | 9.7 | 2.3 | 4.8 |
| | Otro? | - | 0.4 | 0.3 |
| | No responde | 9.5 | 2.9 | 5.1 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de adolescentes de 12 a 19 años, según conocimiento de algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Condón | 701,524 | 84.3 |
| No tener relaciones sexuales | 108,076 | 13.0 |
| Relaciones sólo con tu pareja | 9,893 | 1.2 |
| Otro | 4,066 | .5 |
| No responde | 9,069 | 1.1 |
| Total | 832,628 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Adolescentes de 12 a 19 años, según conocimiento de algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual por sexo y grupos de edad**

| Sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Condón | 126,365 | 250,133 | 376,498 |
| | No tener relaciones sexuales | 14,432 | 46,522 | 60,954 |
| | Relaciones sólo con tu pareja | - | 5,551 | 5,551 |
| | Otro | 4,066 | - | 4,066 |
| | Total | 144,863 | 302,206 | 447,069 |
| Mujer | Condón | 99,831 | 225,195 | 325,026 |
| | No tener relaciones sexuales | 7,713 | 39,409 | 47,122 |
| | Relaciones sólo con tu pareja | - | 4,342 | 4,342 |
| | No responde | 4,559 | 4,510 | 9,069 |
| | Total | 112,103 | 273,456 | 385,559 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución de Adolescentes de 12 a 19 años, según conocimiento de algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual por sexo y grupos de edad**

| sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Condón | 87.2 | 82.8 | 84.2 |
| | No tener relaciones sexuales | 10.0 | 15.4 | 13.6 |
| | Relaciones sólo con tu pareja | - | 1.8 | 1.2 |
| | Otro | 2.8 | - | 0.9 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Condón | 89.1 | 82.4 | 84.3 |
| | No tener relaciones sexuales | 6.9 | 14.4 | 12.2 |
| | Relaciones sólo con tu pareja | - | 1.6 | 1.1 |
| | No responde | 4.1 | 1.6 | 2.4 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Aspectos Relevantes:**

i. **En el año 2000 en el Distrito Federal la distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años de edad que habían oído hablar de algún método anticonceptivo, arrojó que los anticonceptivos más conocidos eran; el preservativo o condón con un 53%, le seguían las pastillas o píldoras con 33. 5%, sin embargo, para el 2006 estos datos cambiaron inversamente, ahora los adolescentes mencionaron haber oído más el uso de las pastillas con un 77.9% y el preservativo o condón sólo 13.6%.**
ii. **A pesar de que en el 2000, el 53% de los adolescentes refieren haber oído del preservativo o condón, el 46.1% no lo utilizo en la primera relación sexual**
iii. **El método más utilizado por los adolescentes entre 12 y 19 años en 2000 en el Distrito Federal fue el condón con 51.2, seguido por el DIU con 25.1% y las inyecciones con 13.5%, es inquietante, aún, localizar en este año, la práctica del retiro o coito interrumpido.**
iv. **En el 2000, 44.2% de mujeres entre 15 y 19 años con inicio de vida sexual han estado embarazadas alguna vez.**
v. **En 2006, el método más mencionado por los adolescentes entre los 12 y 19 años utilizado en su primera relación sexual fue el preservativo**
vi. **En el mismo período, treinta y cuatro de cada cien mujeres mencionaron no haber utilizado preservativo o condón en su primera relación sexual, haciendo un comparativo con los hombres, el 17.2% indicó no haberlos utilizado. De los que sí utilizan preservativo o condón, sin importar el género son los del grupo quinquenal de 10 a 14 años, pero estos porcentajes cambian en el grupo quinquenal de 15 a 19 años de cada 100 hombres 71.8 utilizan el preservativo o condón, mientras que en el caso de las mujeres sólo lo hacen 45.6.**
vii. **Sólo el 40.23% de adolescentes de 12 a 19 años con inicio de vida sexual en 2006 refiere que utilizan algún método para no tener hijos.**
viii. **En relación al método de conocimiento para prevenir infecciones de transmisión sexual, en 2006, el condón es el que tiene el mayor porcentaje con 87.4%, aunque hay todavía respuestas como la de tener relaciones sólo con tu pareja con 2%. Hay un porcentaje alto de quienes no responden (5.9%)**
ix. **En cuanto a los grupos quinquenales es notorio que el conocimiento de algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual es indiferente al género; hombres y mujeres tienen un porcentaje similar, sin embargo, en donde si hay una variación es en el grupos quinquenal, de adolescentes de 15 a19 años ya que indican mayor porcentaje de conocimiento con respecto a los de 12-14.**

*Adolescentes*

*Vida sexual, anticonceptivos y embarazos*

**Distrito Federal. Distribución porcentual de los adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún accidente en los últimos 12 meses, según tipo de accidente**

| Tipo de accidente | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Choque de o entre vehículos de transporte | 6,485 | 5.2 |
| Atropellamiento | 4,353 | 3.5 |
| Otros accidentes de transporte | 5,804 | 4.7 |
| Caída de un mismo nivel | 39,481 | 31.8 |
| Caída de un nivel a otro | 17,125 | 13.8 |
| Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 23,546 | 18.9 |
| Exposición a fuerzas mecánicas animada | 11,321 | 9.1 |
| Exposición al fuego, humo y llamas | 2,210 | 1.8 |
| Contacto con calor y sustancias calientes | 4,749 | 3.8 |
| Envenenamiento accidental | 3,484 | 2.8 |
| Exposición accidental a otros factores | 4,284 | 3.4 |
| No responde | 1,451 | 1.2 |
| Total | 124,293 | 100.0 |

Fuente: elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún accidente en los últimos 12 meses, según tipo de accidente por sexo y grupos de edad**

| sexo | Tipo de accidente | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Choque de o entre vehículos de transporte | 1,742 | 1,841 | 3,583 |
| | Atropellamiento | 4,353 | - | 4,353 |
| | Otros accidentes de transporte | - | 5,804 | 5,804 |
| | Caída de un mismo nivel | 16,242 | 11,612 | 27,854 |
| | Caída de un nivel a otro | 9,870 | - | 9,870 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 14,355 | 5,805 | 20,160 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas animada | - | 6,677 | 6,677 |
| | Exposición al fuego, humo y llamas | - | 2,210 | 2,210 |
| | Contacto con calor y sustancias calientes | 4,749 | - | 4,749 |
| | Exposición accidental a otros factores | - | 4,284 | 4,284 |
| | No responde | - | 1,451 | 1,451 |
| | Total | 51,311 | 39,684 | 90,995 |
| Mujer | Choque de o entre vehículos de transporte | 1,451 | 1,451 | 2,902 |
| | Caída de un mismo nivel | 9,485 | 2,142 | 11,627 |
| | Caída de un nivel a otro | 4,353 | 2,902 | 7,255 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 3,386 | - | 3,386 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas animada | 2,902 | 1,742 | 4,644 |
| | Envenenamiento accidental | - | 3,484 | 3,484 |
| | Total | 21,577 | 11,721 | 33,298 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de los adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún accidente en los últimos 12 meses, según tipo de accidente por sexo y grupos de edad**

| sexo | Tipo de accidente | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Choque de o entre vehículos de transporte | 3.4 | 4.6 | 3.9 |
| | Atropellamiento | 8.5 | - | 4.8 |
| | Otros accidentes de transporte | - | 14.6 | 6.4 |
| | Caída de un mismo nivel | 31.7 | 29.3 | 30.6 |
| | Caída de un nivel a otro | 19.2 | - | 10.8 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 28.0 | 14.6 | 22.2 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas animada | - | 16.8 | 7.3 |
| | Exposición al fuego, humo y llamas | - | 5.6 | 2.4 |
| | Contacto con calor y sustancias calientes | 9.3 | - | 5.2 |
| | Exposición accidental a otros factores | - | 10.8 | 4.7 |
| | No responde | - | 3.7 | 1.6 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Choque de o entre vehículos de transporte | 6.7 | 12.4 | 8.7 |
| | Caída de un mismo nivel | 44.0 | 18.3 | 34.9 |
| | Caída de un nivel a otro | 20.2 | 24.8 | 21.8 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 15.7 | - | 10.2 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas animada | 13.4 | 14.9 | 13.9 |
| | Envenenamiento accidental | - | 29.7 | 10.5 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de los adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses, según tipo de agresión**

| Tipo de agresión | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Arma de fuego | 9,432 | 15.1 |
| Objetos cortantes | 14,638 | 23.5 |
| Golpes, patadas, puñetazos | 24,667 | 39.5 |
| Agresión sexual | 1,742 | 2.8 |
| Otras agresiones o maltrato | 6,095 | 9.8 |
| Otro | 5,804 | 9.3 |
| Total | 62,378 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses, según tipo de agresión por sexo y grupos de edad**

| sexo | Tipo de agresión | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Arma de fuego | - | 9,432 | 9,432 |
| | Objetos cortantes | - | 11,154 | 11,154 |
| | Golpes, patadas, puñetazos | 7,255 | 15,961 | 23,216 |
| | Otras agresiones o maltrato | - | 4,644 | 4,644 |
| | Otro | 4,353 | 1,451 | 5,804 |
| | Total | 11,608 | 42,642 | 54,250 |
| Mujer | Objetos cortantes | - | 3,484 | 3,484 |
| | Golpes, patadas, puñetazos | 1,451 | - | 1,451 |
| | Agresión sexual | - | 1,742 | 1,742 |
| | Otras agresiones o maltrato | 1,451 | - | 1,451 |
| | Total | 2,902 | 5,226 | 8,128 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de los adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses, según tipo de agresión por sexo y grupos de edad**

| sexo | Tipo de agresión | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Arma de fuego | - | 22.1 | 17.4 |
| | Objetos cortantes | - | 26.2 | 20.6 |
| | Golpes, patadas, puñetazos | 62.5 | 37.4 | 42.8 |
| | Otras agresiones o maltrato | - | 10.9 | 8.6 |
| | Otro | 37.5 | 3.4 | 10.7 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Objetos cortantes | - | 66.7 | 42.9 |
| | Golpes, patadas, puñetazos | 50.0 | - | 17.9 |
| | Agresión sexual | - | 33.3 | 21.4 |
| | Otras agresiones o maltrato | 50.0 | - | 17.9 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de los adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses, según tipo de agresión**

| Tipo de agresión | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Robo, asalto | 32,641 | 55.5 |
| Agresión sin motivo aparente | 10,524 | 17.9 |
| Detención | 1,740 | 3.0 |
| Discusión/altercado | 13,874 | 23.6 |
| Total | 58,779 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses, según tipo de agresión por sexo y grupos**

| Sexo | Tipo de agresión | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Robo, asalto | 12,733 | 19,908 | 32,641 |
| | Agresión sin motivo aparente | - | 6,009 | 6,009 |
| | Detención | 1,740 | - | 1,740 |
| | Discusión/altercado | - | 12,018 | 12,018 |
| | Total | 14,473 | 37,935 | 52,408 |
| Mujer | Agresión sin motivo aparente | 4,515 | | 4,515 |
| | Discusión/altercado | 1,856 | | 1,856 |
| | Total | 6,371 | | 6,371 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de Adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses, según tipo de agresión por sexo y grupos**

| Sexo | Tipo de agresión | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Robo, asalto | 88.0 | 52.5 | 62.3 |
| | Agresión sin motivo aparente | - | 15.8 | 11.5 |
| | Detención | 12.0 | - | 3.3 |
| | Discusión/altercado | - | 31.7 | 22.9 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Agresión sin motivo aparente | 70.9 | | 70.9 |
| | Discusión/altercado | 29.1 | | 29.1 |
| | Total | 100.0 | | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

*Adolescentes*

*Accidentes y violencia*

**Aspectos relevantes:**

i. **Durante el año 2000, el porcentaje de los adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún tipo de accidente en los últimos 12 meses, tuvo una mayor frecuencia por motivos de caídas con un 38.9%, en segundo lugar, están los accidentes de transporte terrestre con un 23.4%. Para el 2006 las caídas conservaron el primer lugar, pero los accidentes que tuvieron que ver con transporte terrestre disminuyeron.**

**2006.**

i. **Por grupo quinquenal, las mujeres adolescentes de 15 a 19 años, sufrieron de accidentes de transporte en un 100%, en 2006 hubo una diversificación en los tipos de accidente.**
ii. **En 2006, los adolescentes que sufrieron algún robo, agresión o violencia fue principalmente a través de golpes, patadas, puñetazos, seguido de objetos cortantes.**
iii. **De los adolescentes entre 10 y 19 años que sufrieron de robo, agresión o violencia en el último año, de acuerdo al tipo de agresión, es el grupo de adolescentes entre 10 y 14 años, sin diferencia de género, los que señalan que esta se da principalmente a partir de golpes, patadas y puñetazos**

# *Adolescentes*

## *Nacional*

## *Consumo de alcohol y tabaco, métodos anticonceptivos, vida sexual, agresiones y accidentes*

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 10 a 19 años según consumo de 5 cajetillas de cigarros o más en su vida**

| Consumo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 1,735,934 | 7.6 |
| No | 2,453,516 | 10.7 |
| Nunca ha fumado | 18,685,520 | 81.7 |
| Total | 22,874,970 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Población de 10 a 19 años según consumo de 5 cajetillas de cigarros o más en su vida por grupos de edad y sexo**

| Sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Sí | 100,210 | 1,155,702 | 1,255,912 |
| | No | 541,572 | 840,822 | 1,382,394 |
| | Nunca ha fumado | 5,683,519 | 3,290,044 | 8,973,563 |
| | Total | 6,325,301 | 5,286,568 | 11,611,869 |
| Mujer | Sí | 35,224 | 444,798 | 480,022 |
| | No | 378,058 | 693,064 | 1,071,122 |
| | Nunca ha fumado | 5,552,186 | 4,159,771 | 9,711,957 |
| | Total | 5,965,468 | 5,297,633 | 11,263,101 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución de la población de 10 a 19 años según consumo de 5 cajetillas de cigarros o más en su vida por grupos de edad y sexo**

| Sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Sí | 1.6 | 21.9 | 10.8 |
| | No | 8.6 | 15.9 | 11.9 |
| | Nunca ha fumado | 89.9 | 62.2 | 77.3 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Sí | 0.6 | 8.4 | 4.3 |
| | No | 6.3 | 13.1 | 9.5 |
| | Nunca ha fumado | 93.1 | 78.5 | 86.2 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 10 a 19 años según consumo de 5 cajetillas de cigarros o más en su vida**

| Consumo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nunca ha fumado | 9,258,420 | 41.8 |
| Sí | 2,047,794 | 9.2 |
| No | 9,785,347 | 44.2 |
| No responde | 1,061,669 | 4.8 |
| Total | 22,153,230 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Población de 10 a 19 años según consumo de 5 cajetillas de cigarros o más en su vida por grupos de edad y sexo**

| Sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Nunca ha fumado | 2,775,519 | 1,337,295 | 4,112,814 |
| | Sí | 166,821 | 1,342,952 | 1,509,773 |
| | No | 2,566,804 | 2,242,012 | 4,808,816 |
| | No responde | 243,800 | 423,989 | 667,789 |
| | Total | 5,752,944 | 5,346,248 | 11,099,192 |
| Mujer | Nunca ha fumado | 2,962,575 | 2,183,031 | 5,145,606 |
| | Sí | 72,422 | 465,599 | 538,021 |
| | No | 2,429,552 | 2,546,979 | 4,976,531 |
| | No responde | 140,605 | 253,275 | 393,880 |
| | Total | 5,605,154 | 5,448,884 | 11,054,038 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de Población de 10 a 19 años según consumo de 5 cajetillas de cigarros o más en su vida por grupos de edad y sexo**

| Sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Nunca ha fumado | 48.2 | 25.0 | 37.1 |
| | Sí | 2.9 | 25.1 | 13.6 |
| | No | 44.6 | 41.9 | 43.3 |
| | No responde | 4.2 | 7.9 | 6.0 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Nunca ha fumado | 52.9 | 40.1 | 46.5 |
| | Sí | 1.3 | 8.5 | 4.9 |
| | No | 43.3 | 46.7 | 45.0 |
| | No responde | 2.5 | 4.6 | 3.6 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 10 a 19 años según consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida**

| Consumo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nunca ha tomado | 18,818,318 | 82.3 |
| Sí | 2,499,876 | 10.9 |
| No | 1,556,776 | 6.8 |
| Total | 22,874,970 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Población de 10 a 19 años según consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida por grupos de edad y sexo**

| sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Nunca ha tomado | 5,923,208 | 3,198,809 | 9,122,017 |
| | Sí | 184,279 | 1,445,133 | 1,629,412 |
| | No | 217,814 | 642,626 | 860,440 |
| | Total | 6,325,301 | 5,286,568 | 11,611,869 |
| Mujer | Nunca ha tomado | 5,654,173 | 4,042,128 | 9,696,301 |
| | Sí | 106,439 | 764,025 | 870,464 |
| | No | 204,856 | 491,480 | 696,336 |
| | Total | 5,965,468 | 5,297,633 | 11,263,101 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución de la población de 10 a 19 años según consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida por grupos de edad y sexo**

| sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Nunca ha tomado | 93.6 | 60.5 | 78.6 |
| | Sí | 2.9 | 27.3 | 14.0 |
| | No | 3.4 | 12.2 | 7.4 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Nunca ha tomado | 94.8 | 76.3 | 86.1 |
| | Sí | 1.8 | 14.4 | 7.7 |
| | No | 3.4 | 9.3 | 6.2 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 10 a 19 años según consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida**

| Consumo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nunca toma | 15,503,608 | 70.0 |
| 1 a 2 veces al año | 3,001,559 | 13.5 |
| 3 a 6 veces al año | 560,379 | 2.5 |
| 7 a 11 veces al año | 264,276 | 1.2 |
| Una vez al mes | 628,556 | 2.8 |
| 2 o 3 veces al mes | 586,518 | 2.6 |
| 1 a 2 veces por | 361,881 | 1.6 |
| 3 a 4 veces por | 72,268 | .3 |
| Diariamente | 28,790 | .1 |
| No sabe | 16,302 | .1 |
| No responde | 1,129,093 | 5.1 |
| Total | 22,153,230 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Población de 10 a 19 años según consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida por grupos de edad y sexo**

| sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Nunca toma | 4,848,807 | 2,287,052 | 7,135,859 |
| | 1 a 2 veces al año | 496,761 | 934,661 | 1,431,422 |
| | 3 a 6 veces al año | 43,197 | 295,112 | 338,309 |
| | 7 a 11 veces al año | 10,310 | 147,459 | 157,769 |
| | Una vez al mes | 37,526 | 424,380 | 461,906 |
| | 2 o 3 veces al mes | 18,269 | 469,655 | 487,924 |
| | 1 a 2 veces por semana | 33,191 | 256,817 | 290,008 |
| | 3 a 4 veces por semana | 3,305 | 55,842 | 59,147 |
| | Diariamente | 9,394 | 13,994 | 23,388 |
| | No sabe | 7,022 | 7,337 | 14,359 |
| | No responde | 245,162 | 453,939 | 699,101 |
| | Total | 5,752,944 | 5,346,248 | 11,099,192 |
| Mujer | Nunca toma | 4,973,905 | 3,393,844 | 8,367,749 |
| | 1 a 2 veces al año | 396,363 | 1,173,774 | 1,570,137 |
| | 3 a 6 veces al año | 25,661 | 196,409 | 222,070 |
| | 7 a 11 veces al año | 17,508 | 88,999 | 106,507 |
| | Una vez al mes | 17,188 | 149,462 | 166,650 |
| | 2 o 3 veces al mes | 8,010 | 90,584 | 98,594 |
| | 1 a 2 veces por semana | 16,910 | 54,963 | 71,873 |
| | 3 a 4 veces por semana | 363 | 12,758 | 13,121 |
| | Diariamente | 1,421 | 3,981 | 5,402 |
| | No sabe | 145 | 1,798 | 1,943 |
| | No responde | 147,680 | 282,312 | 429,992 |
| | Total | 5,605,154 | 5,448,884 | 11,054,038 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de Población de 10 a 19 años según consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida por grupos de edad y sexo**

| sexo | Consumo | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Nunca toma | 84.3 | 42.8 | 64.3 |
| | 1 a 2 veces al año | 8.6 | 17.5 | 12.9 |
| | 3 a 6 veces al año | 0.8 | 5.5 | 3.0 |
| | 7 a 11 veces al año | 0.2 | 2.8 | 1.4 |
| | Una vez al mes | 0.7 | 7.9 | 4.2 |
| | 2 o 3 veces al mes | 0.3 | 8.8 | 4.4 |
| | 1 a 2 veces por semana | 0.6 | 4.8 | 2.6 |
| | 3 a 4 veces por semana | 0.1 | 1.0 | 0.5 |
| | Diariamente | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| | No sabe | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | No responde | 4.3 | 8.5 | 6.3 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Nunca toma | 88.7 | 62.3 | 75.7 |
| | 1 a 2 veces al año | 7.1 | 21.5 | 14.2 |
| | 3 a 6 veces al año | 0.5 | 3.6 | 2.0 |
| | 7 a 11 veces al año | 0.3 | 1.6 | 1.0 |
| | Una vez al mes | 0.3 | 2.7 | 1.5 |
| | 2 o 3 veces al mes | 0.1 | 1.7 | 0.9 |
| | 1 a 2 veces por semana | 0.3 | 1.0 | 0.7 |
| | 3 a 4 veces por semana | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| | Diariamente | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| | No sabe | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | No responde | 2.6 | 5.2 | 3.9 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pastillas o píldoras | 10,441,518 | 71.0 |
| Dispositivo, DIU o aparatito | 705,167 | 4.8 |
| Inyecciones | 259,465 | 1.8 |
| Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | 86,958 | .6 |
| Preservativo o condón | 2,977,064 | 20.2 |
| Operación femenina o OTB | 24,315 | .2 |
| Operación masculina o vasectomía | 8,708 | .1 |
| Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | 18,601 | .1 |
| Retiro o coito interrumpido | 653 | .0 |
| Pastilla de emergencia | 12,467 | .1 |
| Otro | 19,873 | .1 |
| No responde | 157,452 | 1.1 |
| Total | 14,712,241 | 100.0 |

Fuente: Dirección de Estadísticas DF con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método y sexo**

| sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Pastillas o píldoras | 1,543,818 | 3,160,013 | 4,703,831 |
| | Dispositivo, DIU o aparatito | 77,062 | 228,368 | 305,430 |
| | Inyecciones | 52,242 | 60,754 | 112,996 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | 19,234 | 31,111 | 50,345 |
| | Preservativo o condón | 950,286 | 1,093,551 | 2,043,837 |
| | Operación femenina o OTB | 3,048 | 16,610 | 19,658 |
| | Operación masculina o vasectomía | 4,490 | 868 | 5,358 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | 1,664 | 5,140 | 6,804 |
| | Retiro o coito interrumpido | 653 | 0 | 653 |
| | Pastilla de emergencia | 4,970 | 1,090 | 6,060 |
| | Otro | 6,875 | 4,231 | 11,106 |
| | No responde | 51,992 | 15,933 | 67,925 |
| | Total | 2,716,334 | 4,617,669 | 7,334,003 |
| Mujer | Pastillas o píldoras | 1,767,680 | 3,970,007 | 5,737,687 |
| | Dispositivo, DIU o aparatito | 120,181 | 279,556 | 399,737 |
| | Inyecciones | 54,759 | 91,710 | 146,469 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | 20,822 | 15,791 | 36,613 |
| | Preservativo o condón | 514,189 | 419,038 | 933,227 |
| | Operación femenina o OTB | 2,146 | 2,511 | 4,657 |
| | Operación masculina o vasectomía | 2,838 | 512 | 3,350 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | 11,323 | 474 | 11,797 |
| | Pastilla de emergencia | 3,440 | 2,967 | 6,407 |
| | Otro | 6,210 | 2,557 | 8,767 |
| | No responde | 66,876 | 22,651 | 89,527 |
| | Total | 2,570,464 | 4,807,774 | 7,378,238 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución de los adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método y sexo**

| sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Pastillas o píldoras | 56.8 | 68.4 | 64.1 |
| | Dispositivo, DIU o aparatito | 2.8 | 4.9 | 4.2 |
| | Inyecciones | 1.9 | 1.3 | 1.5 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| | Preservativo o condón | 35.0 | 23.7 | 27.9 |
| | Operación femenina o OTB | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
| | Operación masculina o vasectomía | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Retiro o coito interrumpido | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Pastilla de emergencia | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| | Otro | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| | No responde | 1.9 | 0.3 | 0.9 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Pastillas o píldoras | 68.8 | 82.6 | 77.8 |
| | Dispositivo, DIU o aparatito | 4.7 | 5.8 | 5.4 |
| | Inyecciones | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
| | Preservativo o condón | 20.0 | 8.7 | 12.6 |
| | Operación femenina o OTB | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Operación masculina o vasectomía | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| | Pastilla de emergencia | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Otro | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| | No responde | 2.6 | 0.5 | 1.2 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pastillas o pildoras | 4,589,314 | 40.0 |
| Dispositivo, DIU, aparatito | 790,978 | 6.9 |
| Inyecciones | 224,137 | 2.0 |
| Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 115,755 | 1.0 |
| Preservativo o condón | 5,231,973 | 45.6 |
| Operación femenina u OTB | 143,603 | 1.3 |
| Operación masculina o vasectomía | 83,599 | .7 |
| Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | 78,862 | .7 |
| Retiro o coito interrumpido | 16,850 | .1 |
| Otro | 41,821 | .4 |
| No responde | 151,346 | 1.3 |
| Total | 11,468,238 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método y sexo**

| Sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Pastillas o pildoras | 462,310 | 1,062,445 | 1,524,755 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | 28,479 | 151,149 | 179,628 |
| | Inyecciones | 19,075 | 28,564 | 47,639 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 11,972 | 42,466 | 54,438 |
| | Preservativo o condón | 1,021,252 | 2,378,717 | 3,399,969 |
| | Operación femenina u OTB | 28,621 | 37,705 | 66,326 |
| | Operación masculina o vasectomía | 17,065 | 45,287 | 62,352 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | 2,567 | 28,597 | 31,164 |
| | Retiro o coito interrumpido | 1,697 | 2,364 | 4,061 |
| | Otro | 10,948 | 13,976 | 24,924 |
| | No responde | 26,985 | 18,980 | 45,965 |
| | Total | 1,630,971 | 3,810,250 | 5,441,221 |
| Mujer | Pastillas o pildoras | 922,064 | 2,142,495 | 3,064,559 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | 82,789 | 528,561 | 611,350 |
| | Inyecciones | 39,416 | 137,082 | 176,498 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 13,920 | 47,397 | 61,317 |
| | Preservativo o condón | 715,157 | 1,116,847 | 1,832,004 |
| | Operación femenina u OTB | 45,501 | 31,776 | 77,277 |
| | Operación masculina o vasectomía | 5,180 | 16,067 | 21,247 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | 5,946 | 41,752 | 47,698 |
| | Retiro o coito interrumpido | 2,239 | 10,550 | 12,789 |
| | Otro | 12,977 | 3,920 | 16,897 |
| | No responde | 58,986 | 46,395 | 105,381 |
| | Total | 1,904,175 | 4,122,842 | 6,027,017 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de Adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método y sexo**

| Sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Pastillas o pildoras | 28.3 | 27.9 | 28.0 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | 1.7 | 4.0 | 3.3 |
| | Inyecciones | 1.2 | 0.7 | 0.9 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 0.7 | 1.1 | 1.0 |
| | Preservativo o condón | 62.6 | 62.4 | 62.5 |
| | Operación femenina u OTB | 1.8 | 1.0 | 1.2 |
| | Operación masculina o vasectomía | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| | Retiro o coito interrumpido | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Otro | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| | No responde | 1.7 | 0.5 | 0.8 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Pastillas o pildoras | 48.4 | 52.0 | 50.8 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | 4.3 | 12.8 | 10.1 |
| | Inyecciones | 2.1 | 3.3 | 2.9 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 0.7 | 1.1 | 1.0 |
| | Preservativo o condón | 37.6 | 27.1 | 30.4 |
| | Operación femenina u OTB | 2.4 | 0.8 | 1.3 |
| | Operación masculina o vasectomía | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | 0.3 | 1.0 | 0.8 |
| | Retiro o coito interrumpido | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| | Otro | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
| | No responde | 3.1 | 1.1 | 1.7 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente:Elaboación propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pastillas o píldoras | 158,409 | 6.1 |
| Pastilla o píldora de emergencia o del día después | 13,220 | .5 |
| Inyecciones | 17,399 | .7 |
| Norplant, tubitos o implantes | 656 | .0 |
| Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | 2,277 | .1 |
| Preservativo o condón | 1,288,832 | 49.7 |
| Dispositivo, DIU, o aparatito | 3,592 | .1 |
| Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | 10,941 | .4 |
| Retiro o coito interrumpido | 6,349 | .2 |
| Otro | 3,002 | .1 |
| Nada | 1,075,275 | 41.5 |
| No responde | 12,643 | .5 |
| Total | 2,592,595 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual por sexo**

| sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Pastillas o píldoras | 244 | 97,864 | 98,108 |
| | Pastilla o píldora de emergencia o del día después | - | 7,401 | 7,401 |
| | Inyecciones | - | 5,375 | 5,375 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | - | 100 | 100 |
| | Preservativo o condón | 19,463 | 869,035 | 888,498 |
| | Dispositivo, DIU, o aparatito | 336 | 826 | 1,162 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | - | 8,283 | 8,283 |
| | Retiro o coito interrumpido | - | 3,729 | 3,729 |
| | Otro | - | 2,588 | 2,588 |
| | Nada | 9,414 | 419,251 | 428,665 |
| | No responde | - | 6,538 | 6,538 |
| | Total | 29,457 | 1,420,990 | 1,450,447 |
| Mujer | Pastillas o píldoras | 3,342 | 56,959 | 60,301 |
| | Pastilla o píldora de emergencia o del día después | 1,416 | 4,403 | 5,819 |
| | Inyecciones | 588 | 11,436 | 12,024 |
| | Norplant, tubitos o implantes | - | 656 | 656 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | - | 2,177 | 2,177 |
| | Preservativo o condón | 8,700 | 391,634 | 400,334 |
| | Dispositivo, DIU, o aparatito | - | 2,430 | 2,430 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | - | 2,658 | 2,658 |
| | Retiro o coito interrumpido | - | 2,620 | 2,620 |
| | Otro | - | 414 | 414 |
| | Nada | 19,918 | 626,692 | 646,610 |
| | No responde | - | 6,105 | 6,105 |
| | Total | 33,964 | 1,108,184 | 1,142,148 |

Fuente: Elaboración propiacon base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual por sexo**

| sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Pastillas o píldoras | 0.8 | 6.9 | 6.8 |
| | Pastilla o píldora de emergencia o del día después | - | 0.5 | 0.5 |
| | Inyecciones | - | 0.4 | 0.4 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | - | 0.0 | 0.0 |
| | Preservativo o condón | 66.1 | 61.2 | 61.3 |
| | Dispositivo, DIU, o aparatito | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | - | 0.6 | 0.6 |
| | Retiro o coito interrumpido | - | 0.3 | 0.3 |
| | Otro | - | 0.2 | 0.2 |
| | Nada | 32.0 | 29.5 | 29.6 |
| | No responde | - | 0.5 | 0.5 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Pastillas o píldoras | 9.8 | 5.1 | 5.3 |
| | Pastilla o píldora de emergencia o del día después | 4.2 | 0.4 | 0.5 |
| | Inyecciones | 1.7 | 1.0 | 1.1 |
| | Norplant, tubitos o implantes | - | 0.1 | 0.1 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | - | 0.2 | 0.2 |
| | Preservativo o condón | 25.6 | 35.3 | 35.1 |
| | Dispositivo, DIU, o aparatito | - | 0.2 | 0.2 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | - | 0.2 | 0.2 |
| | Retiro o coito interrumpido | - | 0.2 | 0.2 |
| | Otro | - | 0.0 | 0.0 |
| | Nada | 58.6 | 56.6 | 56.6 |
| | No responde | - | 0.6 | 0.5 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pastillas o pildoras | 4,589,314 | 40.0 |
| Dispositivo, DIU, aparatito | 790,978 | 6.9 |
| Inyecciones | 224,137 | 2.0 |
| Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 115,755 | 1.0 |
| Preservativo o condón | 5,231,973 | 45.6 |
| Operación femenina u OTB | 143,603 | 1.3 |
| Operación masculina o vasectomía | 83,599 | .7 |
| Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | 78,862 | .7 |
| Retiro o coito interrumpido | 16,850 | .1 |
| Otro | 41,821 | .4 |
| No responde | 151,346 | 1.3 |
| Total | 11,468,238 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método y sexo**

| Sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Pastillas o pildoras | 462,310 | 1,062,445 | 1,524,755 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | 28,479 | 151,149 | 179,628 |
| | Inyecciones | 19,075 | 28,564 | 47,639 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 11,972 | 42,466 | 54,438 |
| | Preservativo o condón | 1,021,252 | 2,378,717 | 3,399,969 |
| | Operación femenina u OTB | 28,621 | 37,705 | 66,326 |
| | Operación masculina o vasectomía | 17,065 | 45,287 | 62,352 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | 2,567 | 28,597 | 31,164 |
| | Retiro o coito interrumpido | 1,697 | 2,364 | 4,061 |
| | Otro | 10,948 | 13,976 | 24,924 |
| | No responde | 26,985 | 18,980 | 45,965 |
| | Total | 1,630,971 | 3,810,250 | 5,441,221 |
| Mujer | Pastillas o pildoras | 922,064 | 2,142,495 | 3,064,559 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | 82,789 | 528,561 | 611,350 |
| | Inyecciones | 39,416 | 137,082 | 176,498 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 13,920 | 47,397 | 61,317 |
| | Preservativo o condón | 715,157 | 1,116,847 | 1,832,004 |
| | Operación femenina u OTB | 45,501 | 31,776 | 77,277 |
| | Operación masculina o vasectomía | 5,180 | 16,067 | 21,247 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | 5,946 | 41,752 | 47,698 |
| | Retiro o coito interrumpido | 2,239 | 10,550 | 12,789 |
| | Otro | 12,977 | 3,920 | 16,897 |
| | No responde | 58,986 | 46,395 | 105,381 |
| | Total | 1,904,175 | 4,122,842 | 6,027,017 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de Adolescentes de 12 a 19 años de edad que han oído hablar de algún método anticonceptivo, según método y sexo**

| Sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Pastillas o pildoras | 28.3 | 27.9 | 28.0 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | 1.7 | 4.0 | 3.3 |
| | Inyecciones | 1.2 | 0.7 | 0.9 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 0.7 | 1.1 | 1.0 |
| | Preservativo o condón | 62.6 | 62.4 | 62.5 |
| | Operación femenina u OTB | 1.8 | 1.0 | 1.2 |
| | Operación masculina o vasectomía | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| | Retiro o coito interrumpido | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Otro | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| | No responde | 1.7 | 0.5 | 0.8 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Pastillas o pildoras | 48.4 | 52.0 | 50.8 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | 4.3 | 12.8 | 10.1 |
| | Inyecciones | 2.1 | 3.3 | 2.9 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 0.7 | 1.1 | 1.0 |
| | Preservativo o condón | 37.6 | 27.1 | 30.4 |
| | Operación femenina u OTB | 2.4 | 0.8 | 1.3 |
| | Operación masculina o vasectomía | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | 0.3 | 1.0 | 0.8 |
| | Retiro o coito interrumpido | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| | Otro | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
| | No responde | 3.1 | 1.1 | 1.7 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente:Elaboación propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pastillas o píldoras | 158,409 | 6.1 |
| Pastilla o píldora de emergencia o del día después | 13,220 | .5 |
| Inyecciones | 17,399 | .7 |
| Norplant, tubitos o implantes | 656 | .0 |
| Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | 2,277 | .1 |
| Preservativo o condón | 1,288,832 | 49.7 |
| Dispositivo, DIU, o aparatito | 3,592 | .1 |
| Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | 10,941 | .4 |
| Retiro o coito interrumpido | 6,349 | .2 |
| Otro | 3,002 | .1 |
| Nada | 1,075,275 | 41.5 |
| No responde | 12,643 | .5 |
| Total | 2,592,595 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual por sexo**

| sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Pastillas o píldoras | 244 | 97,864 | 98,108 |
| | Pastilla o píldora de emergencia o del día después | - | 7,401 | 7,401 |
| | Inyecciones | - | 5,375 | 5,375 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | - | 100 | 100 |
| | Preservativo o condón | 19,463 | 869,035 | 888,498 |
| | Dispositivo, DIU, o aparatito | 336 | 826 | 1,162 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | - | 8,283 | 8,283 |
| | Retiro o coito interrumpido | - | 3,729 | 3,729 |
| | Otro | - | 2,588 | 2,588 |
| | Nada | 9,414 | 419,251 | 428,665 |
| | No responde | - | 6,538 | 6,538 |
| | Total | 29,457 | 1,420,990 | 1,450,447 |
| Mujer | Pastillas o píldoras | 3,342 | 56,959 | 60,301 |
| | Pastilla o píldora de emergencia o del día después | 1,416 | 4,403 | 5,819 |
| | Inyecciones | 588 | 11,436 | 12,024 |
| | Norplant, tubitos o implantes | - | 656 | 656 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | - | 2,177 | 2,177 |
| | Preservativo o condón | 8,700 | 391,634 | 400,334 |
| | Dispositivo, DIU, o aparatito | - | 2,430 | 2,430 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | - | 2,658 | 2,658 |
| | Retiro o coito interrumpido | - | 2,620 | 2,620 |
| | Otro | - | 414 | 414 |
| | Nada | 19,918 | 626,692 | 646,610 |
| | No responde | - | 6,105 | 6,105 |
| | Total | 33,964 | 1,108,184 | 1,142,148 |

Fuente: Elaboración propiacon base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual por sexo**

| sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Pastillas o píldoras | 0.8 | 6.9 | 6.8 |
| | Pastilla o píldora de emergencia o del día después | - | 0.5 | 0.5 |
| | Inyecciones | - | 0.4 | 0.4 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | - | 0.0 | 0.0 |
| | Preservativo o condón | 66.1 | 61.2 | 61.3 |
| | Dispositivo, DIU, o aparatito | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | - | 0.6 | 0.6 |
| | Retiro o coito interrumpido | - | 0.3 | 0.3 |
| | Otro | - | 0.2 | 0.2 |
| | Nada | 32.0 | 29.5 | 29.6 |
| | No responde | - | 0.5 | 0.5 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Pastillas o píldoras | 9.8 | 5.1 | 5.3 |
| | Pastilla o píldora de emergencia o del día después | 4.2 | 0.4 | 0.5 |
| | Inyecciones | 1.7 | 1.0 | 1.1 |
| | Norplant, tubitos o implantes | - | 0.1 | 0.1 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafragma | - | 0.2 | 0.2 |
| | Preservativo o condón | 25.6 | 35.3 | 35.1 |
| | Dispositivo, DIU, o aparatito | - | 0.2 | 0.2 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billin | - | 0.2 | 0.2 |
| | Retiro o coito interrumpido | - | 0.2 | 0.2 |
| | Otro | - | 0.0 | 0.0 |
| | Nada | 58.6 | 56.6 | 56.6 |
| | No responde | - | 0.6 | 0.5 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de los adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual**

| Uso de condón | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nada | 1,698,082 | 63.2 |
| Pastillas o pildoras | 58,568 | 2.2 |
| Dispositivo, DIU, aparatito | 4,544 | .2 |
| Inyecciones | 6,823 | .3 |
| Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 4,200 | .2 |
| Preservativo o condón | 820,356 | 30.5 |
| Operación femenina u OTB | 130 | .0 |
| Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | 22,226 | .8 |
| Retiro o coito interrumpido | 33,033 | 1.2 |
| Otro | 2,405 | .1 |
| No responde | 36,818 | 1.4 |
| Total | 2,687,185 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual por sexo**

| Sexo | Uso de condón | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Nada | 27,789 | 615,930 | 643,719 |
| | Pastillas o pildoras | 1,343 | 41,173 | 42,516 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | - | 3,844 | 3,844 |
| | Inyecciones | - | 1,963 | 1,963 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 1,533 | 2,667 | 4,200 |
| | Preservativo o condón | 12,932 | 608,685 | 621,617 |
| | Operación femenina u OTB | - | 130 | 130 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | - | 6,495 | 6,495 |
| | Retiro o coito interrumpido | - | 12,074 | 12,074 |
| | Otro | - | 706 | 706 |
| | No responde | 988 | 16,462 | 17,450 |
| | Total | 44,585 | 1,310,129 | 1,354,714 |
| Mujer | Nada | 32,504 | 1,021,859 | 1,054,363 |
| | Pastillas o pildoras | 386 | 15,666 | 16,052 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | - | 700 | 700 |
| | Inyecciones | - | 4,860 | 4,860 |
| | Preservativo o condón | 5,079 | 193,660 | 198,739 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | - | 15,731 | 15,731 |
| | Retiro o coito interrumpido | 1,033 | 19,926 | 20,959 |
| | Otro | - | 1,699 | 1,699 |
| | No responde | - | 19,368 | 19,368 |
| | Total | 39,002 | 1,293,469 | 1,332,471 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de Adolescentes de 12 a 19 años, según uso de preservativo o condón en la primera relación sexual por sexo**

| Sexo | Uso de condón | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Nada | 62.3 | 47.0 | 47.5 |
| | Pastillas o pildoras | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | - | 0.3 | 0.3 |
| | Inyecciones | - | 0.1 | 0.1 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 3.4 | 0.2 | 0.3 |
| | Preservativo o condón | 29.0 | 46.5 | 45.9 |
| | Operación femenina u OTB | - | 0.0 | 0.0 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | - | 0.5 | 0.5 |
| | Retiro o coito interrumpido | - | 0.9 | 0.9 |
| | Otro | - | 0.1 | 0.1 |
| | No responde | 2.2 | 1.3 | 1.3 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Nada | 83.3 | 79.0 | 79.1 |
| | Pastillas o pildoras | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | - | 0.1 | 0.1 |
| | Inyecciones | - | 0.4 | 0.4 |
| | Preservativo o condón | 13.0 | 15.0 | 14.9 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | - | 1.2 | 1.2 |
| | Retiro o coito interrumpido | 2.6 | 1.5 | 1.6 |
| | Otro | - | 0.1 | 0.1 |
| | No responde | - | 1.5 | 1.5 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de mujeres de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, según si han estado embarazadas alguna vez**

| | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 695,108 | 60.9 |
| No | 446,672 | 39.1 |
| No responde | 368 | .0 |
| Total | 1,142,148 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Mujeres de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, según si han estado embarazadas alguna vez**

| | Grupos quinquenales | | |
|---|---|---|---|
| | 10 a 14 años | 15 a 19 años | Total |
| Sí | 8,895 | 686,213 | 695,108 |
| No | 25,069 | 421,603 | 446,672 |
| No responde | - | 368 | 368 |
| Total | 33,964 | 1,108,184 | 1,142,148 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución de Mujeres de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, según si han estado embarazadas alguna vez**

| | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|
| | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Sí | 26.2 | 61.9 | 60.9 |
| No | 73.8 | 38.0 | 39.1 |
| No responde | - | 0.0 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de mujeres de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, según si han estado embarazadas alguna vez**

| Embarazos | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 729,589 | 54.2 |
| No | 579,633 | 43.0 |
| No responde | 38,096 | 2.8 |
| Total | 1,347,318 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional.Mujeres de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, según si han estado embarazadas alguna vez**

| Sexo | Embarazos | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Sí | - | 185 | 185 |
| | No responde | 1,132 | 9,596 | 10,728 |
| | Total | 1,132 | 9,781 | 10,913 |
| Mujer | Sí | 5,469 | 723,935 | 729,404 |
| | No | 34,151 | 545,482 | 579,633 |
| | No responde | 13,586 | 13,782 | 27,368 |
| | Total | 53,206 | 1,283,199 | 1,336,405 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de Mujeres de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, según si han estado embarazadas alguna vez**

| Sexo | Embarazos | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Sí | - | 1.9 | 1.7 |
| | No responde | 100.0 | 98.1 | 98.3 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Sí | 10.3 | 56.4 | 54.6 |
| | No | 64.2 | 42.5 | 43.4 |
| | No responde | 25.5 | 1.1 | 2.0 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propiacon base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de las mujeres de 12 a 19 años que fueron revisadas durante su embarazo por personal médico**

| Personal que reviso | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nadie | 1,514 | .3 |
| Médico | 464,418 | 95.8 |
| Enfermera | 6,835 | 1.4 |
| Promotora, Aux. o asistente de salud | 2,346 | .5 |
| Partera | 9,903 | 2.0 |
| Total | 485,016 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Mujeres de 12 a 19 años que fueron revisadas durante su embarazo por personal médico**

| Personal que reviso | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|
| | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Nadie | - | 1,514 | 1,514 |
| Médico | 1,622 | 462,796 | 464,418 |
| Enfermera | 878 | 5,957 | 6,835 |
| Promotora, Aux. o asistente de salud | - | 2,346 | 2,346 |
| Partera | 1,122 | 8,781 | 9,903 |
| Total | 3,622 | 481,394 | 485,016 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución de mujeres de 12 a 19 años que fueron revisadas durante su embarazo por personal médico**

| Personal que reviso | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|
| | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Nadie | - | 0.3 | 0.3 |
| Médico | 44.8 | 96.1 | 95.8 |
| Enfermera | 24.2 | 1.2 | 1.4 |
| Promotora, Aux. o asistente de salud | - | 0.5 | 0.5 |
| Partera | 31.0 | 1.8 | 2.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de las mujeres de 12 a 19 años que fueron revisadas durante su embarazo por personal médico**

| Personal que revisó | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nadie | 28,592 | 4.6 |
| Médico | 543,494 | 87.7 |
| Enfermera | 9,537 | 1.5 |
| Promotora, auxiliar o asist. de salud | 2,529 | .4 |
| Partera | 33,155 | 5.3 |
| No responde | 2,440 | .4 |
| Total | 619,747 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Mujeres de 12 a 19 años que fueron revisadas durante su embarazo por personal médico**

| Personal que revisó | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|
| | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Nadie | 0 | 28,592 | 28,592 |
| Médico | 3,362 | 540,132 | 543,494 |
| Enfermera | 0 | 9,537 | 9,537 |
| Promotora, auxiliar o asist. de salud | 0 | 2,529 | 2,529 |
| Partera | 539 | 32,616 | 33,155 |
| No responde | 0 | 2,440 | 2,440 |
| Total | 3,901 | 615,846 | 619,747 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de Mujeres de 12 a 19 años que fueron revisadas durante su embarazo por personal médico**

| Personal que revisó | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|
| | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Nadie | 0.0 | 4.6 | 4.6 |
| Médico | 86.2 | 87.7 | 87.7 |
| Enfermera | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| Promotora, auxiliar o asist. de salud | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Partera | 13.8 | 5.3 | 5.3 |
| No responde | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de adolescentes de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, que utilizan algún método para no tener hijos por sexo**

| sexo | | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Sí | 33 | 29.3 | 29.4 |
| | No | 22.6 | 35.8 | 35.5 |
| | Está embarazada | 4 | 2.4 | 2.4 |
| | No tiene pareja | 40 | 32.5 | 32.7 |
| | Total | 100 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Sí | 14 | 35.2 | 34.5 |
| | No | 50.9 | 39.0 | 39.4 |
| | Está embarazada | 16 | 8.4 | 8.7 |
| | No tiene pareja | 19 | 17.4 | 17.4 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente:Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de adolescentes de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, que utilizan algún método para no tener hijos**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Operación femenina u OTB | 4,339 | .7 |
| Pastillas o pildoras | 94,112 | 14.5 |
| Inyecciones | 59,689 | 9.2 |
| Dispositivo, DIU, aparatito | 210,325 | 32.5 |
| Preservativo o condón | 183,288 | 28.3 |
| Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 864 | .1 |
| Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | 27,854 | 4.3 |
| Retiro o coito interrumpido | 26,207 | 4.0 |
| Otro | 30,919 | 4.8 |
| No responde | 9,950 | 1.5 |
| Total | 647,547 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Adolescentes de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, que utilizan algún método para no tener hijos por sexo**

| Sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Operación femenina u OTB | - | 3,352 | 3,352 |
| | Pastillas o pildoras | 4,572 | 38,322 | 42,894 |
| | Inyecciones | - | 12,210 | 12,210 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | 1,003 | 32,681 | 33,684 |
| | Preservativo o condón | 3,342 | 94,443 | 97,785 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | - | 728 | 728 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | - | 10,080 | 10,080 |
| | Retiro o coito interrumpido | - | 7,269 | 7,269 |
| | Otro | - | 16,383 | 16,383 |
| | No responde | - | 4,873 | 4,873 |
| | Total | 8,917 | 220,341 | 229,258 |
| Mujer | Operación femenina u OTB | - | 987 | 987 |
| | Pastillas o pildoras | 386 | 50,832 | 51,218 |
| | Inyecciones | 1,652 | 45,827 | 47,479 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | 2,247 | 174,394 | 176,641 |
| | Preservativo o condón | 172 | 85,331 | 85,503 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 136 | - | 136 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | - | 17,774 | 17,774 |
| | Retiro o coito interrumpido | 759 | 18,179 | 18,938 |
| | Otro | - | 14,536 | 14,536 |
| | No responde | 432 | 4,645 | 5,077 |
| | Total | 5,784 | 412,505 | 418,289 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de Adolescentes de 12 a 19 años con inicio de vida sexual, que utilizan algún método para no tener hijos por sexo**

| Sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Operación femenina u OTB | - | 1.5 | 1.5 |
| | Pastillas o pildoras | 51.3 | 17.4 | 18.7 |
| | Inyecciones | - | 5.5 | 5.3 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | 11.2 | 14.8 | 14.7 |
| | Preservativo o condón | 37.5 | 42.9 | 42.7 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | - | 0.3 | 0.3 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | - | 4.6 | 4.4 |
| | Retiro o coito interrumpido | - | 3.3 | 3.2 |
| | Otro | - | 7.4 | 7.1 |
| | No responde | - | 2.2 | 2.1 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Operación femenina u OTB | - | 0.2 | 0.2 |
| | Pastillas o pildoras | 6.7 | 12.3 | 12.2 |
| | Inyecciones | 28.6 | 11.1 | 11.4 |
| | Dispositivo, DIU, aparatito | 38.8 | 42.3 | 42.2 |
| | Preservativo o condón | 3.0 | 20.7 | 20.4 |
| | Ovulos, jaleas, espumas o diafrágma | 2.4 | - | 0.0 |
| | Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, Billin | - | 4.3 | 4.2 |
| | Retiro o coito interrumpido | 13.1 | 4.4 | 4.5 |
| | Otro | - | 3.5 | 3.5 |
| | No responde | 7.5 | 1.1 | 1.2 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de adolescentes de 12 a 19 años, según conocimiento de algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Condones? | 14,005,829 | 77.8 |
| Retiro o venirse afuera? | 52,496 | .3 |
| Pastillas o píldoras? | 169,419 | .9 |
| Lavado vaginal? | 53,163 | .3 |
| Ritmo o calendario? | 14,292 | .1 |
| Tomar té de hierbas? | 22,133 | .1 |
| Relaciones sólo con tu pareja? | 427,245 | 2.4 |
| No tener relaciones sexuales? | 1,372,915 | 7.6 |
| Otro? | 80,611 | .4 |
| No responde | 1,794,078 | 10.0 |
| Total | 17,992,181 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Adolescentes de 12 a 19 años, según conocimiento de algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual por sexo y grupos de edad**

| sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Condones? | 2,749,159 | 4,569,621 | 7,318,780 |
| | Retiro o venirse afuera? | 17,158 | 18,097 | 35,255 |
| | Pastillas o píldoras? | 43,088 | 33,089 | 76,177 |
| | Lavado vaginal? | 4,528 | 4,436 | 8,964 |
| | Ritmo o calendario? | 7,409 | 909 | 8,318 |
| | Tomar té de hierbas? | 3,466 | 4,622 | 8,088 |
| | Relaciones sólo con tu pareja? | 71,732 | 121,734 | 193,466 |
| | No tener relaciones sexuales? | 336,901 | 250,444 | 587,345 |
| | Otro? | 15,197 | 17,024 | 32,221 |
| | No responde | 652,950 | 266,592 | 919,542 |
| | Total | 3,901,588 | 5,286,568 | 9,188,156 |
| Mujer | Condones? | 2,286,169 | 4,400,880 | 6,687,049 |
| | Retiro o venirse afuera? | 8,577 | 8,664 | 17,241 |
| | Pastillas o píldoras? | 54,051 | 39,191 | 93,242 |
| | Lavado vaginal? | 19,180 | 25,019 | 44,199 |
| | Ritmo o calendario? | 4,041 | 1,933 | 5,974 |
| | Tomar té de hierbas? | 7,295 | 6,750 | 14,045 |
| | Relaciones sólo con tu pareja? | 109,017 | 124,762 | 233,779 |
| | No tener relaciones sexuales? | 383,874 | 401,696 | 785,570 |
| | Otro? | 29,714 | 18,676 | 48,390 |
| | No responde | 604,474 | 270,062 | 874,536 |
| | Total | 3,506,392 | 5,297,633 | 8,804,025 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de adolescentes de 12 a 19 años, según conocimiento de algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual por sexo y grupos de edad**

| sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Condones? | 70.5 | 86.4 | 79.7 |
| | Retiro o venirse afuera? | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| | Pastillas o píldoras? | 1.1 | 0.6 | 0.8 |
| | Lavado vaginal? | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Ritmo o calendario? | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| | Tomar té de hierbas? | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Relaciones sólo con tu pareja? | 1.8 | 2.3 | 2.1 |
| | No tener relaciones sexuales? | 8.6 | 4.7 | 6.4 |
| | Otro? | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| | No responde | 16.7 | 5.0 | 10.0 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Condones? | 65.2 | 83.1 | 76.0 |
| | Retiro o venirse afuera? | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | Pastillas o píldoras? | 1.5 | 0.7 | 1.1 |
| | Lavado vaginal? | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | Ritmo o calendario? | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| | Tomar té de hierbas? | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| | Relaciones sólo con tu pareja? | 3.1 | 2.4 | 2.7 |
| | No tener relaciones sexuales? | 10.9 | 7.6 | 8.9 |
| | Otro? | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
| | No responde | 17.2 | 5.1 | 9.9 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de adolescentes de 12 a 19 años, según conocimiento de algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Condón | 6,912,211 | 81.8 |
| No tener relaciones sexuales | 1,131,066 | 13.4 |
| Relaciones sólo con tu pareja | 294,104 | 3.5 |
| Otro | 38,496 | .5 |
| No responde | 73,571 | .9 |
| Total | 8,449,448 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Adolescentes de 12 a 19 años, según conocimiento de algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual por sexo y grupos de edad**

| Sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Condón | 994,835 | 2,750,554 | 3,745,389 |
| | No tener relaciones sexuales | 133,585 | 375,388 | 508,973 |
| | Relaciones sólo con tu pareja | 30,548 | 88,776 | 119,324 |
| | Otro | 9,055 | 7,442 | 16,497 |
| | No responde | 9,095 | 14,683 | 23,778 |
| | Total | 1,177,118 | 3,236,843 | 4,413,961 |
| Mujer | Condón | 841,297 | 2,325,525 | 3,166,822 |
| | No tener relaciones sexuales | 200,911 | 421,182 | 622,093 |
| | Relaciones sólo con tu pareja | 54,293 | 120,487 | 174,780 |
| | Otro | 11,018 | 10,981 | 21,999 |
| | No responde | 20,953 | 28,840 | 49,793 |
| | Total | 1,128,472 | 2,907,015 | 4,035,487 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución de Adolescentes de 12 a 19 años, según conocimiento de algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual por sexo y grupos de edad**

| Sexo | Método | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Condón | 84.5 | 85.0 | 84.9 |
| | No tener relaciones sexuales | 11.3 | 11.6 | 11.5 |
| | Relaciones sólo con tu pareja | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
| | Otro | 0.8 | 0.2 | 0.4 |
| | No responde | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Condón | 71.5 | 71.8 | 71.7 |
| | No tener relaciones sexuales | 17.1 | 13.0 | 14.1 |
| | Relaciones sólo con tu pareja | 4.6 | 3.7 | 4.0 |
| | Otro | 0.9 | 0.3 | 0.5 |
| | No responde | 1.8 | 0.9 | 1.1 |
| | Total | 95.9 | 89.8 | 91.4 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de los adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún accidente en los últimos 12 meses, según tipo de accidente**

| Tipo de accidente | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Choque de o entre vehículos de transporte | 150,381 | 7.5 |
| Atropellamiento | 47,287 | 2.4 |
| Otros accidentes de transporte | 75,657 | 3.8 |
| Caída de un mismo nivel | 756,026 | 37.6 |
| Caída de un nivel a otro | 430,537 | 21.4 |
| Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 280,294 | 13.9 |
| Exposición a fuerzas mecánicas animada | 104,333 | 5.2 |
| Exposición a corriente eléctrica, temperatura extrema | 5,261 | .3 |
| Exposición al fuego, humo y llamas | 24,412 | 1.2 |
| Contacto con calor y sustancias calientes | 23,065 | 1.1 |
| Exposición a fuerzas de la naturaleza | 873 | .0 |
| Contacto traumático con animales y plantas venenosas | 19,249 | 1.0 |
| Envenenamiento accidental | 6,213 | .3 |
| Ahogamiento y sumersión accidental | 824 | .0 |
| Otros accidentes que obstruyen la respiración | 1,918 | .1 |
| Exposición accidental a otros factores | 66,919 | 3.3 |
| No responde | 8,267 | .4 |
| No sabe | 8,742 | .4 |
| Total | 2,010,258 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún accidente en los últimos 12 meses, según tipo de accidente por sexo y grupos de edad**

| sexo | Tipo de accidente | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Choque de o entre vehículos de transporte | 39,381 | 48,990 | 88,371 |
| | Atropellamiento | 24,495 | 6,726 | 31,221 |
| | Otros accidentes de transporte | 16,921 | 22,528 | 39,449 |
| | Caída de un mismo nivel | 284,849 | 147,780 | 432,629 |
| | Caída de un nivel a otro | 189,065 | 85,213 | 274,278 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 115,914 | 94,782 | 210,696 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas animada | 29,956 | 48,359 | 78,315 |
| | Exposición a corriente eléctrica, temperatura extrema | 1,199 | 1,021 | 2,220 |
| | Exposición al fuego, humo y llamas | 3,290 | 8,166 | 11,456 |
| | Contacto con calor y sustancias calientes | 12,251 | 4,894 | 17,145 |
| | Exposición a fuerzas de la naturaleza | 873 | - | 873 |
| | Contacto traumático con animales y plantas venenosas | 12,744 | 4,060 | 16,804 |
| | Envenenamiento accidental | 829 | 1,059 | 1,888 |
| | Ahogamiento y sumersión accidental | 824 | - | 824 |
| | Otros accidentes que obstruyen la respiración | 681 | 219 | 900 |
| | Exposición accidental a otros factores | 11,132 | 35,802 | 46,934 |
| | No responde | - | 6,379 | 6,379 |
| | No sabe | 411 | 2,601 | 3,012 |
| | | 744,815 | 518,579 | 1,263,394 |
| Mujer | Choque de o entre vehículos de transporte | 25,008 | 37,002 | 62,010 |
| | Atropellamiento | 4,830 | 11,236 | 16,066 |
| | Otros accidentes de transporte | 9,056 | 27,152 | 36,208 |
| | Caída de un mismo nivel | 204,177 | 119,220 | 323,397 |
| | Caída de un nivel a otro | 98,353 | 57,906 | 156,259 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 47,856 | 21,742 | 69,598 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas animada | 16,789 | 9,229 | 26,018 |
| | Exposición a corriente eléctrica, temperatura extrema | 1,832 | 1,209 | 3,041 |
| | Exposición al fuego, humo y llamas | 10,774 | 2,182 | 12,956 |
| | Contacto con calor y sustancias calientes | 2,928 | 2,992 | 5,920 |
| | Contacto traumático con animales y plantas venenosas | 1,325 | 1,120 | 2,445 |
| | Envenenamiento accidental | 314 | 4,011 | 4,325 |
| | Otros accidentes que obstruyen la respiración | 884 | 134 | 1,018 |
| | Exposición accidental a otros factores | 15,067 | 4,918 | 19,985 |
| | No responde | 1,888 | - | 1,888 |
| | No sabe | 5,625 | 105 | 5,730 |
| | | 446,706 | 300,158 | 746,864 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de los adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún accidente en los últimos 12 meses, según tipo de accidente por sexo y grupos de edad**

| sexo | Tipo de accidente | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Choque de o entre vehículos de transporte | 5.3 | 9.4 | 7.0 |
| | Atropellamiento | 3.3 | 1.3 | 2.5 |
| | Otros accidentes de transporte | 2.3 | 4.3 | 3.1 |
| | Caída de un mismo nivel | 38.2 | 28.5 | 34.2 |
| | Caída de un nivel a otro | 25.4 | 16.4 | 21.7 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 15.6 | 18.3 | 16.7 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas animada | 4.0 | 9.3 | 6.2 |
| | Exposición a corriente eléctrica, temperatura extrema | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | Exposición al fuego, humo y llamas | 0.4 | 1.6 | 0.9 |
| | Contacto con calor y sustancias calientes | 1.6 | 0.9 | 1.4 |
| | Exposición a fuerzas de la naturaleza | 0.1 | - | 0.1 |
| | Contacto traumático con animales y plantas venenosas | 1.7 | 0.8 | 1.3 |
| | Envenenamiento accidental | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| | Ahogamiento y sumersión accidental | 0.1 | - | 0.1 |
| | Otros accidentes que obstruyen la respiración | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| | Exposición accidental a otros factores | 1.5 | 6.9 | 3.7 |
| | No responde | - | 1.2 | 0.5 |
| | No sabe | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Choque de o entre vehículos de transporte | 5.6 | 12.3 | 8.3 |
| | Atropellamiento | 1.1 | 3.7 | 2.2 |
| | Otros accidentes de transporte | 2.0 | 9.0 | 4.8 |
| | Caída de un mismo nivel | 45.7 | 39.7 | 43.3 |
| | Caída de un nivel a otro | 22.0 | 19.3 | 20.9 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 10.7 | 7.2 | 9.3 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas animada | 3.8 | 3.1 | 3.5 |
| | Exposición a corriente eléctrica, temperatura extrema | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| | Exposición al fuego, humo y llamas | 2.4 | 0.7 | 1.7 |
| | Contacto con calor y sustancias calientes | 0.7 | 1.0 | 0.8 |
| | Contacto traumático con animales y plantas venenosas | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| | Envenenamiento accidental | 0.1 | 1.3 | 0.6 |
| | Otros accidentes que obstruyen la respiración | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| | Exposición accidental a otros factores | 3.4 | 1.6 | 2.7 |
| | No responde | 0.4 | - | 0.3 |
| | No sabe | 1.3 | 0.0 | 0.8 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de los adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún accidente en los últimos 12 meses, según tipo de accidente**

| Tipo de accidente | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Accidente de transporte terrestre | 193,253 | 14.6 |
| Otros accidentes de transporte | 23,806 | 1.8 |
| Caída | 622,806 | 47.0 |
| Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 295,081 | 22.3 |
| Exposición a fuerzas mecánicas animadas | 79,687 | 6.0 |
| Ahogamiento sumersión accidental | 674 | .1 |
| Otros accidentes que obstruyen la respiración | 1,191 | .1 |
| Exposición a corriente electrica, radiación, temperatura y p | 3,063 | .2 |
| Exposición al fuego, humo y llamas | 5,479 | .4 |
| Contacto con calor y sustancias calientes | 16,570 | 1.3 |
| Contacto traumático y plantas venenosos | 16,157 | 1.2 |
| Exposición a fuerzas de la naturaleza | 1,381 | .1 |
| Envenenamiento accidental | 1,069 | .1 |
| Otro | 48,672 | 3.7 |
| No sabe | 300 | .0 |
| No responde | 16,373 | 1.2 |
| Total | 1,325,562 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún accidente en los últimos 12 meses, según tipo de accidente por sexo y grupos de edad**

| Sexo | Tipo de accidente | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Accidente de transporte terrestre | 54,830 | 76,382 | 131,212 |
| | Otros accidentes de transporte | 5,821 | 13,932 | 19,753 |
| | Caída | 297,551 | 127,056 | 424,607 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 99,576 | 97,904 | 197,480 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas animadas | 23,763 | 40,142 | 63,905 |
| | Ahogamiento sumersión accidental | - | 674 | 674 |
| | Otros accidentes que obstruyen la respiración | 602 | - | 602 |
| | Exposición a corriente electrica, radiación, temperatura y p | 834 | - | 834 |
| | Exposición al fuego, humo y llamas | 4,428 | 352 | 4,780 |
| | Contacto con calor y sustancias calientes | 6,958 | 3,815 | 10,773 |
| | Contacto traumático y plantas venenosos | 4,787 | 1,949 | 6,736 |
| | Envenenamiento accidental | - | 685 | 685 |
| | Otro | 14,972 | 9,248 | 24,220 |
| | No responde | 8,520 | 3,567 | 12,087 |
| | Total | 522,642 | 375,706 | 898,348 |
| Mujer | Accidente de transporte terrestre | 21,316 | 40,725 | 62,041 |
| | Otros accidentes de transporte | 462 | 3,591 | 4,053 |
| | Caída | 121,369 | 76,830 | 198,199 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 58,074 | 39,527 | 97,601 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas animadas | 13,105 | 2,677 | 15,782 |
| | Otros accidentes que obstruyen la respiración | 589 | - | 589 |
| | Exposición a corriente electrica, radiación, temperatura y p | 2,229 | - | 2,229 |
| | Exposición al fuego, humo y llamas | 699 | - | 699 |
| | Contacto con calor y sustancias calientes | 664 | 5,133 | 5,797 |
| | Contacto traumático y plantas venenosos | 5,743 | 3,678 | 9,421 |
| | Exposición a fuerzas de la naturaleza | - | 1,381 | 1,381 |
| | Envenenamiento accidental | - | 384 | 384 |
| | Otro | 12,385 | 12,067 | 24,452 |
| | No sabe | 300 | - | 300 |
| | No responde | 4,286 | - | 4,286 |
| | Total | 241,221 | 185,993 | 427,214 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de Adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún accidente en los últimos 12 meses, según tipo de accidente por sexo y grupos de edad**

| Sexo | Tipo de accidente | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Accidente de transporte terrestre | 10.5 | 20.3 | 14.6 |
| | Otros accidentes de transporte | 1.1 | 3.7 | 2.2 |
| | Caída | 56.9 | 33.8 | 47.3 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 19.1 | 26.1 | 22.0 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas animadas | 4.5 | 10.7 | 7.1 |
| | Ahogamiento sumersión accidental | - | 0.2 | 0.1 |
| | Otros accidentes que obstruyen la respiración | 0.1 | - | 0.1 |
| | Exposición a corriente electrica, radiación, temperatura y p | 0.2 | - | 0.1 |
| | Exposición al fuego, humo y llamas | 0.8 | 0.1 | 0.5 |
| | Contacto con calor y sustancias calientes | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
| | Contacto traumático y plantas venenosos | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| | Envenenamiento accidental | - | 0.2 | 0.1 |
| | Otro | 2.9 | 2.5 | 2.7 |
| | No responde | 1.6 | 0.9 | 1.3 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Accidente de transporte terrestre | 8.8 | 21.9 | 14.5 |
| | Otros accidentes de transporte | 0.2 | 1.9 | 0.9 |
| | Caída | 50.3 | 41.3 | 46.4 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas | 24.1 | 21.3 | 22.8 |
| | Exposición a fuerzas mecánicas animadas | 5.4 | 1.4 | 3.7 |
| | Otros accidentes que obstruyen la respiración | 0.2 | - | 0.1 |
| | Exposición a corriente electrica, radiación, temperatura y p | 0.9 | - | 0.5 |
| | Exposición al fuego, humo y llamas | 0.3 | - | 0.2 |
| | Contacto con calor y sustancias calientes | 0.3 | 2.8 | 1.4 |
| | Contacto traumático y plantas venenosos | 2.4 | 2.0 | 2.2 |
| | Exposición a fuerzas de la naturaleza | - | 0.7 | 0.3 |
| | Envenenamiento accidental | - | 0.2 | 0.1 |
| | Otro | 5.1 | 6.5 | 5.7 |
| | No sabe | 0.1 | - | 0.1 |
| | No responde | 1.8 | - | 1.0 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de los adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses, según tipo de agresión**

| Tipo de agresión | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Agresiones con substancias | 2,532 | .5 |
| Sofocación, estrangulamiento, Ahogamiento | 7,636 | 1.4 |
| Arma de fuego | 35,829 | 6.8 |
| Objetos cortantes | 43,812 | 8.3 |
| Empujón desde lugar elevado | 5,046 | 1.0 |
| Golpes, patadas, puñetazos | 312,796 | 59.0 |
| Agresión sexual | 24,143 | 4.6 |
| Otras agresiones o maltrato | 67,594 | 12.7 |
| Otro | 30,968 | 5.8 |
| Total | 530,356 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses, según tipo de agresión por sexo y grupos de edad**

| sexo | Tipo de agresión | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Agresiones con substancias | 280 | - | 280 |
| | Sofocación, estrangulamiento, Ahogamiento | 172 | 7,392 | 7,564 |
| | Arma de fuego | 1,012 | 33,037 | 34,049 |
| | Objetos cortantes | 3,565 | 25,336 | 28,901 |
| | Empujón desde lugar elevado | 1,308 | 847 | 2,155 |
| | Golpes, patadas, puñetazos | 106,420 | 150,865 | 257,285 |
| | Agresión sexual | - | 1,100 | 1,100 |
| | Otras agresiones o maltrato | 8,136 | 29,062 | 37,198 |
| | Otro | 7,964 | 8,676 | 16,640 |
| | Total | 128,857 | 256,315 | 385,172 |
| Mujer | Agresiones con substancias | 2,252 | - | 2,252 |
| | Sofocación, estrangulamiento, Ahogamiento | 72 | - | 72 |
| | Arma de fuego | 1,028 | 752 | 1,780 |
| | Objetos cortantes | 3,280 | 11,631 | 14,911 |
| | Empujón desde lugar elevado | 2,891 | - | 2,891 |
| | Golpes, patadas, puñetazos | 31,118 | 24,393 | 55,511 |
| | Agresión sexual | 6,399 | 16,644 | 23,043 |
| | Otras agresiones o maltrato | 13,952 | 16,444 | 30,396 |
| | Otro | 576 | 13,752 | 14,328 |
| | Total | 61,568 | 83,616 | 145,184 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de los adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses, según tipo de agresión por sexo y grupos de edad**

| sexo | Tipo de agresión | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 a 14 años | 15 a 19 años | |
| Hombre | Agresiones con substancias | 0.2 | - | 0.1 |
| | Sofocación, estrangulamiento, Ahogamiento | 0.1 | 2.9 | 2.0 |
| | Arma de fuego | 0.8 | 12.9 | 8.8 |
| | Objetos cortantes | 2.8 | 9.9 | 7.5 |
| | Empujón desde lugar elevado | 1.0 | 0.3 | 0.6 |
| | Golpes, patadas, puñetazos | 82.6 | 58.9 | 66.8 |
| | Agresión sexual | - | 0.4 | 0.3 |
| | Otras agresiones o maltrato | 6.3 | 11.3 | 9.7 |
| | Otro | 6.2 | 3.4 | 4.3 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Agresiones con substancias | 3.7 | - | 1.6 |
| | Sofocación, estrangulamiento, Ahogamiento | 0.1 | - | 0.0 |
| | Arma de fuego | 1.7 | 0.9 | 1.2 |
| | Objetos cortantes | 5.3 | 13.9 | 10.3 |
| | Empujón desde lugar elevado | 4.7 | - | 2.0 |
| | Golpes, patadas, puñetazos | 50.5 | 29.2 | 38.2 |
| | Agresión sexual | 10.4 | 19.9 | 15.9 |
| | Otras agresiones o maltrato | 22.7 | 19.7 | 20.9 |
| | Otro | 0.9 | 16.4 | 9.9 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de los adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses, según tipo de agresión**

| Tipo de agresión | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Robo, asalto | 101,001 | 28.6 |
| Incidente de tránsito | 11,029 | 3.1 |
| Agresión sin motivo aparente | 146,888 | 41.6 |
| Secuestro | 1,717 | .5 |
| Detención | 1,740 | .5 |
| Discusión/altercado | 75,457 | 21.4 |
| Agresión sexual | 2,056 | .6 |
| Otro | 11,522 | 3.3 |
| No responde | 1,808 | .5 |
| Total | 353,218 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses, según tipo de agresión por sexo y grupos**

| Sexo | Tipo de agresión | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Robo, asalto | 22,166 | 60,724 | 82,890 |
| | Incidente de tránsito | 156 | 10,873 | 11,029 |
| | Agresión sin motivo aparente | 54,914 | 57,855 | 112,769 |
| | Secuestro | 1,233 | - | 1,233 |
| | Detención | 1,740 | - | 1,740 |
| | Discusión/altercado | 13,697 | 49,305 | 63,002 |
| | Agresión sexual | 161 | - | 161 |
| | Otro | 3,610 | - | 3,610 |
| | No responde | 892 | - | 892 |
| | Total | 98,569 | 178,757 | 277,326 |
| Mujer | Robo, asalto | 2,119 | 15,992 | 18,111 |
| | Agresión sin motivo aparente | 13,942 | 20,177 | 34,119 |
| | Secuestro | 370 | 114 | 484 |
| | Discusión/altercado | 5,996 | 6,459 | 12,455 |
| | Agresión sexual | 1,272 | 623 | 1,895 |
| | Otro | 6,627 | 1,285 | 7,912 |
| | No responde | 136 | 780 | 916 |
| | Total | 30,462 | 45,430 | 75,892 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de Adolescentes de 10 a 19 años que sufrieron algún robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses, según tipo de agresión por sexo y grupos**

| Sexo | Tipo de agresión | Grupos quinquenales | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 - 14 | 15 - 19 | |
| Hombre | Robo, asalto | 22.5 | 34.0 | 29.9 |
| | Incidente de tránsito | 0.2 | 6.1 | 4.0 |
| | Agresión sin motivo aparente | 55.7 | 32.4 | 40.7 |
| | Secuestro | 1.3 | - | 0.4 |
| | Detención | 1.8 | - | 0.6 |
| | Discusión/altercado | 13.9 | 27.6 | 22.7 |
| | Agresión sexual | 0.2 | - | 0.1 |
| | Otro | 3.7 | - | 1.3 |
| | No responde | 0.9 | - | 0.3 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Robo, asalto | 7.0 | 35.2 | 23.9 |
| | Agresión sin motivo aparente | 45.8 | 44.4 | 45.0 |
| | Secuestro | 1.2 | 0.3 | 0.6 |
| | Discusión/altercado | 19.7 | 14.2 | 16.4 |
| | Agresión sexual | 4.2 | 1.4 | 2.5 |
| | Otro | 21.8 | 2.8 | 10.4 |
| | No responde | 0.4 | 1.7 | 1.2 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

# Adultos

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, según tipo de servicio**

| Medicina preventiva | Recibio atención | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Prueba de papanicolaou | Sí | 1,203,071 | 38.1 |
| | No | 1,957,315 | 61.9 |
| | Total | 3,160,386 | 100.0 |
| Detección de cáncer de mama (Mastografía | Sí | 633,274 | 20.0 |
| | No | 2,527,112 | 80.0 |
| | Total | 3,160,386 | 100.0 |
| Detección de tuberculosis | Sí | 175,055 | 2.9 |
| | No | 5,781,615 | 97.1 |
| | Total | 5,956,670 | 100.0 |
| Detección de diabetes (prueba del azúcar) | Sí | 1,499,070 | 25.2 |
| | No | 4,457,600 | 74.8 |
| | Total | 5,956,670 | 100.0 |
| Detección de hipertensión (toma de presión arterial) | Sí | 1,526,209 | 25.6 |
| | No | 4,430,461 | 74.4 |
| | Total | 5,956,670 | 100.0 |
| Detección de Cáncer de próstata | Sí | 175,841 | 6.3 |
| | No | 2,620,443 | 93.7 |
| | Total | 2,796,284 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de mujeres de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para Prueba de Papanicolaou por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | Proporciones | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 81,759 | 330,528 | 412,287 | 6.8 | 16.9 | 13.0 |
| 25 a 29 años | 118,185 | 251,464 | 369,649 | 9.8 | 12.8 | 11.7 |
| 30 a 34 años | 160,402 | 275,794 | 436,196 | 13.3 | 14.1 | 13.8 |
| 35 a 39 años | 132,607 | 173,011 | 305,618 | 11.0 | 8.8 | 9.7 |
| 40 a 44 años | 108,957 | 185,616 | 294,573 | 9.1 | 9.5 | 9.3 |
| 45 a 49 años | 109,567 | 141,476 | 251,043 | 9.1 | 7.2 | 7.9 |
| 50 a 54 años | 144,608 | 126,166 | 270,774 | 12.0 | 6.4 | 8.6 |
| 55 a 59 años | 86,327 | 92,538 | 178,865 | 7.2 | 4.7 | 5.7 |
| 60 a 64 años | 52,792 | 63,417 | 116,209 | 4.4 | 3.2 | 3.7 |
| 65 a 69 años | 81,558 | 89,788 | 171,346 | 6.8 | 4.6 | 5.4 |
| 70 a 74 años | 70,224 | 79,254 | 149,478 | 5.8 | 4.0 | 4.7 |
| 75 a 79 años | 34,026 | 67,851 | 101,877 | 2.8 | 3.5 | 3.2 |
| 80 y más | 22,059 | 80,412 | 102,471 | 1.8 | 4.1 | 3.2 |
| Total | 1,203,071 | 1,957,315 | 3,160,386 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de mujeres de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de cáncer de mama por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | Proporciones | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 31,055 | 381,232 | 412,287 | 4.9 | 15.1 | 13.0 |
| 25 a 29 años | 43,248 | 326,401 | 369,649 | 6.8 | 12.9 | 11.7 |
| 30 a 34 años | 70,527 | 365,669 | 436,196 | 11.1 | 14.5 | 13.8 |
| 35 a 39 años | 55,784 | 249,834 | 305,618 | 8.8 | 9.9 | 9.7 |
| 40 a 44 años | 67,236 | 227,337 | 294,573 | 10.6 | 9.0 | 9.3 |
| 45 a 49 años | 81,226 | 169,817 | 251,043 | 12.8 | 6.7 | 7.9 |
| 50 a 54 años | 74,530 | 196,244 | 270,774 | 11.8 | 7.8 | 8.6 |
| 55 a 59 años | 52,371 | 126,494 | 178,865 | 8.3 | 5.0 | 5.7 |
| 60 a 64 años | 35,221 | 80,988 | 116,209 | 5.6 | 3.2 | 3.7 |
| 65 a 69 años | 43,474 | 127,872 | 171,346 | 6.9 | 5.1 | 5.4 |
| 70 a 74 años | 38,773 | 110,705 | 149,478 | 6.1 | 4.4 | 4.7 |
| 75 a 79 años | 31,994 | 69,883 | 101,877 | 5.1 | 2.8 | 3.2 |
| 80 y más | 7,835 | 94,636 | 102,471 | 1.2 | 3.7 | 3.2 |
| Total | 633,274 | 2,527,112 | 3,160,386 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Dirección de Estadísticas DF con base en SSA.ENSANUT 2006.

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 10,450 | 350,686 | 361,136 | 2,902 | 409,385 | 412,287 | 10.2 | 13.0 | 12.9 | 4.0 | 13.3 | 13.0 |
| 25 a 29 años | 1,451 | 355,704 | 357,155 | 2,902 | 366,747 | 369,649 | 1.4 | 13.2 | 12.8 | 4.0 | 11.9 | 11.7 |
| 30 a 34 años | 13,641 | 323,917 | 337,558 | 17,420 | 418,776 | 436,196 | 13.3 | 12.0 | 12.1 | 24.1 | 13.6 | 13.8 |
| 35 a 39 años | 4,353 | 307,730 | 312,083 | - | 305,618 | 305,618 | 4.2 | 11.4 | 11.2 | - | 9.9 | 9.7 |
| 40 a 44 años | 9,366 | 213,295 | 222,661 | 7,302 | 287,271 | 294,573 | 9.1 | 7.9 | 8.0 | 10.1 | 9.3 | 9.3 |
| 45 a 49 años | 17,125 | 283,757 | 300,882 | - | 251,043 | 251,043 | 16.7 | 10.5 | 10.8 | - | 8.1 | 7.9 |
| 50 a 54 años | 17,807 | 232,355 | 250,162 | 4,353 | 266,421 | 270,774 | 17.3 | 8.6 | 8.9 | 6.0 | 8.6 | 8.6 |
| 55 a 59 años | 9,288 | 219,315 | 228,603 | 5,169 | 173,696 | 178,865 | 9.0 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 5.6 | 5.7 |
| 60 a 64 años | 5,661 | 106,443 | 112,104 | 4,353 | 111,856 | 116,209 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.6 | 3.7 |
| 65 a 69 años | 4,353 | 110,530 | 114,883 | 12,774 | 158,572 | 171,346 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 17.7 | 5.1 | 5.4 |
| 70 a 74 años | 2,902 | 72,484 | 75,386 | - | 149,478 | 149,478 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | - | 4.8 | 4.7 |
| 75 a 79 años | - | 59,717 | 59,717 | 10,452 | 91,425 | 101,877 | - | 2.2 | 2.1 | 14.5 | 3.0 | 3.2 |
| 80 y más | 6,386 | 57,568 | 63,954 | 4,645 | 97,826 | 102,471 | 6.2 | 2.1 | 2.3 | 6.4 | 3.2 | 3.2 |
| Total | 102,783 | 2,693,501 | 2,796,284 | 72,272 | 3,088,114 | 3,160,386 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Dirección de Estadísticas DF con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de población de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de diabetes por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 28,753 | 332,383 | 361,136 | 47,669 | 364,618 | 412,287 | 4.9 | 15.0 | 12.9 | 5.2 | 16.2 | 13.0 |
| 25 a 29 años | 20,469 | 336,686 | 357,155 | 54,321 | 315,328 | 369,649 | 3.5 | 15.2 | 12.8 | 5.9 | 14.0 | 11.7 |
| 30 a 34 años | 68,058 | 269,500 | 337,558 | 88,616 | 347,580 | 436,196 | 11.7 | 12.2 | 12.1 | 9.7 | 15.5 | 13.8 |
| 35 a 39 años | 24,667 | 287,416 | 312,083 | 59,824 | 245,794 | 305,618 | 4.2 | 13.0 | 11.2 | 6.5 | 10.9 | 9.7 |
| 40 a 44 años | 45,358 | 177,303 | 222,661 | 70,648 | 223,925 | 294,573 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 10.0 | 9.3 |
| 45 a 49 años | 83,633 | 217,249 | 300,882 | 73,262 | 177,781 | 251,043 | 14.3 | 9.8 | 10.8 | 8.0 | 7.9 | 7.9 |
| 50 a 54 años | 76,451 | 173,711 | 250,162 | 136,857 | 133,917 | 270,774 | 13.1 | 7.9 | 8.9 | 15.0 | 6.0 | 8.6 |
| 55 a 59 años | 81,227 | 147,376 | 228,603 | 81,397 | 97,468 | 178,865 | 13.9 | 6.7 | 8.2 | 8.9 | 4.3 | 5.7 |
| 60 a 64 años | 51,915 | 60,189 | 112,104 | 62,766 | 53,443 | 116,209 | 8.9 | 2.7 | 4.0 | 6.9 | 2.4 | 3.7 |
| 65 a 69 años | 28,866 | 86,017 | 114,883 | 90,288 | 81,058 | 171,346 | 4.9 | 3.9 | 4.1 | 9.9 | 3.6 | 5.4 |
| 70 a 74 años | 41,539 | 33,847 | 75,386 | 65,990 | 83,488 | 149,478 | 7.1 | 1.5 | 2.7 | 7.2 | 3.7 | 4.7 |
| 75 a 79 años | 22,848 | 36,869 | 59,717 | 24,844 | 77,033 | 101,877 | 3.9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 3.2 |
| 80 y más | 10,157 | 53,797 | 63,954 | 58,647 | 43,824 | 102,471 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 6.4 | 2.0 | 3.2 |
| Total | 583,941 | 2,212,343 | 2,796,284 | 915,129 | 2,245,257 | 3,160,386 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Dirección de Estadísticas DF con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de población de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de hipertensión por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 52,394 | 308,742 | 361,136 | 80,465 | 331,822 | 412,287 | 8.9 | 14.0 | 12.9 | 8.6 | 14.9 | 13.0 |
| 25 a 29 años | 41,737 | 315,418 | 357,155 | 65,328 | 304,321 | 369,649 | 7.1 | 14.3 | 12.8 | 6.9 | 13.7 | 11.7 |
| 30 a 34 años | 63,561 | 273,997 | 337,558 | 107,670 | 328,526 | 436,196 | 10.8 | 12.4 | 12.1 | 11.5 | 14.8 | 13.8 |
| 35 a 39 años | 63,042 | 249,041 | 312,083 | 70,618 | 235,000 | 305,618 | 10.8 | 11.3 | 11.2 | 7.5 | 10.6 | 9.7 |
| 40 a 44 años | 45,562 | 177,099 | 222,661 | 87,294 | 207,279 | 294,573 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 45 a 49 años | 51,340 | 249,542 | 300,882 | 65,548 | 185,495 | 251,043 | 8.8 | 11.3 | 10.8 | 7.0 | 8.4 | 7.9 |
| 50 a 54 años | 69,517 | 180,645 | 250,162 | 146,852 | 123,922 | 270,774 | 11.9 | 8.2 | 8.9 | 15.6 | 5.6 | 8.6 |
| 55 a 59 años | 69,792 | 158,811 | 228,603 | 63,985 | 114,880 | 178,865 | 11.9 | 7.2 | 8.2 | 6.8 | 5.2 | 5.7 |
| 60 a 64 años | 35,801 | 76,303 | 112,104 | 51,212 | 64,997 | 116,209 | 6.1 | 3.5 | 4.0 | 5.4 | 2.9 | 3.7 |
| 65 a 69 años | 19,163 | 95,720 | 114,883 | 76,684 | 94,662 | 171,346 | 3.3 | 4.3 | 4.1 | 8.2 | 4.3 | 5.4 |
| 70 a 74 años | 29,315 | 46,071 | 75,386 | 52,494 | 96,984 | 149,478 | 5.0 | 2.1 | 2.7 | 5.6 | 4.4 | 4.7 |
| 75 a 79 años | 24,589 | 35,128 | 59,717 | 28,738 | 73,139 | 101,877 | 4.2 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 |
| 80 y más | 20,319 | 43,635 | 63,954 | 43,189 | 59,282 | 102,471 | 3.5 | 2.0 | 2.3 | 4.6 | 2.7 | 3.2 |
| Total | 586,132 | 2,210,152 | 2,796,284 | 940,077 | 2,220,309 | 3,160,386 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Dirección de Estadísticas DF con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de hombres de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de Cáncer de próstata por sexo y grupos de edad**

| Grupos de edad | Absolutos | | | Proporciones | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | - | 361,136 | 361,136 | - | 13.8 | 12.9 |
| 25 a 29 años | - | 357,155 | 357,155 | - | 13.6 | 12.8 |
| 30 a 34 años | 15,238 | 322,320 | 337,558 | 8.7 | 12.3 | 12.1 |
| 35 a 39 años | - | 312,083 | 312,083 | - | 11.9 | 11.2 |
| 40 a 44 años | 9,976 | 212,685 | 222,661 | 5.7 | 8.1 | 8.0 |
| 45 a 49 años | 13,739 | 287,143 | 300,882 | 7.8 | 11.0 | 10.8 |
| 50 a 54 años | 24,384 | 225,778 | 250,162 | 13.9 | 8.6 | 8.9 |
| 55 a 59 años | 17,381 | 211,222 | 228,603 | 9.9 | 8.1 | 8.2 |
| 60 a 64 años | 24,047 | 88,057 | 112,104 | 13.7 | 3.4 | 4.0 |
| 65 a 69 años | 17,056 | 97,827 | 114,883 | 9.7 | 3.7 | 4.1 |
| 70 a 74 años | 29,315 | 46,071 | 75,386 | 16.7 | 1.8 | 2.7 |
| 75 a 79 años | 17,450 | 42,267 | 59,717 | 9.9 | 1.6 | 2.1 |
| 80 y más | 7,255 | 56,699 | 63,954 | 4.1 | 2.2 | 2.3 |
| Total | 175,841 | 2,620,443 | 2,796,284 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Dirección de Estadísticas DF con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, según tipo de servicio**

| Medicina preventiva | Recibio atención | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Papanicolaou | Si | 792,044 | 29.2 |
| | No | 1,916,749 | 70.7 |
| | No sabe | 1,034 | .0 |
| | Total | 2,709,827 | 100.0 |
| Cancer Mama | Si | 345,122 | 12.7 |
| | No | 2,363,671 | 87.2 |
| | No sabe | 1,034 | .0 |
| | Total | 2,709,827 | 100.0 |
| Tuberculosis | Si | 60,479 | 1.2 |
| | No | 4,823,565 | 98.8 |
| | Total | 4,884,044 | 100.0 |
| Diabetes | Si | 677,511 | 13.9 |
| | No | 4,206,533 | 86.1 |
| | Total | 4,884,044 | 100.0 |
| Hipertensión | Si | 872,627 | 17.9 |
| | No | 4,011,417 | 82.1 |
| | Total | 4,884,044 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de mujeres de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para Prueba de Papanicolaou por grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | Proporciones | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 52,266 | 425,764 | - | 478,030 | 6.60 | 22.21 | - | 17.64 |
| 25 a 29 años | 105,801 | 300,253 | - | 406,054 | 13.36 | 15.66 | - | 14.98 |
| 30 a 34 años | 127,957 | 226,049 | - | 354,006 | 16.16 | 11.79 | - | 13.06 |
| 35 a 39 años | 121,601 | 212,267 | - | 333,868 | 15.35 | 11.07 | - | 12.32 |
| 40 a 44 años | 112,387 | 144,248 | 1,034 | 257,669 | 14.19 | 7.53 | 100.00 | 9.51 |
| 45 a 49 años | 81,200 | 134,427 | - | 215,627 | 10.25 | 7.01 | - | 7.96 |
| 50 a 54 años | 75,186 | 98,572 | - | 173,758 | 9.49 | 5.14 | - | 6.41 |
| 55 a 59 años | 37,716 | 88,448 | - | 126,164 | 4.76 | 4.61 | - | 4.66 |
| 60 a 64 años | 32,802 | 70,454 | - | 103,256 | 4.14 | 3.68 | - | 3.81 |
| 65 a 69 años | 18,899 | 73,691 | - | 92,590 | 2.39 | 3.84 | - | 3.42 |
| 70 a 74 años | 17,375 | 52,298 | - | 69,673 | 2.19 | 2.73 | - | 2.57 |
| 75 a 79 años | 7,660 | 34,763 | - | 42,423 | 0.97 | 1.81 | - | 1.57 |
| 80 y más | 1,194 | 55,515 | - | 56,709 | 0.15 | 2.90 | - | 2.09 |
| Total | 792,044 | 1,916,749 | 1,034 | 2,709,827 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de mujeres de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de cáncer de mama por grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | Proporciones | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 30,302 | 447,728 | - | 478,030 | 8.59 | 19.00 | - | 17.64 |
| 25 a 29 años | 57,988 | 348,066 | - | 406,054 | 16.44 | 14.77 | - | 14.98 |
| 30 a 34 años | 45,530 | 308,476 | - | 354,006 | 12.91 | 13.09 | - | 13.06 |
| 35 a 39 años | 63,353 | 270,515 | - | 333,868 | 17.96 | 11.48 | - | 12.32 |
| 40 a 44 años | 51,125 | 205,510 | 1,034 | 257,669 | 14.49 | 8.72 | 100.00 | 9.51 |
| 45 a 49 años | 35,483 | 180,144 | - | 215,627 | 10.06 | 7.65 | - | 7.96 |
| 50 a 54 años | 30,450 | 143,308 | - | 173,758 | 8.63 | 6.08 | - | 6.41 |
| 55 a 59 años | 9,185 | 116,979 | - | 126,164 | 2.60 | 4.97 | - | 4.66 |
| 60 a 64 años | 7,046 | 96,210 | - | 103,256 | 2.00 | 4.08 | - | 3.81 |
| 65 a 69 años | 9,675 | 82,915 | - | 92,590 | 2.74 | 3.52 | - | 3.42 |
| 70 a 74 años | 8,620 | 61,053 | - | 69,673 | 2.44 | 2.59 | - | 2.57 |
| 75 a 79 años | 2,802 | 39,621 | - | 42,423 | 0.79 | 1.68 | - | 1.57 |
| 80 y más | 1,194 | 55,515 | - | 56,709 | 0.34 | 2.36 | - | 2.09 |
| Total | 352,753 | 2,356,040 | 1,034 | 2,709,827 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de población de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de tuberculosis por sexo y grupos de edad**

**Distrito Federal. Proporción de mujeres de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de cáncer de mama por grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | Proporciones | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 30,302 | 447,728 | - | 478,030 | 8.59 | 19.00 | - | 17.64 |
| 25 a 29 años | 57,988 | 348,066 | - | 406,054 | 16.44 | 14.77 | - | 14.98 |
| 30 a 34 años | 45,530 | 308,476 | - | 354,006 | 12.91 | 13.09 | - | 13.06 |
| 35 a 39 años | 63,353 | 270,515 | - | 333,868 | 17.96 | 11.48 | - | 12.32 |
| 40 a 44 años | 51,125 | 205,510 | 1,034 | 257,669 | 14.49 | 8.72 | 100.00 | 9.51 |
| 45 a 49 años | 35,483 | 180,144 | - | 215,627 | 10.06 | 7.65 | - | 7.96 |
| 50 a 54 años | 30,450 | 143,308 | - | 173,758 | 8.63 | 6.08 | - | 6.41 |
| 55 a 59 años | 9,185 | 116,979 | - | 126,164 | 2.60 | 4.97 | - | 4.66 |
| 60 a 64 años | 7,046 | 96,210 | - | 103,256 | 2.00 | 4.08 | - | 3.81 |
| 65 a 69 años | 9,675 | 82,915 | - | 92,590 | 2.74 | 3.52 | - | 3.42 |
| 70 a 74 años | 8,620 | 61,053 | - | 69,673 | 2.44 | 2.59 | - | 2.57 |
| 75 a 79 años | 2,802 | 39,621 | - | 42,423 | 0.79 | 1.68 | - | 1.57 |
| 80 y más | 1,194 | 55,515 | - | 56,709 | 0.34 | 2.36 | - | 2.09 |
| Total | 352,753 | 2,356,040 | 1,034 | 2,709,827 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de población de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de tuberculosis por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | - | 372,662 | 372,662 | 3,107 | 478,371 | 481,478 | - | 17.60 | 17.35 | 10.18 | 17.68 | 17.59 |
| 25 a 29 años | - | 349,314 | 349,314 | 6,420 | 406,054 | 412,474 | - | 16.50 | 16.27 | 21.04 | 15.01 | 15.07 |
| 30 a 34 años | - | 298,986 | 298,986 | - | 364,334 | 364,334 | - | 14.12 | 13.92 | - | 13.46 | 13.31 |
| 35 a 39 años | 10,177 | 228,225 | 238,402 | 10,992 | 325,556 | 336,548 | 33.96 | 10.78 | 11.10 | 36.03 | 12.03 | 12.30 |
| 40 a 44 años | 7,615 | 212,313 | 219,928 | - | 257,669 | 257,669 | 25.41 | 10.03 | 10.24 | - | 9.52 | 9.42 |
| 45 a 49 años | - | 161,961 | 161,961 | 3,214 | 212,413 | 215,627 | - | 7.65 | 7.54 | 10.53 | 7.85 | 7.88 |
| 50 a 54 años | 3,642 | 143,532 | 147,174 | 4,586 | 169,172 | 173,758 | 12.15 | 6.78 | 6.85 | 15.03 | 6.25 | 6.35 |
| 55 a 59 años | - | 98,686 | 98,686 | - | 126,164 | 126,164 | - | 4.66 | 4.60 | - | 4.66 | 4.61 |
| 60 a 64 años | - | 86,381 | 86,381 | 2,192 | 104,850 | 107,042 | - | 4.08 | 4.02 | 7.18 | 3.87 | 3.91 |
| 65 a 69 años | 6,593 | 55,324 | 61,917 | - | 92,590 | 92,590 | 22.00 | 2.61 | 2.88 | - | 3.42 | 3.38 |
| 70 a 74 años | - | 51,105 | 51,105 | - | 69,673 | 69,673 | - | 2.41 | 2.38 | - | 2.57 | 2.55 |
| 75 a 79 años | - | 29,382 | 29,382 | - | 42,423 | 42,423 | - | 1.39 | 1.37 | - | 1.57 | 1.55 |
| 80 y más | 1,941 | 29,716 | 31,657 | - | 56,709 | 56,709 | 6.48 | 1.40 | 1.47 | - | 2.10 | 2.07 |
| Total | 29,968 | 2,117,587 | 2,147,555 | 30,511 | 2,705,978 | 2,736,489 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de población de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de diabetes por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 31,600 | 341,062 | 372,662 | 46,848 | 434,630 | 481,478 | 12.30 | 18.04 | 17.35 | 11.14 | 18.77 | 17.59 |
| 25 a 29 años | 32,942 | 316,372 | 349,314 | 51,724 | 360,750 | 412,474 | 12.82 | 16.73 | 16.27 | 12.30 | 15.58 | 15.07 |
| 30 a 34 años | 39,776 | 259,210 | 298,986 | 45,754 | 318,580 | 364,334 | 15.48 | 13.71 | 13.92 | 10.88 | 13.76 | 13.31 |
| 35 a 39 años | 10,427 | 227,975 | 238,402 | 43,688 | 292,860 | 336,548 | 4.06 | 12.06 | 11.10 | 10.39 | 12.65 | 12.30 |
| 40 a 44 años | 19,035 | 200,893 | 219,928 | 45,385 | 212,284 | 257,669 | 7.41 | 10.63 | 10.24 | 10.79 | 9.17 | 9.42 |
| 45 a 49 años | 21,575 | 140,386 | 161,961 | 35,408 | 180,219 | 215,627 | 8.40 | 7.43 | 7.54 | 8.42 | 7.78 | 7.88 |
| 50 a 54 años | 13,179 | 133,995 | 147,174 | 38,581 | 135,177 | 173,758 | 5.13 | 7.09 | 6.85 | 9.17 | 5.84 | 6.35 |
| 55 a 59 años | 13,924 | 84,762 | 98,686 | 20,863 | 105,301 | 126,164 | 5.42 | 4.48 | 4.60 | 4.96 | 4.55 | 4.61 |
| 60 a 64 años | 21,123 | 65,258 | 86,381 | 40,351 | 66,691 | 107,042 | 8.22 | 3.45 | 4.02 | 9.59 | 2.88 | 3.91 |
| 65 a 69 años | 20,954 | 40,963 | 61,917 | 22,920 | 69,670 | 92,590 | 8.16 | 2.17 | 2.88 | 5.45 | 3.01 | 3.38 |
| 70 a 74 años | 21,042 | 30,063 | 51,105 | 15,889 | 53,784 | 69,673 | 8.19 | 1.59 | 2.38 | 3.78 | 2.32 | 2.55 |
| 75 a 79 años | 2,765 | 26,617 | 29,382 | 12,003 | 30,420 | 42,423 | 1.08 | 1.41 | 1.37 | 2.85 | 1.31 | 1.55 |
| 80 y más | 8,561 | 23,096 | 31,657 | 1,194 | 55,515 | 56,709 | 3.33 | 1.22 | 1.47 | 0.28 | 2.40 | 2.07 |
| Total | 256,903 | 1,890,652 | 2,147,555 | 420,608 | 2,315,881 | 2,736,489 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de población de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de hipertensión por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 24,601 | 348,061 | 372,662 | 45,603 | 435,875 | 481,478 | 7.68 | 19.05 | 17.35 | 8.26 | 19.95 | 17.59 |
| 25 a 29 años | 49,624 | 299,690 | 349,314 | 83,571 | 328,903 | 412,474 | 15.48 | 16.40 | 16.27 | 15.14 | 15.06 | 15.07 |
| 30 a 34 años | 47,549 | 251,437 | 298,986 | 59,739 | 304,595 | 364,334 | 14.84 | 13.76 | 13.92 | 10.82 | 13.94 | 13.31 |
| 35 a 39 años | 27,454 | 210,948 | 238,402 | 53,121 | 283,427 | 336,548 | 8.57 | 11.55 | 11.10 | 9.62 | 12.98 | 12.30 |
| 40 a 44 años | 9,189 | 210,739 | 219,928 | 45,319 | 212,350 | 257,669 | 2.87 | 11.53 | 10.24 | 8.21 | 9.72 | 9.42 |
| 45 a 49 años | 21,575 | 140,386 | 161,961 | 55,184 | 160,443 | 215,627 | 6.73 | 7.68 | 7.54 | 9.99 | 7.35 | 7.88 |
| 50 a 54 años | 46,579 | 100,595 | 147,174 | 63,113 | 110,645 | 173,758 | 14.53 | 5.51 | 6.85 | 11.43 | 5.07 | 6.35 |
| 55 a 59 años | 14,779 | 83,907 | 98,686 | 32,122 | 94,042 | 126,164 | 4.61 | 4.59 | 4.60 | 5.82 | 4.31 | 4.61 |
| 60 a 64 años | 20,152 | 66,229 | 86,381 | 28,372 | 78,670 | 107,042 | 6.29 | 3.62 | 4.02 | 5.14 | 3.60 | 3.91 |
| 65 a 69 años | 18,425 | 43,492 | 61,917 | 18,553 | 74,037 | 92,590 | 5.75 | 2.38 | 2.88 | 3.36 | 3.39 | 3.38 |
| 70 a 74 años | 19,653 | 31,452 | 51,105 | 19,664 | 50,009 | 69,673 | 6.13 | 1.72 | 2.38 | 3.56 | 2.29 | 2.55 |
| 75 a 79 años | 4,245 | 25,137 | 29,382 | 26,036 | 16,387 | 42,423 | 1.32 | 1.38 | 1.37 | 4.72 | 0.75 | 1.55 |
| 80 y más | 16,679 | 14,978 | 31,657 | 21,726 | 34,983 | 56,709 | 5.20 | 0.82 | 1.47 | 3.93 | 1.60 | 2.07 |
| Total | 320,504 | 1,827,051 | 2,147,555 | 552,123 | 2,184,366 | 2,736,489 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, según tipo de servicio**

| Medicina preventiva | Recibio atención | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Prueba de papanicolaou | Sí | 11,822,723 | 36.0 |
| | No | 20,974,151 | 64.0 |
| | Total | 32,796,874 | 100.0 |
| Detección de cáncer de mama (Mastografía) | Sí | 5,365,623 | 16.4 |
| | No | 27,431,251 | 83.6 |
| | Total | 32,796,874 | 100.0 |
| Detección de tuberculosis | Sí | 1,800,534 | 3.0 |
| | No | 58,121,720 | 97.0 |
| | Total | 59,922,254 | 100.0 |
| Detección de diabetes (prueba del azúcar) | Sí | 13,327,793 | 22.2 |
| | No | 46,594,461 | 77.8 |
| | Total | 59,922,254 | 100.0 |
| Detección de hipertensión (toma de presión arterial) | Sí | 13,645,613 | 22.8 |
| | No | 46,276,641 | 77.2 |
| | Total | 59,922,254 | 100.0 |
| Detección de Cáncer de próstata | Sí | 977,703 | 3.6 |
| | No | 26,150,587 | 96.4 |
| | Total | 27,128,290 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de mujeres de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para Prueba de Papanicolaou por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | Proporciones | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 667,754 | 3,702,201 | 4,369,955 | 5.6 | 17.7 | 13.3 |
| 25 a 29 años | 1,157,879 | 2,861,138 | 4,019,017 | 9.8 | 13.6 | 12.3 |
| 30 a 34 años | 1,634,483 | 2,448,119 | 4,082,602 | 13.8 | 11.7 | 12.4 |
| 35 a 39 años | 1,798,854 | 2,302,544 | 4,101,398 | 15.2 | 11.0 | 12.5 |
| 40 a 44 años | 1,570,657 | 2,043,974 | 3,614,631 | 13.3 | 9.7 | 11.0 |
| 45 a 49 años | 1,312,633 | 1,521,879 | 2,834,512 | 11.1 | 7.3 | 8.6 |
| 50 a 54 años | 1,163,004 | 1,250,869 | 2,413,873 | 9.8 | 6.0 | 7.4 |
| 55 a 59 años | 798,046 | 1,010,044 | 1,808,090 | 6.8 | 4.8 | 5.5 |
| 60 a 64 años | 650,793 | 973,353 | 1,624,146 | 5.5 | 4.6 | 5.0 |
| 65 a 69 años | 433,273 | 824,009 | 1,257,282 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
| 70 a 74 años | 328,945 | 652,403 | 981,348 | 2.8 | 3.1 | 3.0 |
| 75 a 79 años | 192,489 | 580,337 | 772,826 | 1.6 | 2.8 | 2.4 |
| 80 y más | 113,913 | 802,305 | 916,218 | 1.0 | 3.8 | 2.8 |
| Total | 11,822,723 | 20,973,175 | 32,795,898 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de mujeres de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de cáncer de mama por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | Proporciones | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 269,609 | 4,100,346 | 4,369,955 | 5.0 | 14.9 | 13.3 |
| 25 a 29 años | 434,422 | 3,584,595 | 4,019,017 | 8.1 | 13.1 | 12.3 |
| 30 a 34 años | 683,078 | 3,399,524 | 4,082,602 | 12.7 | 12.4 | 12.4 |
| 35 a 39 años | 749,023 | 3,352,375 | 4,101,398 | 14.0 | 12.2 | 12.5 |
| 40 a 44 años | 716,091 | 2,898,540 | 3,614,631 | 13.3 | 10.6 | 11.0 |
| 45 a 49 años | 640,664 | 2,193,848 | 2,834,512 | 11.9 | 8.0 | 8.6 |
| 50 a 54 años | 586,209 | 1,827,664 | 2,413,873 | 10.9 | 6.7 | 7.4 |
| 55 a 59 años | 426,674 | 1,381,416 | 1,808,090 | 8.0 | 5.0 | 5.5 |
| 60 a 64 años | 328,562 | 1,295,584 | 1,624,146 | 6.1 | 4.7 | 5.0 |
| 65 a 69 años | 225,234 | 1,032,048 | 1,257,282 | 4.2 | 3.8 | 3.8 |
| 70 a 74 años | 158,005 | 823,343 | 981,348 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
| 75 a 79 años | 105,639 | 667,187 | 772,826 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
| 80 y más | 42,413 | 873,805 | 916,218 | 0.8 | 3.2 | 2.8 |
| Total | 5,365,623 | 27,430,275 | 32,795,898 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de población de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de tuberculosis por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 56,737 | 3,760,328 | 3,817,065 | 23,987 | 4,345,968 | 4,369,955 | 5.9 | 14.4 | 14.1 | 2.9 | 13.6 | 13.3 |
| 25 a 29 años | 93,069 | 3,234,759 | 3,327,828 | 51,209 | 3,967,808 | 4,019,017 | 9.6 | 12.4 | 12.3 | 6.1 | 12.4 | 12.3 |
| 30 a 34 años | 86,620 | 3,187,955 | 3,274,575 | 97,485 | 3,985,117 | 4,082,602 | 9.0 | 12.2 | 12.1 | 11.7 | 12.5 | 12.4 |
| 35 a 39 años | 68,312 | 2,974,516 | 3,042,828 | 97,033 | 4,004,365 | 4,101,398 | 7.1 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 12.5 | 12.5 |
| 40 a 44 años | 102,513 | 2,710,765 | 2,813,278 | 93,564 | 3,521,067 | 3,614,631 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 11.0 | 11.0 |
| 45 a 49 años | 115,894 | 2,379,236 | 2,495,130 | 66,271 | 2,768,241 | 2,834,512 | 12.0 | 9.1 | 9.2 | 7.9 | 8.7 | 8.6 |
| 50 a 54 años | 69,788 | 2,025,367 | 2,095,155 | 84,859 | 2,329,014 | 2,413,873 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 10.2 | 7.3 | 7.4 |
| 55 a 59 años | 94,072 | 1,636,905 | 1,730,977 | 64,820 | 1,743,270 | 1,808,090 | 9.7 | 6.3 | 6.4 | 7.8 | 5.5 | 5.5 |
| 60 a 64 años | 89,626 | 1,261,593 | 1,351,219 | 89,748 | 1,534,398 | 1,624,146 | 9.3 | 4.8 | 5.0 | 10.8 | 4.8 | 5.0 |
| 65 a 69 años | 88,495 | 1,011,430 | 1,099,925 | 49,400 | 1,207,882 | 1,257,282 | 9.2 | 3.9 | 4.1 | 5.9 | 3.8 | 3.8 |
| 70 a 74 años | 39,283 | 865,566 | 904,849 | 48,252 | 933,096 | 981,348 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 5.8 | 2.9 | 3.0 |
| 75 a 79 años | 22,788 | 555,463 | 578,251 | 43,915 | 728,911 | 772,826 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 5.3 | 2.3 | 2.4 |
| 80 y más | 39,686 | 555,590 | 595,276 | 23,108 | 893,110 | 916,218 | 4.1 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Total | 966,883 | 26,159,473 | 27,126,356 | 833,651 | 31,962,247 | 32,795,898 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de población de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de diabetes por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 274,721 | 3,542,344 | 3,817,065 | 427,667 | 3,942,288 | 4,369,955 | 5.3 | 16.1 | 14.1 | 5.2 | 16.0 | 13.3 |
| 25 a 29 años | 348,924 | 2,978,904 | 3,327,828 | 632,475 | 3,386,542 | 4,019,017 | 6.8 | 13.6 | 12.3 | 7.7 | 13.8 | 12.3 |
| 30 a 34 años | 513,998 | 2,760,577 | 3,274,575 | 870,887 | 3,211,715 | 4,082,602 | 10.0 | 12.6 | 12.1 | 10.6 | 13.0 | 12.4 |
| 35 a 39 años | 541,077 | 2,501,751 | 3,042,828 | 1,087,617 | 3,013,781 | 4,101,398 | 10.5 | 11.4 | 11.2 | 13.3 | 12.2 | 12.5 |
| 40 a 44 años | 593,280 | 2,219,998 | 2,813,278 | 957,113 | 2,657,518 | 3,614,631 | 11.5 | 10.1 | 10.4 | 11.7 | 10.8 | 11.0 |
| 45 a 49 años | 609,907 | 1,885,223 | 2,495,130 | 960,185 | 1,874,327 | 2,834,512 | 11.9 | 8.6 | 9.2 | 11.7 | 7.6 | 8.6 |
| 50 a 54 años | 510,752 | 1,584,403 | 2,095,155 | 837,078 | 1,576,795 | 2,413,873 | 9.9 | 7.2 | 7.7 | 10.2 | 6.4 | 7.4 |
| 55 a 59 años | 456,523 | 1,274,454 | 1,730,977 | 578,388 | 1,229,702 | 1,808,090 | 8.9 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 5.0 | 5.5 |
| 60 a 64 años | 365,257 | 985,962 | 1,351,219 | 593,355 | 1,030,791 | 1,624,146 | 7.1 | 4.5 | 5.0 | 7.2 | 4.2 | 5.0 |
| 65 a 69 años | 298,968 | 800,957 | 1,099,925 | 423,789 | 833,493 | 1,257,282 | 5.8 | 3.6 | 4.1 | 5.2 | 3.4 | 3.8 |
| 70 a 74 años | 285,371 | 619,478 | 904,849 | 337,333 | 644,015 | 981,348 | 5.5 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 2.6 | 3.0 |
| 75 a 79 años | 188,285 | 389,966 | 578,251 | 216,793 | 556,033 | 772,826 | 3.7 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
| 80 y más | 155,718 | 439,558 | 595,276 | 262,332 | 653,886 | 916,218 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 2.7 | 2.8 |
| Total | 5,142,781 | 21,983,575 | 27,126,356 | 8,185,012 | 24,610,886 | 32,795,898 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Dirección de Estadísticas DF con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de población de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de hipertensión por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 454,987 | 3,362,078 | 3,817,065 | 571,078 | 3,798,877 | 4,369,955 | 8.5 | 15.4 | 14.1 | 6.9 | 15.5 | 13.3 |
| 25 a 29 años | 431,954 | 2,895,874 | 3,327,828 | 767,442 | 3,251,575 | 4,019,017 | 8.1 | 13.3 | 12.3 | 9.3 | 13.3 | 12.3 |
| 30 a 34 años | 518,707 | 2,755,868 | 3,274,575 | 922,059 | 3,160,543 | 4,082,602 | 9.7 | 12.7 | 12.1 | 11.1 | 12.9 | 12.4 |
| 35 a 39 años | 587,003 | 2,455,825 | 3,042,828 | 1,118,175 | 2,983,223 | 4,101,398 | 10.9 | 11.3 | 11.2 | 13.5 | 12.2 | 12.5 |
| 40 a 44 años | 579,051 | 2,234,227 | 2,813,278 | 953,493 | 2,661,138 | 3,614,631 | 10.8 | 10.3 | 10.4 | 11.5 | 10.9 | 11.0 |
| 45 a 49 años | 562,477 | 1,932,653 | 2,495,130 | 894,679 | 1,939,833 | 2,834,512 | 10.5 | 8.9 | 9.2 | 10.8 | 7.9 | 8.6 |
| 50 a 54 años | 463,506 | 1,631,649 | 2,095,155 | 785,515 | 1,628,358 | 2,413,873 | 8.6 | 7.5 | 7.7 | 9.5 | 6.6 | 7.4 |
| 55 a 59 años | 441,006 | 1,289,971 | 1,730,977 | 520,007 | 1,288,083 | 1,808,090 | 8.2 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 5.3 | 5.5 |
| 60 a 64 años | 386,972 | 964,247 | 1,351,219 | 552,330 | 1,071,816 | 1,624,146 | 7.2 | 4.4 | 5.0 | 6.7 | 4.4 | 5.0 |
| 65 a 69 años | 287,630 | 812,295 | 1,099,925 | 400,204 | 857,078 | 1,257,282 | 5.4 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 3.5 | 3.8 |
| 70 a 74 años | 279,016 | 625,833 | 904,849 | 318,061 | 663,287 | 981,348 | 5.2 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 2.7 | 3.0 |
| 75 a 79 años | 193,588 | 384,663 | 578,251 | 233,579 | 539,247 | 772,826 | 3.6 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 2.4 |
| 80 y más | 176,567 | 418,709 | 595,276 | 246,527 | 669,691 | 916,218 | 3.3 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 2.8 |
| Total | 5,362,464 | 21,763,892 | 27,126,356 | 8,283,149 | 24,512,749 | 32,795,898 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Dirección de Estadísticas DF con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de hombres de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de Cáncer de próstata por sexo y grupos de edad**

| Grupos de edad | Absolutos | | | Proporciones | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 13,913 | 3,803,152 | 3,817,065 | 1.4 | 14.5 | 14.1 |
| 25 a 29 años | 32,199 | 3,295,629 | 3,327,828 | 3.3 | 12.6 | 12.3 |
| 30 a 34 años | 36,705 | 3,237,870 | 3,274,575 | 3.8 | 12.4 | 12.1 |
| 35 a 39 años | 32,436 | 3,010,392 | 3,042,828 | 3.3 | 11.5 | 11.2 |
| 40 a 44 años | 57,038 | 2,756,240 | 2,813,278 | 5.8 | 10.5 | 10.4 |
| 45 a 49 años | 103,816 | 2,391,314 | 2,495,130 | 10.6 | 9.1 | 9.2 |
| 50 a 54 años | 108,738 | 1,986,417 | 2,095,155 | 11.1 | 7.6 | 7.7 |
| 55 a 59 años | 123,351 | 1,607,626 | 1,730,977 | 12.6 | 6.1 | 6.4 |
| 60 a 64 años | 120,142 | 1,231,077 | 1,351,219 | 12.3 | 4.7 | 5.0 |
| 65 a 69 años | 102,635 | 997,290 | 1,099,925 | 10.5 | 3.8 | 4.1 |
| 70 a 74 años | 128,739 | 776,110 | 904,849 | 13.2 | 3.0 | 3.3 |
| 75 a 79 años | 54,815 | 523,436 | 578,251 | 5.6 | 2.0 | 2.1 |
| 80 y más | 63,176 | 532,100 | 595,276 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| Total | 977,703 | 26,148,653 | 27,126,356 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Dirección de Estadísticas DF con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, según tipo de servicio**

| Medicina preventiva | Recibio atención | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Papanicolaou | Si | 7,343,119 | 28.2 |
| | No | 18,660,103 | 71.7 |
| | No sabe | 15,073 | .1 |
| | Total | 26,018,295 | 100.0 |
| Cancer Mama | Si | 2,589,595 | 10.0 |
| | No | 23,413,334 | 90.0 |
| | No sabe | 15,124 | .1 |
| | Total | 26,018,053 | 100.0 |
| Tuberculosis | Si | 679,411 | 1.4 |
| | No | 48,721,764 | 98.6 |
| | No sabe | 15,917 | .0 |
| | Total | 49,417,092 | 100.0 |
| Diabetes | Si | 5,434,083 | 11.0 |
| | No | 43,964,127 | 89.0 |
| | No sabe | 10,477 | .0 |
| | Total | 49,408,687 | 100.0 |
| Hipertensión | Si | 6,901,312 | 14.0 |
| | No | 42,495,857 | 86.0 |
| | No sabe | 11,518 | .0 |
| | Total | 49,408,687 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de mujeres de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para Prueba de Papanicolaou por grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | Proporciones | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 740,644 | 4,260,256 | 7,614 | 5,008,514 | 10.09 | 22.83 | 50.51 | 19.25 |
| 25 a 29 años | 1,103,574 | 2,997,854 | 2,587 | 4,104,015 | 15.03 | 16.07 | 17.16 | 15.77 |
| 30 a 34 años | 1,207,650 | 2,327,660 | 309 | 3,535,619 | 16.45 | 12.47 | 2.05 | 13.59 |
| 35 a 39 años | 1,140,647 | 1,998,810 | - | 3,139,457 | 15.53 | 10.71 | - | 12.07 |
| 40 a 44 años | 938,137 | 1,418,208 | 1,034 | 2,357,379 | 12.78 | 7.60 | 6.86 | 9.06 |
| 45 a 49 años | 714,211 | 1,210,705 | - | 1,924,916 | 9.73 | 6.49 | - | 7.40 |
| 50 a 54 años | 548,269 | 978,650 | 988 | 1,527,907 | 7.47 | 5.24 | 6.55 | 5.87 |
| 55 a 59 años | 356,362 | 819,755 | 301 | 1,176,418 | 4.85 | 4.39 | 2.00 | 4.52 |
| 60 a 64 años | 249,687 | 789,730 | - | 1,039,417 | 3.40 | 4.23 | - | 3.99 |
| 65 a 69 años | 165,769 | 615,175 | - | 780,944 | 2.26 | 3.30 | - | 3.00 |
| 70 a 74 años | 112,790 | 463,381 | - | 576,171 | 1.54 | 2.48 | - | 2.21 |
| 75 a 79 años | 44,647 | 309,468 | 136 | 354,251 | 0.61 | 1.66 | 0.90 | 1.36 |
| 80 y más | 20,732 | 470,451 | 2,104 | 493,287 | 0.28 | 2.52 | 13.96 | 1.90 |
| Total | 7,343,119 | 18,660,103 | 15,073 | 26,018,295 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de mujeres de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de cáncer de mama por grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | Proporciones | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 233,287 | 4,769,372 | 5,855 | 5,008,514 | 9.01 | 20.37 | 38.71 | 19.25 |
| 25 a 29 años | 372,415 | 3,729,253 | 2,347 | 4,104,015 | 14.38 | 15.93 | 15.52 | 15.77 |
| 30 a 34 años | 421,954 | 3,113,423 | - | 3,535,377 | 16.29 | 13.30 | - | 13.59 |
| 35 a 39 años | 411,224 | 2,728,233 | - | 3,139,457 | 15.88 | 11.65 | - | 12.07 |
| 40 a 44 años | 347,129 | 2,008,809 | 1,441 | 2,357,379 | 13.40 | 8.58 | 9.53 | 9.06 |
| 45 a 49 años | 274,380 | 1,650,408 | 128 | 1,924,916 | 10.60 | 7.05 | 0.85 | 7.40 |
| 50 a 54 años | 180,354 | 1,344,918 | 2,635 | 1,527,907 | 6.96 | 5.74 | 17.42 | 5.87 |
| 55 a 59 años | 119,473 | 1,056,644 | 301 | 1,176,418 | 4.61 | 4.51 | 1.99 | 4.52 |
| 60 a 64 años | 97,496 | 941,921 | - | 1,039,417 | 3.76 | 4.02 | - | 3.99 |
| 65 a 69 años | 67,466 | 713,478 | - | 780,944 | 2.61 | 3.05 | - | 3.00 |
| 70 a 74 años | 37,203 | 538,791 | 177 | 576,171 | 1.44 | 2.30 | 1.17 | 2.21 |
| 75 a 79 años | 14,915 | 339,200 | 136 | 354,251 | 0.58 | 1.45 | 0.90 | 1.36 |
| 80 y más | 12,299 | 478,884 | 2,104 | 493,287 | 0.47 | 2.05 | 13.91 | 1.90 |
| Total | 2,589,595 | 23,413,334 | 15,124 | 26,018,053 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de población de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de tuberculosis por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 43,554 | 4,321,459 | 542 | 4,365,555 | 28,728 | 5,006,568 | 1,208 | 5,036,504 | 11.51 | 18.90 | 7.01 | 18.78 | 9.54 | 19.36 | 14.77 | 19.25 |
| 25 a 29 años | 48,587 | 3,584,082 | - | 3,632,669 | 23,829 | 4,106,834 | 2,347 | 4,133,010 | 12.84 | 15.68 | - | 15.63 | 7.92 | 15.88 | 28.69 | 15.79 |
| 30 a 34 años | 42,057 | 3,111,281 | - | 3,153,338 | 41,233 | 3,522,155 | - | 3,563,388 | 11.11 | 13.61 | - | 13.56 | 13.70 | 13.62 | - | 13.62 |
| 35 a 39 años | 50,082 | 2,740,666 | 378 | 2,791,126 | 46,165 | 3,115,696 | - | 3,161,861 | 13.24 | 11.99 | 4.89 | 12.01 | 15.34 | 12.05 | - | 12.08 |
| 40 a 44 años | 42,671 | 2,130,288 | 943 | 2,173,902 | 33,883 | 2,330,760 | 407 | 2,365,050 | 11.28 | 9.32 | 12.19 | 9.35 | 11.26 | 9.01 | 4.98 | 9.04 |
| 45 a 49 años | 37,115 | 1,710,890 | - | 1,748,005 | 29,006 | 1,902,985 | 128 | 1,932,119 | 9.81 | 7.48 | - | 7.52 | 9.64 | 7.36 | 1.56 | 7.38 |
| 50 a 54 años | 19,636 | 1,426,113 | 909 | 1,446,658 | 35,784 | 1,498,656 | 2,116 | 1,536,556 | 5.19 | 6.24 | 11.75 | 6.22 | 11.89 | 5.80 | 25.87 | 5.87 |
| 55 a 59 años | 19,064 | 1,078,257 | 464 | 1,097,785 | 18,495 | 1,161,260 | 276 | 1,180,031 | 5.04 | 4.72 | 6.00 | 4.72 | 6.14 | 4.49 | 3.37 | 4.51 |
| 60 a 64 años | 25,153 | 917,447 | 420 | 943,020 | 13,997 | 1,032,860 | 592 | 1,047,449 | 6.65 | 4.01 | 5.43 | 4.06 | 4.65 | 3.99 | 7.24 | 4.00 |
| 65 a 69 años | 20,520 | 667,467 | 70 | 688,057 | 13,870 | 770,448 | - | 784,318 | 5.42 | 2.92 | 0.90 | 2.96 | 4.61 | 2.98 | - | 3.00 |
| 70 a 74 años | 15,260 | 510,992 | 3,880 | 530,132 | 4,940 | 575,046 | - | 579,986 | 4.03 | 2.24 | 50.15 | 2.28 | 1.64 | 2.22 | - | 2.22 |
| 75 a 79 años | 5,201 | 319,632 | 131 | 324,964 | 4,768 | 350,284 | - | 355,052 | 1.37 | 1.40 | 1.69 | 1.40 | 1.58 | 1.35 | - | 1.36 |
| 80 y más | 9,492 | 343,134 | - | 352,626 | 6,321 | 486,504 | 1,106 | 493,931 | 2.51 | 1.50 | - | 1.52 | 2.10 | 1.88 | 13.52 | 1.89 |
| Total | 378,392 | 22,861,708 | 7,737 | 23,247,837 | 301,019 | 25,860,056 | 8,180 | 26,169,255 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de población de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de diabetes por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 195,780 | 4,168,817 | 958 | 4,365,555 | 248,369 | 4,787,466 | 669 | 5,036,504 | 8.90 | 19.82 | 29.47 | 18.79 | 7.68 | 20.88 | 9.26 | 19.25 |
| 25 a 29 años | 228,311 | 3,404,358 | - | 3,632,669 | 377,097 | 3,753,566 | 2,347 | 4,133,010 | 10.38 | 16.18 | - | 15.63 | 11.66 | 16.37 | 32.48 | 15.79 |
| 30 a 34 años | 272,229 | 2,870,729 | 1,002 | 3,143,960 | 364,339 | 3,200,022 | - | 3,564,361 | 12.38 | 13.65 | 30.82 | 13.53 | 11.26 | 13.96 | - | 13.62 |
| 35 a 39 años | 191,533 | 2,599,593 | - | 2,791,126 | 404,981 | 2,756,880 | - | 3,161,861 | 8.71 | 12.36 | - | 12.01 | 12.52 | 12.02 | - | 12.08 |
| 40 a 44 años | 223,809 | 1,950,093 | - | 2,173,902 | 347,379 | 2,017,264 | 407 | 2,365,050 | 10.18 | 9.27 | - | 9.35 | 10.74 | 8.80 | 5.63 | 9.04 |
| 45 a 49 años | 207,498 | 1,540,507 | - | 1,748,005 | 330,095 | 1,602,024 | - | 1,932,119 | 9.43 | 7.32 | - | 7.52 | 10.20 | 6.99 | - | 7.38 |
| 50 a 54 años | 178,213 | 1,267,536 | 909 | 1,446,658 | 330,868 | 1,203,572 | 2,116 | 1,536,556 | 8.10 | 6.03 | 27.96 | 6.23 | 10.23 | 5.25 | 29.28 | 5.87 |
| 55 a 59 años | 192,451 | 905,060 | 274 | 1,097,785 | 237,692 | 942,063 | 276 | 1,180,031 | 8.75 | 4.30 | 8.43 | 4.72 | 7.35 | 4.11 | 3.82 | 4.51 |
| 60 a 64 años | 178,961 | 764,059 | - | 943,020 | 228,168 | 818,976 | 305 | 1,047,449 | 8.14 | 3.63 | - | 4.06 | 7.05 | 3.57 | 4.22 | 4.00 |
| 65 a 69 años | 135,591 | 552,466 | - | 688,057 | 153,133 | 631,185 | - | 784,318 | 6.17 | 2.63 | - | 2.96 | 4.73 | 2.75 | - | 3.00 |
| 70 a 74 años | 105,042 | 424,982 | 108 | 530,132 | 113,112 | 466,874 | - | 579,986 | 4.78 | 2.02 | 3.32 | 2.28 | 3.50 | 2.04 | - | 2.22 |
| 75 a 79 años | 47,164 | 277,800 | - | 324,964 | 61,545 | 293,507 | - | 355,052 | 2.14 | 1.32 | - | 1.40 | 1.90 | 1.28 | - | 1.36 |
| 80 y más | 42,670 | 309,956 | - | 352,626 | 38,053 | 454,772 | 1,106 | 493,931 | 1.94 | 1.47 | - | 1.52 | 1.18 | 1.98 | 15.31 | 1.89 |
| | 2,199,252 | 21,035,956 | 3,251 | 23,238,459 | 3,234,831 | 22,928,171 | 7,226 | 26,170,228 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Dirección de Estadísticas DF con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de población de 20 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, para la Detección de hipertensión por sexo y grupos de edad**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 235,823 | 4,128,774 | 958 | 4,365,555 | 438,257 | 4,597,578 | 669 | 5,036,504 | 8.72 | 20.11 | 22.81 | 18.79 | 10.44 | 20.93 | 9.14 | 19.25 |
| 25 a 29 años | 284,417 | 3,348,252 | - | 3,632,669 | 520,578 | 3,610,085 | 2,347 | 4,133,010 | 10.52 | 16.31 | - | 15.63 | 12.40 | 16.44 | 32.07 | 15.79 |
| 30 a 34 años | 338,363 | 2,804,595 | 1,002 | 3,143,960 | 436,432 | 3,127,929 | - | 3,564,361 | 12.51 | 13.66 | 23.86 | 13.53 | 10.40 | 14.24 | - | 13.62 |
| 35 a 39 años | 295,232 | 2,495,894 | - | 2,791,126 | 475,567 | 2,686,294 | - | 3,161,861 | 10.92 | 12.16 | - | 12.01 | 11.33 | 12.23 | - | 12.08 |
| 40 a 44 años | 262,732 | 1,911,170 | - | 2,173,902 | 413,899 | 1,950,475 | 676 | 2,365,050 | 9.72 | 9.31 | - | 9.35 | 9.86 | 8.88 | 9.24 | 9.04 |
| 45 a 49 años | 243,815 | 1,504,190 | - | 1,748,005 | 436,786 | 1,495,205 | 128 | 1,932,119 | 9.02 | 7.33 | - | 7.52 | 10.41 | 6.81 | 1.75 | 7.38 |
| 50 a 54 años | 237,189 | 1,208,560 | 909 | 1,446,658 | 405,322 | 1,129,118 | 2,116 | 1,536,556 | 8.77 | 5.89 | 21.64 | 6.23 | 9.66 | 5.14 | 28.92 | 5.87 |
| 55 a 59 años | 197,968 | 899,543 | 274 | 1,097,785 | 286,675 | 893,080 | 276 | 1,180,031 | 7.32 | 4.38 | 6.52 | 4.72 | 6.83 | 4.07 | 3.77 | 4.51 |
| 60 a 64 años | 201,809 | 740,262 | 949 | 943,020 | 266,394 | 781,055 | - | 1,047,449 | 7.46 | 3.61 | 22.60 | 4.06 | 6.35 | 3.56 | - | 4.00 |
| 65 a 69 años | 170,125 | 517,932 | - | 688,057 | 183,666 | 600,652 | - | 784,318 | 6.29 | 2.52 | - | 2.96 | 4.38 | 2.73 | - | 3.00 |
| 70 a 74 años | 111,969 | 418,055 | 108 | 530,132 | 152,076 | 427,910 | - | 579,986 | 4.14 | 2.04 | 2.57 | 2.28 | 3.62 | 1.95 | - | 2.22 |
| 75 a 79 años | 61,028 | 263,936 | - | 324,964 | 90,892 | 264,160 | - | 355,052 | 2.26 | 1.29 | - | 1.40 | 2.17 | 1.20 | - | 1.36 |
| 80 y más | 63,385 | 289,241 | - | 352,626 | 90,913 | 401,912 | 1,106 | 493,931 | 2.34 | 1.41 | - | 1.52 | 2.17 | 1.83 | 15.11 | 1.89 |
| Total | 2,703,855 | 20,530,404 | 4,200 | 23,238,459 | 4,197,457 | 21,965,453 | 7,318 | 26,170,228 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Dirección de Estadísticas DF con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que manifestaron algún problema de salud en las últimas dos semanas previas a la encuesta**

| Problema de salud | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 1,072,124 | 18.0 |
| No | 4,855,098 | 81.5 |
| No responde | 12,194 | .2 |
| No sabe | 17,254 | .3 |
| Total | 5,956,670 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 o más que describen cuál fue el último problema de salud que tuvo en las últimas dos semanas previas a la encuesta**

| Problemas de salud | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Infecciones respiratorias | 337,510 | 31.5 |
| Neumonía o Bronconeumonía | 11,943 | 1.1 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva cronica (bronquitis crónica | 10,157 | .9 |
| Cáncer o tumores malignos | 9,480 | .9 |
| Tos, catarro, dolor de garganta | 280,738 | 26.2 |
| Enfermedades de corazón | 10,157 | .9 |
| Fiebre reumatica | 2,902 | .3 |
| Diarrea | 37,854 | 3.5 |
| Enfermedades renales | 9,288 | .9 |
| Infección de vías urinarias | 8,710 | .8 |
| Gastritis o úlcera gástrica | 8,706 | .8 |
| Dolor de cabeza o cefalea sin otra manisfestación | 14,515 | 1.4 |
| Diabetes | 42,176 | 3.9 |
| Hipertensión arterial | 54,252 | 5.1 |
| Artritis | 5,224 | .5 |
| Alergias | 2,902 | .3 |
| Problemas de la piel | 5,032 | .5 |
| Lesión física por accidente | 72,884 | 6.8 |
| Lesión física por agresión | 15,961 | 1.5 |
| Depresión | 3,869 | .4 |
| Otro problema | 127,864 | 11.9 |
| Total | 1,072,124 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Adultos de 20 o más que describen cuál fue el último problema de salud que tuvo en las últimas dos semanas previas a la encuesta, por grupo de edad y sexo**

| Sexo | Problemas de salud | Grupos quinquenales | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 a 44 años | 45 a 49 años | 50 a 54 años | 55 a 59 años | 60 a 64 años | 65 a 69 años | 70 a 74 años | 75 a 79 años | 80 y más | |
| HOMBRE | Infecciones respiratorias | 19,282 | 16,266 | 24,091 | 8,998 | 8,710 | 13,060 | 18,091 | 12,268 | 7,934 | 16,002 | - | 3,484 | - | 148,186 |
| | Neumonía o Bronconeumonía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,353 | - | - | 4,353 |
| | Enfermedad pulmonar obstructiva cronica (bronquitis crónica | - | - | 2,902 | - | - | - | - | - | - | - | 5,804 | - | - | 8,706 |
| | Cáncer o tumores malignos | - | - | - | - | 2,902 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,902 |
| | Tos, catarro, dolor de garganta | 4,353 | 4,353 | 14,464 | 10,572 | 5,226 | - | 24,238 | 12,772 | - | 11,182 | - | 4,609 | - | 91,769 |
| | Enfermedades de corazón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,451 | 1,451 |
| | Diarrea | - | 7,255 | - | - | - | 3,484 | 10,380 | 3,676 | - | - | - | - | - | 24,795 |
| | Gastritis o úlcera gástrica | - | - | - | - | - | 2,902 | - | - | - | - | 4,353 | - | - | 7,255 |
| | Dolor de cabeza o cefalea sin otra manisfestación | - | - | - | - | - | 10,162 | - | - | - | - | - | - | - | 10,162 |
| | Diabetes | - | - | - | - | - | 8,982 | 6,968 | 2,902 | - | - | - | - | - | 18,852 |
| | Hipertensión arterial | - | - | - | - | 5,804 | - | 7,466 | - | 5,226 | - | - | 5,804 | - | 24,300 |
| | Lesión física por accidente | - | 15,096 | 3,484 | - | - | 8,706 | 4,353 | 7,255 | - | - | - | - | - | 38,894 |
| | Lesión física por agresión | - | 13,059 | - | - | - | - | - | 2,902 | - | - | - | - | - | 15,961 |
| | Depresión | - | - | - | - | - | 3,869 | - | - | - | - | - | - | - | 3,869 |
| | Otro problema | - | - | 7,082 | - | 4,354 | - | - | - | 11,761 | 6,968 | 1,451 | 4,688 | - | 36,304 |
| | Total | 23,635 | 56,029 | 52,023 | 19,570 | 26,996 | 51,165 | 71,496 | 41,775 | 24,921 | 34,152 | 15,961 | 18,585 | 1,451 | 437,759 |
| MUJER | Infecciones respiratorias | 7,546 | 29,474 | 16,404 | 33,767 | 13,932 | 9,786 | 16,958 | 9,579 | 9,786 | 19,644 | 5,804 | 2,902 | 13,742 | 189,324 |
| | Neumonía o Bronconeumonía | - | - | - | 2,902 | - | 4,688 | - | - | - | - | - | - | - | 7,590 |
| | Enfermedad pulmonar obstructiva cronica (bronquitis crónica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,451 | - | - | 1,451 |
| | Cáncer o tumores malignos | - | - | - | - | - | 6,578 | - | - | - | - | - | - | - | 6,578 |
| | Tos, catarro, dolor de garganta | 18,865 | 17,510 | 38,064 | 12,663 | 22,018 | 15,961 | 11,646 | 20,315 | 5,804 | 7,255 | 12,772 | 1,742 | 4,354 | 188,969 |
| | Enfermedades de corazón | - | - | - | - | - | - | 5,804 | - | - | 2,902 | - | - | - | 8,706 |
| | Fiebre reumatica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,902 | - | - | 2,902 |
| | Diarrea | - | 2,902 | - | - | - | - | 4,353 | - | - | - | - | 2,902 | 2,902 | 13,059 |
| | Enfermedades renales | - | - | - | - | - | 5,804 | - | - | - | 3,484 | - | - | - | 9,288 |
| | Infección de vías urinarias | - | 8,710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,710 |
| | Gastritis o úlcera gástrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,451 | - | - | 1,451 |
| | Dolor de cabeza o cefalea sin otra manisfestación | - | - | - | - | 2,902 | - | - | - | - | - | 1,451 | - | - | 4,353 |
| | Diabetes | - | - | - | - | - | - | 5,804 | - | - | 17,520 | - | - | - | 23,324 |
| | Hipertensión arterial | - | - | - | 2,375 | - | - | 11,030 | - | 2,902 | - | - | 4,935 | 8,710 | 29,952 |
| | Artritis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,224 | - | - | - | 5,224 |
| | Alergias | - | - | 2,902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,902 |
| | Problemas de la piel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,032 | - | - | - | 5,032 |
| | Lesión física por accidente | 5,226 | - | - | 3,513 | 9,290 | 2,902 | 2,902 | 7,255 | - | - | 2,902 | - | - | 33,990 |
| | Otro problema | - | - | 26,653 | 10,596 | 1,451 | 12,481 | 14,807 | - | 7,205 | - | 9,950 | 3,484 | 4,933 | 91,560 |
| | Total | 31,637 | 58,596 | 84,023 | 65,816 | 49,593 | 58,200 | 73,304 | 37,149 | 25,697 | 61,061 | 38,683 | 15,965 | 34,641 | 634,365 |

Fuente: Elaboración propiacon base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 o más que describen cuál fue el último problema de salud que tuvo en las últimas dos semanas previas a la encuesta, por grupo de edad y sexo**

| Sexo | Problemas de salud | Grupos quinquenales | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 a 44 años | 45 a 49 años | 50 a 54 años | 55 a 59 años | 60 a 64 años | 65 a 69 años | 70 a 74 años | 75 a 79 años | 80 y más | |
| HOMBRE | Infecciones respiratorias | 81.6 | 29.0 | 46.3 | 46.0 | 32.3 | 25.5 | 25.3 | 29.4 | 31.8 | 46.9 | - | 18.7 | - | 33.9 |
| | Neumonía o Bronconeumonía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | - | - | 1.0 |
| | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (bronquitis crónica | - | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | - | - | 2.0 |
| | Cáncer o tumores malignos | - | - | - | - | 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| | Tos, catarro, dolor de garganta | 18.4 | 7.8 | 27.8 | 54.0 | 19.4 | - | 33.9 | 30.6 | - | 32.7 | - | 24.8 | - | 21.0 |
| | Enfermedades de corazón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.3 |
| | Diarrea | - | 12.9 | - | - | - | 6.8 | 14.5 | 8.8 | - | - | - | - | - | 5.7 |
| | Gastritis o úlcera gástrica | - | - | - | - | - | 5.7 | - | - | - | - | 27.3 | - | - | 1.7 |
| | Dolor de cabeza o cefalea sin otra manifestación | - | - | - | - | - | 19.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 |
| | Diabetes | - | - | - | - | - | 17.6 | 9.7 | 6.9 | - | - | - | - | - | 4.3 |
| | Hipertensión arterial | - | - | - | - | 21.5 | - | 10.4 | - | 21.0 | - | - | 31.2 | - | 5.6 |
| | Lesión física por accidente | - | 26.9 | 6.7 | - | - | 17.0 | 6.1 | 17.4 | - | - | - | - | - | 8.9 |
| | Lesión física por agresión | - | 23.3 | - | - | - | - | - | 6.9 | - | - | - | - | - | 3.6 |
| | Depresión | - | - | - | - | - | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
| | Otro problema | - | - | 13.6 | - | 16.1 | - | - | - | 47.2 | 20.4 | 9.1 | 25.2 | - | 8.3 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| MUJER | Infecciones respiratorias | 23.9 | 50.3 | 19.5 | 51.3 | 28.1 | 16.8 | 23.1 | 25.8 | 38.1 | 32.2 | 15.0 | 18.2 | 39.7 | 29.8 |
| | Neumonía o Bronconeumonía | - | - | - | 4.4 | - | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 |
| | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (bronquitis crónica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | - | - | 0.2 |
| | Cáncer o tumores malignos | - | - | - | - | - | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| | Tos, catarro, dolor de garganta | 59.6 | 29.9 | 45.3 | 19.2 | 44.4 | 27.4 | 15.9 | 54.7 | 22.6 | 11.9 | 33.0 | 10.9 | 12.6 | 29.8 |
| | Enfermedades de corazón | - | - | - | - | - | - | 7.9 | - | - | 4.8 | - | - | - | 1.4 |
| | Fiebre reumatica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | 0.5 |
| | Diarrea | - | 5.0 | - | - | - | - | 5.9 | - | - | - | - | 18.2 | 8.4 | 2.1 |
| | Enfermedades renales | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | - | 5.7 | - | - | - | 1.5 |
| | Infección de vías urinarias | - | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 |
| | Gastritis o úlcera gástrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | - | - | 0.2 |
| | Dolor de cabeza o cefalea sin otra manifestación | - | - | - | - | 5.9 | - | - | - | - | - | 3.8 | - | - | 0.7 |
| | Diabetes | - | - | - | - | - | - | 7.9 | - | - | 28.7 | - | - | - | 3.7 |
| | Hipertensión arterial | - | - | - | 3.6 | - | - | 15.0 | - | 11.3 | - | - | 30.9 | 25.1 | 4.7 |
| | Artritis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 | - | - | - | 0.8 |
| | Alergias | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| | Problemas de la piel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 | - | - | - | 0.8 |
| | Lesión física por accidente | 16.5 | - | - | 5.3 | 18.7 | 5.0 | 4.0 | 19.5 | - | - | 7.5 | - | - | 5.4 |
| | Otro problema | - | - | 31.7 | 16.1 | 2.9 | 21.4 | 20.2 | - | 28.0 | - | 25.7 | 21.8 | 14.2 | 14.4 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que manifestaron algún problema de salud en las últimas dos semanas previas a la encuesta**

| Problema de salud | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 7,745,131 | 12.9 |
| No | 52,086,515 | 86.9 |
| No responde | 37,116 | .1 |
| No sabe | 53,744 | .1 |
| Total | 59,922,506 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Adultos de 20 o más que describen cuál fue el último problema de salud que tuvo en las últimas dos semanas previas a la encuesta, por grupo de edad y sexo**

| Sexo | Problemas de salud | Grupos quinquenales | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 a 44 años | 45 a 49 años | 50 a 54 años | 55 a 59 años | 60 a 64 años | 65 a 69 años | 70 a 74 años | 75 a 79 años | 80 y más | | |
| HOMBRE | Infecciones respiratorias | 74,241 | 97,534 | 86,631 | 65,705 | 60,695 | 65,831 | 58,370 | 78,395 | 55,953 | 41,775 | 15,886 | 11,030 | 27,404 | | 739,450 |
| | Neumonía o Bronconeumonía | - | - | 4,822 | 623 | - | - | - | 4,086 | 471 | - | 5,830 | 1,305 | 2,602 | | 19,739 |
| | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (bronquitis crónica | 2,384 | 785 | 2,902 | 814 | 1,028 | 4,570 | - | 3,677 | 1,209 | 333 | 5,804 | 1,503 | 2,374 | | 27,383 |
| | Cáncer o tumores malignos | - | - | 530 | - | 2,902 | 624 | - | - | 1,494 | 602 | - | - | - | | 6,152 |
| | Tos, catarro, dolor de garganta | 51,737 | 70,603 | 135,539 | 78,247 | 63,116 | 41,837 | 71,155 | 46,371 | 26,661 | 33,834 | 19,689 | 29,467 | 7,942 | | 676,198 |
| | Tuberculosis | - | - | - | - | - | 2,443 | - | - | - | - | - | - | - | | 2,443 |
| | Enfermedades de corazón | - | 602 | - | 2,721 | - | 3,534 | 560 | 10,200 | 4,023 | 1,496 | 2,980 | 9,119 | 1,451 | | 36,686 |
| | Fiebre reumatica | - | - | - | - | 2,278 | - | 3,324 | - | 488 | - | 538 | - | 1,238 | | 7,866 |
| | Infección de oído | - | 163 | 1,312 | 1,312 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2,892 |
| | Conjuntivitis | - | 2,054 | 708 | - | 822 | - | 2,850 | 309 | 8,778 | - | - | - | - | | 15,521 |
| | Asma | 1,612 | 146 | 11,958 | - | - | - | - | - | 3,234 | 1,244 | - | 944 | 1,176 | | 20,314 |
| | Diarrea | 5,336 | 16,761 | 9,011 | 5,749 | 11,361 | 10,287 | 18,980 | 3,822 | 3,851 | 6,820 | 3,116 | - | 4,870 | | 99,904 |
| | Enfermedades renales | - | 1,285 | 2,984 | 2,239 | 5,171 | 8,495 | 3,312 | 2,592 | 3,236 | 2,412 | 3,223 | 266 | 2,352 | | 37,567 |
| | Infección de vías urinarias | - | - | - | 6,869 | - | 3,428 | - | 1,202 | 149 | - | 2,562 | - | 1,485 | | 15,695 |
| | Gastritis o úlcera gástrica | 3,741 | 6,844 | 3,921 | 15,641 | 7,132 | 31,209 | 8,148 | 6,634 | 5,143 | 1,325 | 5,346 | 3,766 | 820 | | 99,670 |
| | Colitis | - | 822 | 2,656 | - | - | - | 3,932 | - | - | 4,928 | - | - | - | | 12,338 |
| | Parasitosis intestinal | 5,147 | - | 588 | 4,416 | - | - | - | - | 1,212 | - | - | - | - | | 11,363 |
| | Obesidad | - | - | 314 | 1,386 | 2,432 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4,132 |
| | Dolor de cabeza o cefalea sin otra manifestación | 1,095 | 1,892 | 13,030 | 13,105 | 12,283 | 18,087 | 23,921 | 9,875 | 4,756 | 10,946 | 3,140 | 4,093 | 1,859 | | 118,082 |
| | Fiebre sin otra manofestación | - | 1,342 | 1,874 | 2,820 | - | - | 925 | 1,359 | 1,668 | 986 | - | 105 | - | | 11,079 |
| | Infección de transmición sexual | - | - | 822 | - | - | - | 5,716 | - | - | - | - | - | - | | 6,538 |
| | Diabetes | 714 | 240 | 2,967 | 6,537 | 5,367 | 32,083 | 20,192 | 36,924 | 4,620 | 10,603 | 2,153 | 12,858 | 3,898 | | 139,156 |
| | Hipertensión arterial | - | 6,398 | 9,267 | 4,080 | 11,052 | 8,485 | 15,057 | 9,716 | 9,365 | 18,535 | 11,061 | 15,118 | 6,694 | | 124,828 |
| | Embolia o derrame cerebral | - | - | - | - | - | 1,028 | 1,332 | - | - | 4,864 | 3,239 | - | 822 | | 11,285 |
| | Artritis | - | - | - | 8,302 | 2,282 | - | 5,415 | 4,275 | - | 5,268 | - | 2,530 | 1,362 | | 29,434 |
| | Alergias | 739 | 1,702 | 1,337 | 885 | 13,451 | 2,848 | 576 | 1,125 | - | - | - | - | 1,500 | | 24,163 |
| | Problemas de la piel | 510 | 973 | 1,665 | 340 | 1,386 | 1,110 | 966 | 2,526 | 1,005 | 534 | 2,611 | - | - | | 13,026 |
| | Enfermedad bucodental | 896 | 5,367 | 3,334 | - | 3,693 | 7,075 | 1,788 | 1,962 | 2,652 | - | - | 726 | - | | 26,593 |
| | Dengue | - | - | - | 3,265 | 3,638 | 144 | - | 1,542 | - | - | - | - | - | | 8,589 |
| | Intoxicación por veneno de alacrán, serpiente, araña | 534 | - | - | 2,885 | - | - | - | - | - | 2,117 | - | - | - | | 5,536 |
| | Alcoholismo | - | - | 1,760 | - | 1,864 | - | - | - | 418 | 1,699 | - | - | 3,128 | | 8,869 |
| | Tabaquismo | - | - | - | 1,304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1,304 |
| | Padecimientos generados por consumo de drogas | - | - | - | - | 3,234 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3,234 |
| | Lesión física por accidente | 20,846 | 30,282 | 20,019 | 37,828 | 21,515 | 23,492 | 17,917 | 18,698 | 14,591 | 6,258 | 2,674 | 3,058 | 5,013 | | 222,191 |
| | Lesión física por agresión | 2,064 | 19,585 | 1,974 | 314 | 3,734 | 942 | - | 2,902 | - | 573 | - | - | - | | 32,088 |
| | Pérdida de la memoria | - | 4,389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4,389 |
| | Estrés | - | - | - | 2,874 | 2,909 | 3,040 | 4,604 | 822 | 3,911 | 468 | - | - | - | | 18,628 |
| | Depresión | - | - | 144 | - | 1,052 | 3,869 | - | - | - | - | - | - | 163 | | 5,228 |
| | Susto, empacho, mal de ojo o aire | - | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,326 | | 1,734 |
| | Otro problema | 27,981 | 50,796 | 57,327 | 48,772 | 69,940 | 48,300 | 46,762 | 49,653 | 38,305 | 46,525 | 29,197 | 18,717 | 31,669 | | 563,944 |
| | No responde | - | - | - | 888 | 173 | 1,454 | - | - | - | - | - | - | - | | 2,515 |
| | No especificado | - | - | - | - | 726 | 807 | - | 89 | 5,700 | 1,416 | - | - | 1,509 | | 10,247 |
| | | 199,577 | 320,973 | 379,396 | 319,921 | 315,281 | 325,022 | 315,802 | 297,856 | 202,893 | 205,561 | 118,449 | 114,605 | 112,657 | | 3,227,993 |
| MUJER | Infecciones respiratorias | 80,791 | 83,258 | 108,961 | 105,091 | 142,811 | 76,313 | 76,894 | 46,847 | 69,700 | 36,314 | 24,090 | 18,975 | 32,497 | | 902,542 |
| | Neumonía o Bronconeumonía | 382 | 864 | 3,212 | 3,451 | 5,265 | 6,040 | 1,118 | - | 4,050 | 1,438 | - | 124 | 1,856 | | 27,860 |
| | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (bronquitis crónica | - | 2,620 | - | 1,848 | 157 | 476 | 1,823 | - | 701 | - | 1,605 | - | 1,369 | | 10,599 |
| | Cáncer o tumores malignos | - | 150 | 3,714 | 330 | 3,706 | 12,894 | - | 3,196 | 3,729 | 190 | 448 | - | - | | 28,357 |
| | Tos, catarro, dolor de garganta | 158,590 | 90,360 | 124,428 | 109,115 | 104,838 | 80,315 | 57,794 | 74,686 | 36,727 | 31,399 | 30,905 | 19,077 | 37,906 | | 956,140 |
| | Tuberculosis | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 316 |
| | Enfermedades de corazón | 9,742 | - | 722 | 4,187 | 1,329 | 4,273 | 10,272 | 4,921 | 528 | 9,233 | 8,722 | 1,122 | 3,970 | | 59,021 |
| | Fiebre reumatica | 888 | 3,315 | - | 2,175 | - | 644 | 1,920 | - | - | - | 5,200 | 484 | 1,246 | | 15,872 |
| | Infección de oído | 1,028 | 3,649 | 5,316 | 404 | 160 | 5,250 | 1,443 | 228 | - | 6,439 | 456 | - | - | | 24,373 |
| | Conjuntivitis | - | 1,028 | 1,010 | 1,464 | - | - | 512 | 576 | 790 | 266 | - | - | - | | 5,646 |
| | Asma | 3,074 | 256 | 2,170 | 3,395 | 12,394 | 3,616 | 1,591 | 3,154 | - | 190 | 119 | - | - | | 29,959 |
| | Diarrea | 2,899 | 2,902 | 4,806 | 6,006 | 8,594 | 12,134 | 14,003 | 4,595 | 4,302 | 12,000 | 4,411 | 6,396 | 7,141 | | 90,189 |
| | Enfermedades renales | 2,564 | 4,896 | 6,224 | - | 7,544 | 8,200 | 16,313 | 2,473 | 3,069 | 2,816 | 4,301 | 1,028 | - | | 60,295 |
| | Infección de vías urinarias | 3,070 | 15,596 | 3,238 | 13,001 | 4,363 | 3,462 | 1,944 | 1,233 | 3,478 | 3,462 | - | 1,529 | 540 | | 51,954 |
| | Gastritis o úlcera gástrica | 9,498 | 10,472 | 9,186 | 8,715 | 10,790 | 5,698 | 5,731 | 3,924 | 1,268 | 4,689 | 4,731 | 4,365 | 2,387 | | 81,454 |
| | Colitis | 6,965 | 9,768 | 2,020 | 9,772 | 10,844 | 8,796 | 741 | 2,600 | 3,740 | 730 | 224 | - | 856 | | 57,056 |
| | Parasitosis intestinal | - | - | - | 390 | - | 562 | 2,301 | - | - | - | - | - | - | | 3,253 |
| | Obesidad | - | 162 | - | - | 452 | 703 | 2,331 | - | - | - | - | - | - | | 3,648 |
| | Dolor de cabeza o cefalea sin otra manifestación | 10,565 | 14,299 | 19,827 | 42,379 | 18,826 | 26,443 | 25,149 | 8,065 | 15,801 | 3,053 | 3,868 | 13,492 | 357 | | 202,124 |
| | Fiebre sin otra manofestación | - | 3,769 | 1,608 | - | 2,748 | 4,076 | 525 | 1,648 | - | 1,734 | - | - | - | | 16,108 |
| | Enfermedad exantematica (varicela, rubéola, escarlatina) | 1,375 | - | - | 209 | 3,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4,587 |
| | Infección de transmición sexual | - | - | 1,382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1,382 |
| | Diabetes | - | 806 | 645 | 10,867 | 20,791 | 18,445 | 22,150 | 16,027 | 11,960 | 41,305 | 12,501 | 4,730 | 2,360 | | 162,587 |
| | Hipertensión arterial | 2,658 | 4,356 | 4,034 | 11,606 | 20,702 | 13,032 | 33,288 | 35,774 | 44,927 | 28,878 | 10,899 | 19,637 | 18,355 | | 248,146 |
| | Embolia o derrame cerebral | - | 860 | - | - | - | - | 157 | 157 | - | 3,098 | - | - | - | | 4,272 |
| | Artritis | - | 3,905 | 1,936 | 1,873 | 3,331 | 1,392 | 34,391 | 1,762 | 5,558 | 6,819 | 3,777 | 1,924 | 5,640 | | 72,308 |
| | Alergias | 2,627 | 8,136 | 4,701 | 9,560 | - | 1,362 | 1,243 | - | 2,766 | - | 2,958 | - | 138 | | 33,491 |
| | Problemas de la piel | 1,907 | 983 | 3,373 | 8,042 | - | 2,775 | - | 488 | - | 5,032 | 3,693 | 2,156 | - | | 28,449 |
| | Enfermedad bucodental | 2,641 | 2,177 | 6,214 | 2,986 | 5,903 | 19,199 | 314 | - | 441 | 300 | - | - | - | | 40,155 |
| | Dengue | - | 3,261 | 2,657 | 1,469 | 170 | 1,054 | 1,632 | 193 | 1,797 | - | - | - | - | | 12,233 |
| | Intoxicación por veneno de alacrán, serpiente, araña | - | - | - | 986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 986 |
| | Lesión física por accidente | 7,900 | 4,418 | 24,681 | 22,230 | 26,650 | 10,908 | 8,402 | 16,186 | 4,209 | 8,139 | 7,166 | 6,760 | 7,352 | | 155,001 |
| | Lesión física por agresión | 1,023 | - | - | 581 | 100 | - | 1,312 | - | - | - | - | - | - | | 3,016 |
| | Estrés | 1,011 | 5,002 | 2,249 | 3,491 | 2,334 | 216 | 2,366 | 3,812 | - | 1,089 | 1,917 | - | - | | 23,487 |
| | Depresión | 1,395 | - | 862 | 5,348 | 656 | 1,945 | - | - | - | - | 8,702 | - | 2,037 | | 20,945 |
| | Susto, empacho, mal de ojo o aire | 3,234 | - | 2,973 | 1,055 | - | 987 | - | - | - | 261 | - | 2,477 | 679 | | 11,646 |
| | Otro problema | 62,594 | 83,887 | 115,350 | 124,855 | 100,265 | 128,992 | 111,444 | 71,530 | 57,584 | 41,360 | 51,713 | 44,482 | 53,248 | | 1,047,304 |
| | No responde | - | - | - | 429 | - | 1,224 | - | - | - | - | - | - | - | | 1,653 |
| | No especificado | - | - | 4,748 | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | | 5,034 |
| | Total | 378,737 | 365,155 | 472,247 | 524,834 | 519,382 | 469,805 | 425,264 | 304,671 | 277,372 | 248,257 | 190,662 | 146,741 | 180,261 | | 4,503,388 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

Informe del Estado de Desarrollo Social del Distrito Federal
EvalúaDF-ICYT

**Nacional. Proporción de Adultos de 20 o más que describen cuál fue el último problema de salud que tuvo en las últimas dos semanas previas a la encuesta, por grupo de edad y sexo**

| Sexo | Problemas de salud | Grupos quinquenales | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 a 44 años | 45 a 49 años | 50 a 54 años | 55 a 59 años | 60 a 64 años | 65 a 69 años | 70 a 74 años | 75 a 79 años | 80 y más | |
| HOMBRE | Infecciones respiratorias | 37.2 | 30.4 | 22.8 | 20.5 | 19.3 | 20.3 | 18.5 | 26.3 | 27.6 | 20.3 | 13.4 | 9.6 | 24.3 | 22.9 |
| | Neumonía o Bronconeumonía | - | - | 1.3 | 0.2 | - | - | - | 1.4 | 0.2 | - | 4.9 | 1.1 | 2.3 | 0.6 |
| | Enfermedad pulmonar obstructiva cronica (bronquitis crónica | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | - | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 4.9 | 1.3 | 2.1 | 0.8 |
| | Cáncer o tumores malignos | - | - | 0.1 | - | 0.9 | 0.2 | - | - | 0.7 | 0.3 | - | - | - | 0.2 |
| | Tos, catarro, dolor de garganta | 25.9 | 22.0 | 35.7 | 24.5 | 20.0 | 12.9 | 22.5 | 15.6 | 13.1 | 16.5 | 16.6 | 25.7 | 7.0 | 20.9 |
| | Tuberculosis | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| | Enfermedades de corazón | - | 0.2 | - | 0.9 | - | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 2.0 | 0.7 | 2.5 | 8.0 | 1.3 | 1.1 |
| | Fiebre reumatica | - | - | - | - | 0.7 | - | 1.1 | - | 0.2 | - | 0.5 | - | 1.1 | 0.2 |
| | Infección de oido | - | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| | Conjuntivitis | - | 0.6 | 0.2 | - | 0.3 | - | 0.9 | 0.1 | 4.3 | - | - | - | - | 0.5 |
| | Asma | 0.8 | 0.0 | 3.2 | - | - | - | - | - | 1.6 | 0.6 | - | 0.8 | 1.0 | 0.6 |
| | Diarrea | 2.7 | 5.2 | 2.4 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 6.0 | 1.3 | 1.9 | 3.3 | 2.6 | - | 4.3 | 3.1 |
| | Enfermedades renales | - | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 2.1 | 1.2 |
| | Infección de vías urinarias | - | - | - | 2.1 | - | 1.1 | - | 0.4 | 0.1 | - | 2.2 | - | 1.3 | 0.5 |
| | Gastritis o úlcera gástrica | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 4.9 | 2.3 | 9.6 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 3.3 | 0.7 | 3.1 |
| | Colitis | - | 0.3 | 0.7 | - | - | - | 1.2 | - | - | 2.4 | - | - | - | 0.4 |
| | Parasitosis intestinal | 2.6 | - | 0.2 | 1.4 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | 0.4 |
| | Obesidad | - | - | 0.1 | 0.4 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| | Dolor de cabeza o cefalea sin otra manisfestación | 0.5 | 0.6 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 5.6 | 7.6 | 3.3 | 2.3 | 5.3 | 2.7 | 3.6 | 1.7 | 3.7 |
| | Fiebre sin otra manofestación | - | 0.4 | 0.5 | 0.9 | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.3 |
| | Infeccíon de transmición sexual | - | - | 0.2 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| | Diabetes | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 9.9 | 6.4 | 12.4 | 2.3 | 5.2 | 1.8 | 11.2 | 3.5 | 4.3 |
| | Hipertensión arterial | - | 2.0 | 2.4 | 1.3 | 3.5 | 2.6 | 4.8 | 3.3 | 4.6 | 9.0 | 9.3 | 13.2 | 5.9 | 3.9 |
| | Embolia o derrame cerebral | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.4 | - | - | 2.4 | 2.7 | - | 0.7 | 0.3 |
| | Artritis | - | - | - | 2.6 | 0.7 | - | 1.7 | 1.4 | - | 2.6 | - | 2.2 | 1.2 | 0.9 |
| | Alergias | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 4.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | - | - | - | - | 1.3 | 0.7 |
| | Problemas de la piel | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | - | - | 0.4 |
| | Enfermedad bucodental | 0.4 | 1.7 | 0.9 | - | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | - | - | 0.6 | - | 0.8 |
| | Dengue | - | - | - | 1.0 | 1.2 | 0.0 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.3 |
| | Intoxicación por veneno de alacrán, serpiente, araña | 0.3 | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 0.2 |
| | Alcoholismo | - | - | 0.5 | - | 0.6 | - | - | - | 0.2 | 0.8 | - | - | 2.8 | 0.3 |
| | Tabaquismo | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| | Padecimientos generados por consumo de drogas | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| | Lesión física por accidente | 10.4 | 9.4 | 5.3 | 11.8 | 6.8 | 7.2 | 5.7 | 6.3 | 7.2 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 4.4 | 6.9 |
| | Lesión física por agresión | 1.0 | 6.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | - | 1.0 | - | 0.3 | - | - | - | 1.0 |
| | Pérdida de la memoria | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| | Estrés | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | - | - | - | 0.6 |
| | Depresión | - | - | 0.0 | - | 0.3 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 |
| | Susto, empacho, mal de ojo o aire | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0.1 |
| | Otro problema | 14.0 | 15.8 | 15.1 | 15.2 | 22.2 | 14.9 | 14.8 | 16.7 | 18.9 | 22.6 | 24.6 | 16.3 | 28.1 | 17.5 |
| | No responde | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| | No especificado | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.0 | 2.8 | 0.7 | - | - | 1.3 | 0.3 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| MUJER | Infecciones respiratorias | 21.3 | 22.8 | 23.1 | 20.0 | 27.5 | 16.2 | 18.1 | 15.4 | 25.1 | 14.6 | 12.6 | 12.9 | 18.0 | 20.0 |
| | Neumonía o Bronconeumonía | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | - | 1.5 | 0.6 | - | 0.1 | 1.0 | 0.6 |
| | Enfermedad pulmonar obstructiva cronica (bronquitis crónica | - | 0.7 | - | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | 0.8 | - | 0.8 | 0.2 |
| | Cáncer o tumores malignos | - | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 2.7 | - | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.6 |

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 o más que durante el último año, previo a la entrevista, algún médico le diagnosticó alguna enfermedad crónica**

| Enfermedades Crónicas | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| asma? | 31,057 | .5 |
| presión alta (hipertensión)? | 284,550 | 4.8 |
| diabetes (azucar alta en la sangre)? | 82,957 | 1.4 |
| artritis? | 32,697 | .5 |
| artrosis? | 7,549 | .1 |
| enfermedad del corazón | 27,311 | .5 |
| fiebre reumática? | 10,452 | .2 |
| enfermedad renal? | 17,016 | .3 |
| depresión o ansiedad? | 10,160 | .2 |
| gastritis o úlcera gástrica | 111,930 | 1.9 |
| colitis? | 39,138 | .7 |
| tumores, cáncer? | 10,962 | .2 |
| No | 5,202,961 | 87.3 |
| Otra enfermedad con duración mayor a 3 meses? | 80,675 | 1.4 |
| No responde | 4,353 | .1 |
| No sabe | 2,902 | .0 |
| Total | 5,956,670 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Adultos de 20 o más que durante el último año, previo a la entrevista, algún médico le diagnosticó alguna enfermedad crónica, por grupo de edad y sexo**

| Sexo | Enfermedad Crónica | Grupos quinquenales | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 a 44 años | 45 a 49 años | 50 a 54 años | 55 a 59 años | 60 a 64 años | 65 a 69 años | 70 a 74 años | 75 a 79 años | 80 y más | |
| HOMBRE | asma? | - | - | - | - | - | - | - | 7,255 | - | - | 4,353 | - | - | 11,608 |
| | presión alta (hipertensión)? | 3,484 | 3,484 | - | 7,877 | 8,706 | 9,673 | 35,507 | 44,584 | 5,226 | 12,481 | 13,354 | - | 5,804 | 150,180 |
| | diabetes (azucar alta en la sangre)? | - | - | - | 5,804 | - | 3,756 | 10,452 | - | 18,772 | - | 2,902 | 1,451 | - | 43,137 |
| | artritis? | - | - | - | - | - | - | - | 5,804 | - | - | - | 1,786 | - | 7,590 |
| | artrosis? | - | - | - | - | - | 7,549 | - | - | - | - | - | - | - | 7,549 |
| | enfermedad del corazón | - | - | 2,902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,451 | 4,353 |
| | fiebre reumática? | - | - | - | - | - | 10,452 | - | - | - | - | - | - | - | 10,452 |
| | enfermedad renal? | - | 2,902 | 2,902 | - | - | 7,255 | - | - | - | - | - | - | - | 13,059 |
| | gastritis o úlcera gástrica | - | 13,059 | 2,902 | 2,902 | 2,902 | 7,160 | 5,804 | - | - | - | - | 2,902 | - | 37,631 |
| | colitis? | - | - | - | 2,902 | - | - | - | - | - | 2,902 | - | 2,902 | - | 8,706 |
| | tumores, cáncer? | - | - | 3,125 | - | 2,902 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,027 |
| | No | 357,652 | 320,298 | 316,598 | 292,598 | 208,151 | 255,037 | 194,046 | 167,476 | 88,106 | 99,500 | 48,973 | 49,225 | 53,215 | 2,450,875 |
| | Otra enfermedad con duración mayor a 3 meses? | - | 13,059 | 9,129 | - | - | - | 4,353 | 3,484 | - | - | 5,804 | 1,451 | 3,484 | 40,764 |
| | No responde | - | 4,353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,353 |
| | | 361,136 | 357,155 | 337,558 | 312,083 | 222,661 | 300,882 | 250,162 | 228,603 | 112,104 | 114,883 | 75,386 | 59,717 | 63,954 | 2,796,284 |
| MUJER | asma? | - | - | 3,484 | - | 11,612 | - | - | - | - | - | - | - | 4,353 | 19,449 |
| | presión alta (hipertensión)? | 2,902 | - | 1,742 | 9,343 | 12,665 | 10,158 | 19,392 | 10,739 | 17,996 | 15,576 | 19,533 | 3,484 | 10,840 | 134,370 |
| | diabetes (azucar alta en la sangre)? | - | - | 8,343 | 6,997 | 5,806 | - | - | 3,484 | - | - | 13,061 | 2,129 | - | 39,820 |
| | artritis? | - | - | - | 2,902 | - | - | - | 6,968 | - | 9,433 | 4,353 | - | 1,451 | 25,107 |
| | enfermedad del corazón | 5,079 | - | - | - | - | - | 5,804 | 6,271 | - | - | 5,804 | - | - | 22,958 |
| | enfermedad renal? | - | 3,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,957 |
| | depresión o ansiedad? | - | 4,935 | - | 5,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,160 |
| | gastritis o úlcera gástrica | 15,961 | 6,095 | 6,530 | 10,157 | 7,837 | 16,883 | 2,902 | - | - | 5,032 | 2,902 | - | - | 74,299 |
| | colitis? | 1,742 | 18,428 | - | 3,513 | 3,265 | - | - | 3,484 | - | - | - | - | - | 30,432 |
| | tumores, cáncer? | - | - | 3,484 | 1,451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,935 |
| | No | 376,733 | 336,234 | 404,270 | 262,402 | 243,853 | 218,369 | 242,676 | 145,017 | 98,213 | 138,403 | 103,825 | 96,264 | 85,827 | 2,752,086 |
| | Otra enfermedad con duración mayor a 3 meses? | 9,870 | - | 8,343 | 3,628 | 6,633 | 5,633 | - | 2,902 | - | 2,902 | - | - | - | 39,911 |
| | No sabe | - | - | - | - | 2,902 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,902 |
| | Total | 412,287 | 369,649 | 436,196 | 305,618 | 294,573 | 251,043 | 270,774 | 178,865 | 116,209 | 171,346 | 149,478 | 101,877 | 102,471 | 3,160,386 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 o más que durante el último año, previo a la entrevista, algún médico le diagnosticó alguna enfermedad crónica, por grupo de edad y sexo**

| Sexo | Enfermedad Crónica | Grupos quinquenales | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 a 44 años | 45 a 49 años | 50 a 54 años | 55 a 59 años | 60 a 64 años | 65 a 69 años | 70 a 74 años | 75 a 79 años | 80 y más | |
| HOMBRE | asma? | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | 5.8 | - | - | 0.4 |
| | presión alta (hipertensión)? | 1.0 | 1.0 | - | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 14.2 | 19.5 | 4.7 | 10.9 | 17.7 | - | 9.1 | 5.4 |
| | diabetes (azucar alta en la sangre)? | - | - | - | 1.9 | - | 1.2 | 4.2 | - | 16.7 | - | 3.8 | 2.4 | - | 1.5 |
| | artritis? | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 3.0 | - | 0.3 |
| | artrosis? | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| | enfermedad del corazón | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.2 |
| | fiebre reumática? | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| | enfermedad renal? | - | 0.8 | 0.9 | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| | gastritis o úlcera gástrica | - | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | - | - | - | - | 4.9 | - | 1.3 |
| | colitis? | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 4.9 | - | 0.3 |
| | tumores, cáncer? | - | - | 0.9 | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| | No | 99.0 | 89.7 | 93.8 | 93.8 | 93.5 | 84.8 | 77.6 | 73.3 | 78.6 | 86.6 | 65.0 | 82.4 | 83.2 | 87.6 |
| | Otra enfermedad con duración mayor a 3 meses? | - | 3.7 | 2.7 | - | - | - | 1.7 | 1.5 | - | - | 7.7 | 2.4 | 5.4 | 1.5 |
| | No responde | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| MUJER | asma? | - | - | 0.8 | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 0.6 |
| | presión alta (hipertensión)? | 0.7 | - | 0.4 | 3.1 | 4.3 | 4.0 | 7.2 | 6.0 | 15.5 | 9.1 | 13.1 | 3.4 | 10.6 | 4.3 |
| | diabetes (azucar alta en la sangre)? | - | - | 1.9 | 2.3 | 2.0 | - | - | 1.9 | - | - | 8.7 | 2.1 | - | 1.3 |
| | artritis? | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 3.9 | - | 5.5 | 2.9 | - | 1.4 | 0.8 |
| | enfermedad del corazón | 1.2 | - | - | - | - | - | 2.1 | 3.5 | - | - | 3.9 | - | - | 0.7 |
| | enfermedad renal? | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| | depresión o ansiedad? | - | 1.3 | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| | gastritis o úlcera gástrica | 3.9 | 1.6 | 1.5 | 3.3 | 2.7 | 6.7 | 1.1 | - | - | 2.9 | 1.9 | - | - | 2.4 |
| | colitis? | 0.4 | 5.0 | - | 1.1 | 1.1 | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| | tumores, cáncer? | - | - | 0.8 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| | No | 91.4 | 91.0 | 92.7 | 85.9 | 82.8 | 87.0 | 89.6 | 81.1 | 84.5 | 80.8 | 69.5 | 94.5 | 83.8 | 87.1 |
| | Otra enfermedad con duración mayor a 3 meses? | 2.4 | - | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | - | 1.6 | - | 1.7 | - | - | - | 1.3 |
| | No sabe | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 o más que durante el último año, previo a la entrevista, algún médico le diagnosticó alguna enfermedad crónica**

| Enfermedades Crónicas | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| asma? | 231,551 | .4 |
| tubercolosis? | 17,705 | .0 |
| presión alta (hipertensión)? | 2,195,834 | 3.7 |
| diabetes (azucar alta en la sangre)? | 802,166 | 1.3 |
| artritis? | 240,497 | .4 |
| artrosis? | 17,537 | .0 |
| enfermedad del corazón | 188,337 | .3 |
| fiebre reumática? | 34,883 | .1 |
| enfermedad renal? | 199,182 | .3 |
| derrame cerebral (sangrado cerebral)? | 15,393 | .0 |
| depresión o ansiedad? | 250,245 | .4 |
| gastritis o úlcera gástrica | 1,138,451 | 1.9 |
| colitis? | 451,512 | .8 |
| tumores, cáncer? | 86,087 | .1 |
| SIDA? | 2,962 | .0 |
| No | 53,321,701 | 89.0 |
| Otra enfermedad con duración mayor a 3 meses? | 657,949 | 1.1 |
| No responde | 18,742 | .0 |
| No sabe | 51,772 | .1 |
| Total | 59,922,506 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 o más que durante el último año, previo a la entrevista, algún médico le diagnosticó alguna enfermedad crónica, por grupo de edad y sexo**

| Sexo | Enfermedad Crónica | Grupos quinquenales | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 a 44 años | 45 a 49 años | 50 a 54 años | 55 a 59 años | 60 a 64 años | 65 a 69 años | 70 a 74 años | 75 a 79 años | 80 y más | |
| HOMBRE | asma? | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
| | tubercolosis? | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.0 |
| | presión alta (hipertensión)? | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 2.6 | 5.7 | 8.9 | 4.9 | 6.0 | 6.5 | 6.4 | 4.4 | 3.0 |
| | diabetes (azucar alta en la sangre)? | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 3.3 | 1.6 | 3.9 | 2.0 | 1.4 | 2.7 | 0.9 | 1.4 |
| | artritis? | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.2 |
| | artrosis? | - | - | - | 0.2 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 |
| | enfermedad del corazón | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 |
| | fiebre reumática? | - | - | 0.0 | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.1 |
| | enfermedad renal? | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.3 |
| | derrame cerebral (sangrado cerebral)? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| | depresión o ansiedad? | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 |
| | gastritis o úlcera gástrica | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.6 |
| | colitis? | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | - | 0.5 | - | 0.3 |
| | tumores, cáncer? | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 |
| | SIDA? | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| | No | 97.4 | 95.0 | 94.7 | 92.2 | 90.7 | 88.0 | 86.0 | 85.0 | 86.6 | 87.0 | 86.0 | 83.0 | 86.5 | 91.1 |
| | Otra enfermedad con duración mayor a 3 meses? | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 0.9 |
| | No responde | 0.0 | 0.2 | - | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| | No sabe | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| MUJER | asma? | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.5 |
| | tubercolosis? | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 |
| | presión alta (hipertensión)? | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 6.9 | 8.5 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 9.6 | 8.4 | 4.2 |
| | diabetes (azucar alta en la sangre)? | - | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 1.7 | 0.6 | 1.3 |
| | artritis? | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | 0.5 |
| | artrosis? | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| | enfermedad del corazón | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
| | fiebre reumática? | - | - | 0.0 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.3 | 0.0 |
| | enfermedad renal? | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| | derrame cerebral (sangrado cerebral)? | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | 0.5 | 0.0 |
| | depresión o ansiedad? | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
| | gastritis o úlcera gástrica | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 2.2 |
| | colitis? | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | - | 0.2 | 1.1 |
| | tumores, cáncer? | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | - | 0.1 | 0.2 |
| | SIDA? | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| | No | 94.6 | 91.5 | 90.9 | 87.0 | 85.7 | 85.1 | 82.9 | 81.9 | 83.0 | 80.9 | 78.2 | 81.6 | 83.8 | 87.3 |
| | Otra enfermedad con duración mayor a 3 meses? | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 1.2 |
| | No responde | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| | No sabe | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
| | Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propiacon base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que algún médico o dietista o nutriólogo le diagnosticó que sufre o ha sufrido de obesidad**

| Obesidad | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 762,275 | 12.8 |
| No | 5,194,395 | 87.2 |
| Total | 5,956,670 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que algún médico o dietista o nutriólogo le diagnosticó que sufre o ha sufrido de obesidad, por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 18,328 | 342,808 | 361,136 | 37,875 | 374,412 | 412,287 | 6.1 | 13.7 | 12.9 | 8.2 | 13.9 | 13.0 |
| 25 a 29 años | 20,318 | 336,837 | 357,155 | 36,081 | 333,568 | 369,649 | 6.7 | 13.5 | 12.8 | 7.9 | 12.4 | 11.7 |
| 30 a 34 años | 33,841 | 303,717 | 337,558 | 39,810 | 396,386 | 436,196 | 11.2 | 12.2 | 12.1 | 8.7 | 14.7 | 13.8 |
| 35 a 39 años | 30,188 | 281,895 | 312,083 | 49,135 | 256,483 | 305,618 | 10.0 | 11.3 | 11.2 | 10.7 | 9.5 | 9.7 |
| 40 a 44 años | 26,539 | 196,122 | 222,661 | 65,413 | 229,160 | 294,573 | 8.8 | 7.9 | 8.0 | 14.2 | 8.5 | 9.3 |
| 45 a 49 años | 28,738 | 272,144 | 300,882 | 25,110 | 225,933 | 251,043 | 9.5 | 10.9 | 10.8 | 5.5 | 8.4 | 7.9 |
| 50 a 54 años | 59,022 | 191,140 | 250,162 | 40,599 | 230,175 | 270,774 | 19.5 | 7.7 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.6 |
| 55 a 59 años | 37,790 | 190,813 | 228,603 | 48,459 | 130,406 | 178,865 | 12.5 | 7.7 | 8.2 | 10.5 | 4.8 | 5.7 |
| 60 a 64 años | 24,234 | 87,870 | 112,104 | 17,332 | 98,877 | 116,209 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
| 65 a 69 años | 7,256 | 107,627 | 114,883 | 46,840 | 124,506 | 171,346 | 2.4 | 4.3 | 4.1 | 10.2 | 4.6 | 5.4 |
| 70 a 74 años | 8,706 | 66,680 | 75,386 | 22,638 | 126,840 | 149,478 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |
| 75 a 79 años | 1,451 | 58,266 | 59,717 | 13,517 | 88,360 | 101,877 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 3.2 |
| 80 y más | 6,386 | 57,568 | 63,954 | 16,669 | 85,802 | 102,471 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 |
| Total | 302,797 | 2,493,487 | 2,796,284 | 459,478 | 2,700,908 | 3,160,386 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que algún médico o dietista o nutriólogo le diagnosticó que sufre o ha sufrido de obesidad**

| Obesidad | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 5,262,478 | 8.8 |
| No | 54,574,229 | 91.1 |
| No sabe | 85,799 | .1 |
| Total | 59,922,506 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que algún médico o dietista o nutriólogo le diagnosticó que sufre o ha sufrido de obesidad, por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Absolutos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 149,659 | 3,657,691 | 9,715 | 3,817,065 | 240,107 | 4,129,724 | 124 | 4,369,955 | 8.1 | 14.5 | 17.7 | 14.1 | 7.1 | 14.1 | 0.4 | 13.3 |
| 25 a 29 años | 175,249 | 3,151,415 | 1,416 | 3,328,080 | 367,613 | 3,649,980 | 1,424 | 4,019,017 | 9.4 | 12.5 | 2.6 | 12.3 | 10.8 | 12.4 | 4.6 | 12.3 |
| 30 a 34 años | 239,550 | 3,033,495 | 1,530 | 3,274,575 | 385,545 | 3,692,567 | 4,490 | 4,082,602 | 12.9 | 12.0 | 2.8 | 12.1 | 11.3 | 12.6 | 14.6 | 12.4 |
| 35 a 39 años | 212,668 | 2,827,748 | 2,412 | 3,042,828 | 569,286 | 3,528,645 | 3,467 | 4,101,398 | 11.4 | 11.2 | 4.4 | 11.2 | 16.7 | 12.0 | 11.2 | 12.5 |
| 40 a 44 años | 251,403 | 2,551,567 | 10,308 | 2,813,278 | 432,530 | 3,179,145 | 2,956 | 3,614,631 | 13.5 | 10.1 | 18.8 | 10.4 | 12.7 | 10.8 | 9.6 | 11.0 |
| 45 a 49 años | 202,364 | 2,283,603 | 9,163 | 2,495,130 | 285,866 | 2,541,192 | 7,454 | 2,834,512 | 10.9 | 9.1 | 16.7 | 9.2 | 8.4 | 8.7 | 24.2 | 8.6 |
| 50 a 54 años | 215,482 | 1,877,294 | 2,379 | 2,095,155 | 326,390 | 2,087,402 | 81 | 2,413,873 | 11.6 | 7.4 | 4.3 | 7.7 | 9.6 | 7.1 | 0.3 | 7.4 |
| 55 a 59 años | 175,551 | 1,554,545 | 881 | 1,730,977 | 266,191 | 1,541,899 | - | 1,808,090 | 9.4 | 6.2 | 1.6 | 6.4 | 7.8 | 5.3 | - | 5.5 |
| 60 a 64 años | 105,340 | 1,242,318 | 3,561 | 1,351,219 | 168,421 | 1,454,283 | 1,442 | 1,624,146 | 5.7 | 4.9 | 6.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.0 |
| 65 a 69 años | 63,372 | 1,035,992 | 561 | 1,099,925 | 175,500 | 1,078,284 | 3,498 | 1,257,282 | 3.4 | 4.1 | 1.0 | 4.1 | 5.2 | 3.7 | 11.3 | 3.8 |
| 70 a 74 años | 36,640 | 864,849 | 3,360 | 904,849 | 80,779 | 899,789 | 780 | 981,348 | 2.0 | 3.4 | 6.1 | 3.3 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 3.0 |
| 75 a 79 años | 17,399 | 558,982 | 1,870 | 578,251 | 52,879 | 716,543 | 3,404 | 772,826 | 0.9 | 2.2 | 3.4 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 11.0 | 2.4 |
| 80 y más | 14,391 | 573,085 | 7,800 | 595,276 | 52,303 | 862,192 | 1,723 | 916,218 | 0.8 | 2.3 | 14.2 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | 5.6 | 2.8 |
| Total | 1,859,068 | 25,212,584 | 54,956 | 27,126,608 | 3,403,410 | 29,361,645 | 30,843 | 32,795,898 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido depresión**

| Depresión | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 769,619 | 12.9 |
| No | 5,187,051 | 87.1 |
| Total | 5,956,670 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido depresión por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 6,386 | 354,750 | 361,136 | 59,253 | 353,034 | 412,287 | 3.6 | 13.5 | 12.9 | 10.0 | 13.8 | 13.0 |
| 25 a 29 años | 12,481 | 344,674 | 357,155 | 60,659 | 308,990 | 369,649 | 7.1 | 13.2 | 12.8 | 10.2 | 12.0 | 11.7 |
| 30 a 34 años | 13,078 | 324,480 | 337,558 | 55,400 | 380,796 | 436,196 | 7.4 | 12.4 | 12.1 | 9.3 | 14.8 | 13.8 |
| 35 a 39 años | 10,739 | 301,344 | 312,083 | 54,770 | 250,848 | 305,618 | 6.1 | 11.5 | 11.2 | 9.2 | 9.8 | 9.7 |
| 40 a 44 años | 12,120 | 210,541 | 222,661 | 88,218 | 206,355 | 294,573 | 6.9 | 8.0 | 8.0 | 14.9 | 8.0 | 9.3 |
| 45 a 49 años | 37,510 | 263,372 | 300,882 | 59,904 | 191,139 | 251,043 | 21.3 | 10.1 | 10.8 | 10.1 | 7.4 | 7.9 |
| 50 a 54 años | 23,219 | 226,943 | 250,162 | 40,307 | 230,467 | 270,774 | 13.2 | 8.7 | 8.9 | 6.8 | 9.0 | 8.6 |
| 55 a 59 años | 9,480 | 219,123 | 228,603 | 59,970 | 118,895 | 178,865 | 5.4 | 8.4 | 8.2 | 10.1 | 4.6 | 5.7 |
| 60 a 64 años | 21,832 | 90,272 | 112,104 | 10,448 | 105,761 | 116,209 | 12.4 | 3.4 | 4.0 | 1.8 | 4.1 | 3.7 |
| 65 a 69 años | 16,225 | 98,658 | 114,883 | 36,386 | 134,960 | 171,346 | 9.2 | 3.8 | 4.1 | 6.1 | 5.3 | 5.4 |
| 70 a 74 años | 2,902 | 72,484 | 75,386 | 30,473 | 119,005 | 149,478 | 1.6 | 2.8 | 2.7 | 5.1 | 4.6 | 4.7 |
| 75 a 79 años | 4,609 | 55,108 | 59,717 | 17,708 | 84,169 | 101,877 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.3 | 3.2 |
| 80 y más | 5,804 | 58,150 | 63,954 | 19,738 | 82,733 | 102,471 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| Total | 176,385 | 2,619,899 | 2,796,284 | 593,234 | 2,567,152 | 3,160,386 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido depresión**

| Depresión | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 6,402,212 | 10.7 |
| No | 53,520,294 | 89.3 |
| Total | 59,922,506 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido depresión por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Absolutos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 160,891 | 3,656,174 | 3,817,065 | 402,998 | 3,966,957 | 4,369,955 | 11.6 | 14.2 | 14.1 | 8.0 | 14.3 | 13.3 |
| 25 a 29 años | 118,710 | 3,209,370 | 3,328,080 | 488,893 | 3,530,124 | 4,019,017 | 8.5 | 12.5 | 12.3 | 9.8 | 12.7 | 12.3 |
| 30 a 34 años | 164,944 | 3,109,631 | 3,274,575 | 533,288 | 3,549,314 | 4,082,602 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 10.6 | 12.8 | 12.4 |
| 35 a 39 años | 117,956 | 2,924,872 | 3,042,828 | 645,479 | 3,455,919 | 4,101,398 | 8.5 | 11.4 | 11.2 | 12.9 | 12.4 | 12.5 |
| 40 a 44 años | 143,468 | 2,669,810 | 2,813,278 | 636,233 | 2,978,398 | 3,614,631 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 12.7 | 10.7 | 11.0 |
| 45 a 49 años | 178,566 | 2,316,564 | 2,495,130 | 557,351 | 2,277,161 | 2,834,512 | 12.8 | 9.0 | 9.2 | 11.1 | 8.2 | 8.6 |
| 50 a 54 años | 122,303 | 1,972,852 | 2,095,155 | 479,895 | 1,933,978 | 2,413,873 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 9.6 | 7.0 | 7.4 |
| 55 a 59 años | 94,678 | 1,636,299 | 1,730,977 | 402,173 | 1,405,917 | 1,808,090 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 8.0 | 5.1 | 5.5 |
| 60 a 64 años | 70,746 | 1,280,473 | 1,351,219 | 280,678 | 1,343,468 | 1,624,146 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 4.8 | 5.0 |
| 65 a 69 años | 65,884 | 1,034,041 | 1,099,925 | 199,552 | 1,057,730 | 1,257,282 | 4.7 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
| 70 a 74 años | 69,244 | 835,605 | 904,849 | 153,465 | 827,883 | 981,348 | 5.0 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| 75 a 79 años | 31,527 | 546,724 | 578,251 | 91,577 | 681,249 | 772,826 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.4 |
| 80 y más | 53,740 | 541,536 | 595,276 | 137,973 | 778,245 | 916,218 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Total | 1,392,657 | 25,733,951 | 27,126,608 | 5,009,555 | 27,786,343 | 32,795,898 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de diabetes mellitus**

| Diabetes mellitus | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 528,196 | 8.9 |
| No | 5,421,219 | 91.0 |
| Si, durante el embarazo (solo mujeres, diabetes gestacional) | 7,255 | .1 |
| Total | 5,956,670 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de diabetes mellitus por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | Proporciones | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | MUJER | | | |
| | Si | No | Total | Si | No | Si, durante el embarazo (solo mujeres, diabetes gestacional) | Total | Si | No | Total | Si | No | Si, durante el embarazo (solo mujeres, diabetes gestacional) | Total |
| 20 a 24 años | - | 361,136 | 361,136 | - | 412,287 | - | 412,287 | - | 14.1 | 12.9 | - | 14.4 | - | 13.0 |
| 25 a 29 años | 7,837 | 349,318 | 357,155 | 1,451 | 365,296 | 2,902 | 369,649 | 3.3 | 13.7 | 12.8 | 0.5 | 12.7 | 40.0 | 11.7 |
| 30 a 34 años | - | 337,558 | 337,558 | 8,343 | 427,853 | - | 436,196 | - | 13.2 | 12.1 | 2.9 | 14.9 | - | 13.8 |
| 35 a 39 años | 5,804 | 306,279 | 312,083 | 6,997 | 298,621 | - | 305,618 | 2.4 | 12.0 | 11.2 | 2.4 | 10.4 | - | 9.7 |
| 40 a 44 años | 15,291 | 207,370 | 222,661 | 22,596 | 271,977 | - | 294,573 | 6.4 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 9.5 | - | 9.3 |
| 45 a 49 años | 31,524 | 269,358 | 300,882 | 15,326 | 231,364 | 4,353 | 251,043 | 13.1 | 10.5 | 10.8 | 5.3 | 8.1 | 60.0 | 7.9 |
| 50 a 54 años | 28,821 | 221,341 | 250,162 | 27,961 | 242,813 | - | 270,774 | 12.0 | 8.7 | 8.9 | 9.7 | 8.5 | - | 8.6 |
| 55 a 59 años | 40,345 | 188,258 | 228,603 | 30,755 | 148,110 | - | 178,865 | 16.8 | 7.4 | 8.2 | 10.7 | 5.2 | - | 5.7 |
| 60 a 64 años | 44,104 | 68,000 | 112,104 | 11,030 | 105,179 | - | 116,209 | 18.3 | 2.7 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | - | 3.7 |
| 65 a 69 años | 15,096 | 99,787 | 114,883 | 58,282 | 113,064 | - | 171,346 | 6.3 | 3.9 | 4.1 | 20.3 | 3.9 | - | 5.4 |
| 70 a 74 años | 26,413 | 48,973 | 75,386 | 36,445 | 113,033 | - | 149,478 | 11.0 | 1.9 | 2.7 | 12.7 | 3.9 | - | 4.7 |
| 75 a 79 años | 10,157 | 49,560 | 59,717 | 22,052 | 79,825 | - | 101,877 | 4.2 | 1.9 | 2.1 | 7.7 | 2.8 | - | 3.2 |
| 80 y más | 15,190 | 48,764 | 63,954 | 46,376 | 56,095 | - | 102,471 | 6.3 | 1.9 | 2.3 | 16.1 | 2.0 | - | 3.2 |
| Total | 240,582 | 2,555,702 | 2,796,284 | 287,614 | 2,865,517 | 7,255 | 3,160,386 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de diabetes mellitus**

| Diagnóstico | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 335,011 | 6.8 |
| No | 4,560,604 | 93.2 |
| Total | 4,895,615 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de diabetes mellitus por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Porcentajes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Si | No | Total | Si | No | Total | Si | No | Total | Si | No | Total |
| 20 a 24 años | 6,999 | 369,852 | 376,851 | 1,463 | 480,015 | 481,478 | 4.1 | 18.6 | 17.5 | 0.9 | 18.6 | 17.6 |
| 25 a 29 años | 12,749 | 336,565 | 349,314 | - | 412,474 | 412,474 | 7.5 | 17.0 | 16.2 | 0.0 | 16.0 | 15.1 |
| 30 a 34 años | 19,613 | 279,373 | 298,986 | 17,062 | 350,634 | 367,696 | 11.5 | 14.1 | 13.9 | 10.4 | 13.6 | 13.4 |
| 35 a 39 años | 16,611 | 225,811 | 242,422 | 9,329 | 327,219 | 336,548 | 9.7 | 11.4 | 11.2 | 5.7 | 12.7 | 12.3 |
| 40 a 44 años | 14,818 | 205,110 | 219,928 | 8,967 | 248,702 | 257,669 | 8.7 | 10.3 | 10.2 | 5.4 | 9.7 | 9.4 |
| 45 a 49 años | 20,544 | 141,417 | 161,961 | 25,602 | 190,025 | 215,627 | 12.1 | 7.1 | 7.5 | 15.6 | 7.4 | 7.9 |
| 50 a 54 años | 17,773 | 129,401 | 147,174 | 11,298 | 162,460 | 173,758 | 10.4 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 6.3 |
| 55 a 59 años | 7,010 | 91,676 | 98,686 | 19,866 | 106,298 | 126,164 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 12.1 | 4.1 | 4.6 |
| 60 a 64 años | 18,178 | 68,203 | 86,381 | 26,226 | 80,816 | 107,042 | 10.7 | 3.4 | 4.0 | 15.9 | 3.1 | 3.9 |
| 65 a 69 años | 10,199 | 51,718 | 61,917 | 17,725 | 74,865 | 92,590 | 6.0 | 2.6 | 2.9 | 10.8 | 2.9 | 3.4 |
| 70 a 74 años | 16,267 | 34,838 | 51,105 | 17,164 | 52,509 | 69,673 | 9.5 | 1.8 | 2.4 | 10.4 | 2.0 | 2.5 |
| 75 a 79 años | 2,765 | 26,617 | 29,382 | 5,916 | 36,507 | 42,423 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 3.6 | 1.4 | 1.5 |
| 80 y más | 6,940 | 24,717 | 31,657 | 3,927 | 52,782 | 56,709 | 4.1 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 2.0 | 2.1 |
| | 170,466 | 1,985,298 | 2,155,764 | 164,545 | 2,575,306 | 2,739,851 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de diabetes mellitus**

| Diabetes mellitus | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 4,211,853 | 7.0 |
| No | 55,590,647 | 92.8 |
| Si, durante el embarazo (solo mujeres, diabetes gestacional) | 120,006 | .2 |
| Total | 59,922,506 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de diabetes mellitus por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | Proporciones | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | MUJER | | | |
| | Si | No | Total | Si | No | Si, durante el embarazo (solo mujeres, diabetes gestacional) | Total | Si | No | Total | Si | No | Si, durante el embarazo (solo mujeres, diabetes gestacional) | Total |
| 20 a 24 años | 13,263 | 3,803,802 | 3,817,065 | 12,986 | 4,346,758 | 10,211 | 4,369,955 | 0.7 | 15.0 | 14.1 | 0.5 | 14.4 | 8.5 | 13.3 |
| 25 a 29 años | 60,431 | 3,267,649 | 3,328,080 | 28,290 | 3,967,653 | 23,074 | 4,019,017 | 3.4 | 12.9 | 12.3 | 1.2 | 13.1 | 19.2 | 12.3 |
| 30 a 34 años | 82,342 | 3,192,233 | 3,274,575 | 78,828 | 3,990,249 | 13,525 | 4,082,602 | 4.6 | 12.6 | 12.1 | 3.3 | 13.2 | 11.3 | 12.4 |
| 35 a 39 años | 96,908 | 2,945,920 | 3,042,828 | 172,306 | 3,900,218 | 28,874 | 4,101,398 | 5.4 | 11.6 | 11.2 | 7.1 | 12.9 | 24.1 | 12.5 |
| 40 a 44 años | 142,479 | 2,670,799 | 2,813,278 | 231,500 | 3,369,373 | 13,758 | 3,614,631 | 8.0 | 10.5 | 10.4 | 9.6 | 11.1 | 11.5 | 11.0 |
| 45 a 49 años | 222,812 | 2,272,318 | 2,495,130 | 219,655 | 2,610,060 | 4,797 | 2,834,512 | 12.5 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 4.0 | 8.6 |
| 50 a 54 años | 233,902 | 1,861,253 | 2,095,155 | 316,351 | 2,090,063 | 7,459 | 2,413,873 | 13.1 | 7.3 | 7.7 | 13.1 | 6.9 | 6.2 | 7.4 |
| 55 a 59 años | 252,021 | 1,478,956 | 1,730,977 | 286,281 | 1,515,511 | 6,298 | 1,808,090 | 14.1 | 5.8 | 6.4 | 11.8 | 5.0 | 5.2 | 5.5 |
| 60 a 64 años | 220,341 | 1,130,878 | 1,351,219 | 302,189 | 1,317,484 | 4,473 | 1,624,146 | 12.3 | 4.5 | 5.0 | 12.5 | 4.4 | 3.7 | 5.0 |
| 65 a 69 años | 191,477 | 908,448 | 1,099,925 | 312,132 | 944,656 | 494 | 1,257,282 | 10.7 | 3.6 | 4.1 | 12.9 | 3.1 | 0.4 | 3.8 |
| 70 a 74 años | 141,405 | 763,444 | 904,849 | 192,534 | 787,506 | 1,308 | 981,348 | 7.9 | 3.0 | 3.3 | 7.9 | 2.6 | 1.1 | 3.0 |
| 75 a 79 años | 70,063 | 508,188 | 578,251 | 113,470 | 658,210 | 1,146 | 772,826 | 3.9 | 2.0 | 2.1 | 4.7 | 2.2 | 1.0 | 2.4 |
| 80 y más | 61,639 | 533,637 | 595,276 | 156,248 | 755,381 | 4,589 | 916,218 | 3.4 | 2.1 | 2.2 | 6.4 | 2.5 | 3.8 | 2.8 |
| Total | 1,789,083 | 25,337,525 | 27,126,608 | 2,422,770 | 30,253,122 | 120,006 | 32,795,898 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de diabetes mellitus**

| Diagnóstico | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 2,828,615 | 5.7 |
| No | 46,878,304 | 94.3 |
| No sabe | 9,280 | .0 |
| Total | 49,716,199 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de diabetes mellitus por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 10,975 | 4,377,911 | 4,308 | 4,393,194 | 19,352 | 5,053,074 | - | 5,072,426 | 0.88 | 19.77 | 84.84 | 18.78 | 1.22 | 20.43 | - | 19.27 |
| 25 a 29 años | 59,436 | 3,597,321 | - | 3,656,757 | 36,776 | 4,111,188 | 1,455 | 4,149,419 | 4.78 | 16.25 | - | 15.63 | 2.32 | 16.62 | 34.63 | 15.76 |
| 30 a 34 años | 57,207 | 3,104,283 | - | 3,161,490 | 52,649 | 3,531,654 | - | 3,584,303 | 4.60 | 14.02 | - | 13.52 | 3.32 | 14.28 | - | 13.61 |
| 35 a 39 años | 88,664 | 2,717,514 | - | 2,806,178 | 107,817 | 3,071,264 | 1,865 | 3,180,946 | 7.13 | 12.27 | - | 12.00 | 6.80 | 12.42 | 44.38 | 12.08 |
| 40 a 44 años | 108,580 | 2,069,918 | - | 2,178,498 | 135,096 | 2,239,367 | - | 2,374,463 | 8.73 | 9.35 | - | 9.31 | 8.53 | 9.05 | - | 9.02 |
| 45 a 49 años | 153,482 | 1,625,359 | - | 1,778,841 | 181,865 | 1,759,622 | 535 | 1,942,022 | 12.34 | 7.34 | - | 7.61 | 11.48 | 7.11 | 12.73 | 7.38 |
| 50 a 54 años | 150,602 | 1,296,508 | - | 1,447,110 | 216,448 | 1,333,335 | - | 1,549,783 | 12.11 | 5.86 | - | 6.19 | 13.66 | 5.39 | - | 5.89 |
| 55 a 59 años | 171,615 | 938,005 | - | 1,109,620 | 216,643 | 980,599 | - | 1,197,242 | 13.80 | 4.24 | - | 4.74 | 13.67 | 3.96 | - | 4.55 |
| 60 a 64 años | 156,792 | 793,401 | - | 950,193 | 213,739 | 837,598 | - | 1,051,337 | 12.60 | 3.58 | - | 4.06 | 13.49 | 3.39 | - | 3.99 |
| 65 a 69 años | 117,252 | 575,242 | - | 692,494 | 154,228 | 633,893 | - | 788,121 | 9.43 | 2.60 | - | 2.96 | 9.73 | 2.56 | - | 2.99 |
| 70 a 74 años | 91,719 | 442,590 | 770 | 535,079 | 129,130 | 451,634 | - | 580,764 | 7.37 | 2.00 | 15.16 | 2.29 | 8.15 | 1.83 | - | 2.21 |
| 75 a 79 años | 43,195 | 283,143 | - | 326,338 | 70,070 | 289,110 | - | 359,180 | 3.47 | 1.28 | - | 1.40 | 4.42 | 1.17 | - | 1.36 |
| 80 y más | 34,500 | 319,579 | - | 354,079 | 50,783 | 445,192 | 347 | 496,322 | 2.77 | 1.44 | - | 1.51 | 3.20 | 1.80 | 8.26 | 1.89 |
| Total | 1,244,019 | 22,140,774 | 5,078 | 23,389,871 | 1,584,596 | 24,737,530 | 4,202 | 26,326,328 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de hipertensión arterial**

| Hipertensión arterial | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 1,112,875 | 18.7 |
| No | 4,843,795 | 81.3 |
| Total | 5,956,670 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de hipertensión arterial por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 3,513 | 357,623 | 361,136 | 34,144 | 378,143 | 412,287 | 0.8 | 15.1 | 12.9 | 5.0 | 15.2 | 13.0 |
| 25 a 29 años | 15,538 | 341,617 | 357,155 | 29,587 | 340,062 | 369,649 | 3.6 | 14.5 | 12.8 | 4.3 | 13.7 | 11.7 |
| 30 a 34 años | 21,897 | 315,661 | 337,558 | 64,359 | 371,837 | 436,196 | 5.1 | 13.4 | 12.1 | 9.5 | 15.0 | 13.8 |
| 35 a 39 años | 22,024 | 290,059 | 312,083 | 25,018 | 280,600 | 305,618 | 5.1 | 12.3 | 11.2 | 3.7 | 11.3 | 9.7 |
| 40 a 44 años | 35,053 | 187,608 | 222,661 | 49,144 | 245,429 | 294,573 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.2 | 9.9 | 9.3 |
| 45 a 49 años | 64,386 | 236,496 | 300,882 | 60,899 | 190,144 | 251,043 | 14.9 | 10.0 | 10.8 | 9.0 | 7.7 | 7.9 |
| 50 a 54 años | 45,344 | 204,818 | 250,162 | 75,217 | 195,557 | 270,774 | 10.5 | 8.7 | 8.9 | 11.1 | 7.9 | 8.6 |
| 55 a 59 años | 47,588 | 181,015 | 228,603 | 53,509 | 125,356 | 178,865 | 11.0 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | 5.1 | 5.7 |
| 60 a 64 años | 41,777 | 70,327 | 112,104 | 33,090 | 83,119 | 116,209 | 9.7 | 3.0 | 4.0 | 4.9 | 3.4 | 3.7 |
| 65 a 69 años | 48,236 | 66,647 | 114,883 | 79,963 | 91,383 | 171,346 | 11.2 | 2.8 | 4.1 | 11.8 | 3.7 | 5.4 |
| 70 a 74 años | 42,722 | 32,664 | 75,386 | 76,351 | 73,127 | 149,478 | 9.9 | 1.4 | 2.7 | 11.2 | 2.9 | 4.7 |
| 75 a 79 años | 13,897 | 45,820 | 59,717 | 51,939 | 49,938 | 101,877 | 3.2 | 1.9 | 2.1 | 7.6 | 2.0 | 3.2 |
| 80 y más | 30,480 | 33,474 | 63,954 | 47,200 | 55,271 | 102,471 | 7.0 | 1.4 | 2.3 | 6.9 | 2.2 | 3.2 |
| Total | 432,455 | 2,363,829 | 2,796,284 | 680,420 | 2,479,966 | 3,160,386 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de hipertensión**

| Diagnóstico | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 624,993 | 14.4 |
| No | 3,725,439 | 85.6 |
| Total | 4,350,432 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de hipertensión arterial por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 20,768 | 264,491 | 285,259 | 16,213 | 385,330 | 401,543 | 9.51 | 16.28 | 15.48 | 3.99 | 18.34 | 16.01 |
| 25 a 29 años | 6,873 | 241,240 | 248,113 | 38,750 | 355,464 | 394,214 | 3.15 | 14.85 | 13.46 | 9.53 | 16.92 | 15.72 |
| 30 a 34 años | 21,627 | 249,566 | 271,193 | 26,293 | 310,802 | 337,095 | 9.91 | 15.36 | 14.71 | 6.47 | 14.80 | 13.44 |
| 35 a 39 años | 33,727 | 171,927 | 205,654 | 35,519 | 271,075 | 306,594 | 15.45 | 10.58 | 11.16 | 8.73 | 12.90 | 12.23 |
| 40 a 44 años | 11,694 | 176,668 | 188,362 | 19,073 | 214,013 | 233,086 | 5.36 | 10.87 | 10.22 | 4.69 | 10.19 | 9.30 |
| 45 a 49 años | 21,414 | 140,547 | 161,961 | 25,501 | 173,408 | 198,909 | 9.81 | 8.65 | 8.79 | 6.27 | 8.25 | 7.93 |
| 50 a 54 años | 9,459 | 131,572 | 141,031 | 47,959 | 120,157 | 168,116 | 4.33 | 8.10 | 7.65 | 11.79 | 5.72 | 6.70 |
| 55 a 59 años | 23,258 | 75,428 | 98,686 | 45,300 | 69,141 | 114,441 | 10.65 | 4.64 | 5.35 | 11.14 | 3.29 | 4.56 |
| 60 a 64 años | 12,846 | 65,931 | 78,777 | 28,861 | 74,418 | 103,279 | 5.88 | 4.06 | 4.27 | 7.10 | 3.54 | 4.12 |
| 65 a 69 años | 22,114 | 38,634 | 60,748 | 37,366 | 49,845 | 87,211 | 10.13 | 2.38 | 3.30 | 9.19 | 2.37 | 3.48 |
| 70 a 74 años | 14,147 | 33,178 | 47,325 | 36,968 | 32,019 | 68,987 | 6.48 | 2.04 | 2.57 | 9.09 | 1.52 | 2.75 |
| 75 a 79 años | 9,192 | 17,425 | 26,617 | 19,904 | 20,507 | 40,411 | 4.21 | 1.07 | 1.44 | 4.89 | 0.98 | 1.61 |
| 80 y más | 11,202 | 18,126 | 29,328 | 28,965 | 24,527 | 53,492 | 5.13 | 1.12 | 1.59 | 7.12 | 1.17 | 2.13 |
| Total | 218,321 | 1,624,733 | 1,843,054 | 406,672 | 2,100,706 | 2,507,378 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de hipertensión arterial**

| Hipertensión arterial | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 9,222,585 | 15.4 |
| No | 50,699,921 | 84.6 |
| Total | 59,922,506 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de hipertensión arterial por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 96,088 | 3,720,977 | 3,817,065 | 292,972 | 4,076,983 | 4,369,955 | 3.1 | 15.5 | 14.1 | 4.8 | 15.3 | 13.3 |
| 25 a 29 años | 131,495 | 3,196,585 | 3,328,080 | 365,878 | 3,653,139 | 4,019,017 | 4.3 | 13.3 | 12.3 | 6.0 | 13.7 | 12.3 |
| 30 a 34 años | 186,769 | 3,087,806 | 3,274,575 | 429,262 | 3,653,340 | 4,082,602 | 6.0 | 12.8 | 12.1 | 7.0 | 13.7 | 12.4 |
| 35 a 39 años | 213,108 | 2,829,720 | 3,042,828 | 481,599 | 3,619,799 | 4,101,398 | 6.9 | 11.8 | 11.2 | 7.9 | 13.6 | 12.5 |
| 40 a 44 años | 305,485 | 2,507,793 | 2,813,278 | 543,273 | 3,071,358 | 3,614,631 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 8.9 | 11.5 | 11.0 |
| 45 a 49 años | 318,812 | 2,176,318 | 2,495,130 | 580,480 | 2,254,032 | 2,834,512 | 10.3 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 8.5 | 8.6 |
| 50 a 54 años | 338,661 | 1,756,494 | 2,095,155 | 617,204 | 1,796,669 | 2,413,873 | 11.0 | 7.3 | 7.7 | 10.1 | 6.7 | 7.4 |
| 55 a 59 años | 325,388 | 1,405,589 | 1,730,977 | 575,788 | 1,232,302 | 1,808,090 | 10.5 | 5.8 | 6.4 | 9.4 | 4.6 | 5.5 |
| 60 a 64 años | 266,622 | 1,084,597 | 1,351,219 | 627,239 | 996,907 | 1,624,146 | 8.6 | 4.5 | 5.0 | 10.2 | 3.7 | 5.0 |
| 65 a 69 años | 282,381 | 817,544 | 1,099,925 | 517,213 | 740,069 | 1,257,282 | 9.1 | 3.4 | 4.1 | 8.4 | 2.8 | 3.8 |
| 70 a 74 años | 276,653 | 628,196 | 904,849 | 430,534 | 550,814 | 981,348 | 9.0 | 2.6 | 3.3 | 7.0 | 2.1 | 3.0 |
| 75 a 79 años | 190,960 | 387,291 | 578,251 | 293,908 | 478,918 | 772,826 | 6.2 | 1.6 | 2.1 | 4.8 | 1.8 | 2.4 |
| 80 y más | 157,125 | 438,151 | 595,276 | 377,688 | 538,530 | 916,218 | 5.1 | 1.8 | 2.2 | 6.2 | 2.0 | 2.8 |
| Total | 3,089,547 | 24,037,061 | 27,126,608 | 6,133,038 | 26,662,860 | 32,795,898 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de hipertensión**

| Diagnóstico | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 6,126,122 | 14.8 |
| No | 35,344,994 | 85.2 |
| No sabe | 10,210 | .0 |
| Total | 41,481,326 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido de hipertensión arterial por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 93,504 | 3,014,350 | - | 3,107,854 | 288,362 | 3,860,632 | 1,743 | 4,150,737 | 4.6 | 18.4 | 0.0 | 16.8 | 7.1 | 20.4 | 33.5 | 18.0 |
| 25 a 29 años | 129,471 | 2,606,136 | - | 2,735,607 | 279,815 | 3,338,801 | 212 | 3,618,828 | 6.3 | 15.9 | 0.0 | 14.8 | 6.9 | 17.6 | 4.1 | 15.7 |
| 30 a 34 años | 145,860 | 2,309,041 | 235 | 2,455,136 | 297,880 | 2,805,084 | - | 3,102,964 | 7.1 | 14.1 | 4.7 | 13.3 | 7.3 | 14.8 | 0.0 | 13.5 |
| 35 a 39 años | 228,934 | 1,995,413 | 3,373 | 2,227,720 | 350,511 | 2,436,086 | - | 2,786,597 | 11.2 | 12.2 | 67.4 | 12.1 | 8.6 | 12.9 | 0.0 | 12.1 |
| 40 a 44 años | 213,868 | 1,557,239 | - | 1,771,107 | 340,907 | 1,797,928 | - | 2,138,835 | 10.5 | 9.5 | 0.0 | 9.6 | 8.3 | 9.5 | 0.0 | 9.3 |
| 45 a 49 años | 253,975 | 1,249,293 | - | 1,503,268 | 417,629 | 1,317,410 | 1,043 | 1,736,082 | 12.4 | 7.6 | 0.0 | 8.1 | 10.2 | 7.0 | 20.0 | 7.5 |
| 50 a 54 años | 191,750 | 1,061,368 | - | 1,253,118 | 495,434 | 945,283 | - | 1,440,717 | 9.4 | 6.5 | 0.0 | 6.8 | 12.1 | 5.0 | 0.0 | 6.3 |
| 55 a 59 años | 186,241 | 722,206 | 772 | 909,219 | 385,214 | 682,499 | - | 1,067,713 | 9.1 | 4.4 | 15.4 | 4.9 | 9.4 | 3.6 | 0.0 | 4.6 |
| 60 a 64 años | 202,000 | 617,985 | - | 819,985 | 349,100 | 627,602 | - | 976,702 | 9.9 | 3.8 | 0.0 | 4.4 | 8.5 | 3.3 | 0.0 | 4.2 |
| 65 a 69 años | 182,143 | 425,894 | 335 | 608,372 | 321,608 | 402,424 | 2,211 | 726,243 | 8.9 | 2.6 | 6.7 | 3.3 | 7.9 | 2.1 | 42.4 | 3.2 |
| 70 a 74 años | 101,664 | 368,716 | - | 470,380 | 234,030 | 297,983 | - | 532,013 | 5.0 | 2.2 | 0.0 | 2.5 | 5.7 | 1.6 | 0.0 | 2.3 |
| 75 a 79 años | 61,361 | 217,885 | 286 | 279,532 | 142,524 | 190,619 | - | 333,143 | 3.0 | 1.3 | 5.7 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.4 |
| 80 y más | 51,693 | 254,345 | - | 306,038 | 180,644 | 242,772 | - | 423,416 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 1.7 | 4.4 | 1.3 | 0.0 | 1.8 |
| Total | 2,042,464 | 16,399,871 | 5,001 | 18,447,336 | 4,083,658 | 18,945,123 | 5,209 | 23,033,990 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que padece de alguna enfermedad del riñón como infección de vías urinarias**

| Enfermedad del riñon | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 916,203 | 15.4 |
| No | 5,040,467 | 84.6 |
| Total | 5,956,670 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que padece de alguna enfermedad del riñón como infección de vías urinarias por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 6,030 | 355,106 | 361,136 | 66,893 | 345,394 | 412,287 | 2.7 | 13.8 | 12.9 | 9.6 | 14.0 | 13.0 |
| 25 a 29 años | 28,154 | 329,001 | 357,155 | 91,106 | 278,543 | 369,649 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 11.3 | 11.7 |
| 30 a 34 años | 16,667 | 320,891 | 337,558 | 115,737 | 320,459 | 436,196 | 7.5 | 12.5 | 12.1 | 16.7 | 13.0 | 13.8 |
| 35 a 39 años | 14,286 | 297,797 | 312,083 | 90,821 | 214,797 | 305,618 | 6.4 | 11.6 | 11.2 | 13.1 | 8.7 | 9.7 |
| 40 a 44 años | 15,961 | 206,700 | 222,661 | 81,722 | 212,851 | 294,573 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 11.8 | 8.6 | 9.3 |
| 45 a 49 años | 35,174 | 265,708 | 300,882 | 55,942 | 195,101 | 251,043 | 15.8 | 10.3 | 10.8 | 8.1 | 7.9 | 7.9 |
| 50 a 54 años | 22,064 | 228,098 | 250,162 | 32,108 | 238,666 | 270,774 | 9.9 | 8.9 | 8.9 | 4.6 | 9.7 | 8.6 |
| 55 a 59 años | 19,887 | 208,716 | 228,603 | 31,230 | 147,635 | 178,865 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 4.5 | 6.0 | 5.7 |
| 60 a 64 años | 14,117 | 97,987 | 112,104 | 24,090 | 92,119 | 116,209 | 6.4 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
| 65 a 69 años | 5,482 | 109,401 | 114,883 | 54,606 | 116,740 | 171,346 | 2.5 | 4.3 | 4.1 | 7.9 | 4.7 | 5.4 |
| 70 a 74 años | 14,510 | 60,876 | 75,386 | 21,562 | 127,916 | 149,478 | 6.5 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 5.2 | 4.7 |
| 75 a 79 años | 20,608 | 39,109 | 59,717 | 22,354 | 79,523 | 101,877 | 9.3 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 80 y más | 9,288 | 54,666 | 63,954 | 5,804 | 96,667 | 102,471 | 4.2 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 3.9 | 3.2 |
| Total | 222,228 | 2,574,056 | 2,796,284 | 693,975 | 2,466,411 | 3,160,386 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que padece de alguna enfermedad del riñón como infección de vías urinarias**

| Diagnóstico | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 620,596 | 12.7 |
| No | 4,271,937 | 87.3 |
| No sabe | 3,082 | .1 |
| Total | 4,895,615 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que padece de alguna enfermedad del riñón como infección de vías urinarias por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | Proporciones | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | MUJER | | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | Total | Sí | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | - | 376,851 | 376,851 | 84,935 | 396,543 | - | 481,478 | - | 18.7 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | - | 17.6 |
| 25 a 29 años | 12,751 | 336,563 | 349,314 | 71,710 | 340,764 | - | 412,474 | 9.0 | 16.7 | 16.2 | 15.0 | 15.1 | - | 15.1 |
| 30 a 34 años | 52,818 | 246,168 | 298,986 | 86,270 | 281,426 | - | 367,696 | 37.4 | 12.2 | 13.9 | 18.0 | 12.5 | - | 13.4 |
| 35 a 39 años | 37,540 | 204,882 | 242,422 | 39,681 | 296,867 | - | 336,548 | 26.6 | 10.2 | 11.2 | 8.3 | 13.2 | - | 12.3 |
| 40 a 44 años | 4,268 | 215,660 | 219,928 | 35,326 | 222,343 | - | 257,669 | 3.0 | 10.7 | 10.2 | 7.4 | 9.8 | - | 9.4 |
| 45 a 49 años | - | 161,961 | 161,961 | 35,683 | 176,862 | 3,082 | 215,627 | - | 8.0 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 100.0 | 7.9 |
| 50 a 54 años | 14,131 | 133,043 | 147,174 | 31,769 | 141,989 | - | 173,758 | 10.0 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | - | 6.3 |
| 55 a 59 años | 2,367 | 96,319 | 98,686 | 32,372 | 93,792 | - | 126,164 | 1.7 | 4.8 | 4.6 | 6.8 | 4.2 | - | 4.6 |
| 60 a 64 años | - | 86,381 | 86,381 | 27,700 | 79,342 | - | 107,042 | - | 4.3 | 4.0 | 5.8 | 3.5 | - | 3.9 |
| 65 a 69 años | 7,161 | 54,756 | 61,917 | 13,488 | 79,102 | - | 92,590 | 5.1 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | - | 3.4 |
| 70 a 74 años | 2,166 | 48,939 | 51,105 | 11,303 | 58,370 | - | 69,673 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | - | 2.5 |
| 75 a 79 años | - | 29,382 | 29,382 | 3,559 | 38,864 | - | 42,423 | - | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | - | 1.5 |
| 80 y más | 8,069 | 23,588 | 31,657 | 5,529 | 51,180 | - | 56,709 | 5.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | - | 2.1 |
| | 141,271 | 2,014,493 | 2,155,764 | 479,325 | 2,257,444 | 3,082 | 2,739,851 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente:Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que padece de alguna enfermedad del riñón como infección de vías urinarias**

| Enfermedad del riñon | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 8,147,841 | 13.6 |
| No | 51,774,665 | 86.4 |
| Total | 59,922,506 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que padece de alguna enfermedad del riñón como infección de vías urinarias por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 125,963 | 3,691,102 | 3,817,065 | 635,606 | 3,734,349 | 4,369,955 | 6.0 | 14.8 | 14.1 | 10.5 | 14.0 | 13.3 |
| 25 a 29 años | 201,541 | 3,126,539 | 3,328,080 | 813,490 | 3,205,527 | 4,019,017 | 9.5 | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 12.0 | 12.3 |
| 30 a 34 años | 272,965 | 3,001,610 | 3,274,575 | 871,670 | 3,210,932 | 4,082,602 | 12.9 | 12.0 | 12.1 | 14.4 | 12.0 | 12.4 |
| 35 a 39 años | 234,801 | 2,808,027 | 3,042,828 | 895,408 | 3,205,990 | 4,101,398 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 14.8 | 12.0 | 12.5 |
| 40 a 44 años | 212,468 | 2,600,810 | 2,813,278 | 705,607 | 2,909,024 | 3,614,631 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 11.7 | 10.9 | 11.0 |
| 45 a 49 años | 248,310 | 2,246,820 | 2,495,130 | 513,312 | 2,321,200 | 2,834,512 | 11.7 | 9.0 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 8.6 |
| 50 a 54 años | 158,121 | 1,937,034 | 2,095,155 | 447,939 | 1,965,934 | 2,413,873 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.4 |
| 55 a 59 años | 149,075 | 1,581,902 | 1,730,977 | 306,682 | 1,501,408 | 1,808,090 | 7.0 | 6.3 | 6.4 | 5.1 | 5.6 | 5.5 |
| 60 a 64 años | 131,430 | 1,219,789 | 1,351,219 | 247,662 | 1,376,484 | 1,624,146 | 6.2 | 4.9 | 5.0 | 4.1 | 5.1 | 5.0 |
| 65 a 69 años | 95,254 | 1,004,671 | 1,099,925 | 221,573 | 1,035,709 | 1,257,282 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
| 70 a 74 años | 109,499 | 795,350 | 904,849 | 131,603 | 849,745 | 981,348 | 5.2 | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 3.2 | 3.0 |
| 75 a 79 años | 106,758 | 471,493 | 578,251 | 118,926 | 653,900 | 772,826 | 5.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
| 80 y más | 69,140 | 526,136 | 595,276 | 123,038 | 793,180 | 916,218 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 2.8 |
| Total | 2,115,325 | 25,011,283 | 27,126,608 | 6,032,516 | 26,763,382 | 32,795,898 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que padece de alguna enfermedad del riñón como infección de vías urinarias**

| Diagnóstico | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 5,083,878 | 10.2 |
| No | 44,544,564 | 89.6 |
| No sabe | 87,729 | .2 |
| Total | 49,716,171 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que padece de alguna enfermedad del riñón como infección de vías urinarias por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 112,917 | 4,269,887 | 10,390 | 4,393,194 | 753,568 | 4,309,865 | 8,276 | 5,071,709 | 11.4 | 19.1 | 23.9 | 18.8 | 18.4 | 19.4 | 18.7 | 19.3 |
| 25 a 29 años | 115,404 | 3,534,181 | 7,172 | 3,656,757 | 696,764 | 3,446,908 | 6,533 | 4,150,205 | 11.6 | 15.8 | 16.5 | 15.6 | 17.0 | 15.5 | 14.8 | 15.8 |
| 30 a 34 años | 170,476 | 2,983,198 | 7,816 | 3,161,490 | 616,395 | 2,961,605 | 5,467 | 3,583,467 | 17.2 | 13.3 | 18.0 | 13.5 | 15.1 | 13.3 | 12.3 | 13.6 |
| 35 a 39 años | 183,660 | 2,621,313 | 1,205 | 2,806,178 | 487,670 | 2,690,654 | 2,622 | 3,180,946 | 18.5 | 11.7 | 2.8 | 12.0 | 11.9 | 12.1 | 5.9 | 12.1 |
| 40 a 44 años | 90,147 | 2,081,032 | 7,319 | 2,178,498 | 388,894 | 1,981,523 | 4,046 | 2,374,463 | 9.1 | 9.3 | 16.8 | 9.3 | 9.5 | 8.9 | 9.1 | 9.0 |
| 45 a 49 años | 65,587 | 1,707,337 | 5,917 | 1,778,841 | 322,402 | 1,615,330 | 4,590 | 1,942,322 | 6.6 | 7.6 | 13.6 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 10.4 | 7.4 |
| 50 a 54 años | 56,040 | 1,391,070 | - | 1,447,110 | 259,763 | 1,286,764 | 3,256 | 1,549,783 | 5.7 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 7.4 | 5.9 |
| 55 a 59 años | 48,483 | 1,059,689 | 1,448 | 1,109,620 | 192,218 | 1,002,361 | 2,663 | 1,197,242 | 4.9 | 4.7 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 6.0 | 4.5 |
| 60 a 64 años | 37,237 | 912,262 | 694 | 950,193 | 146,120 | 902,450 | 2,767 | 1,051,337 | 3.8 | 4.1 | 1.6 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 6.2 | 4.0 |
| 65 a 69 años | 38,779 | 653,419 | 296 | 692,494 | 81,644 | 706,407 | 577 | 788,628 | 3.9 | 2.9 | 0.7 | 3.0 | 2.0 | 3.2 | 1.3 | 3.0 |
| 70 a 74 años | 24,131 | 510,948 | - | 535,079 | 65,224 | 515,117 | 423 | 580,764 | 2.4 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.0 | 2.2 |
| 75 a 79 años | 19,537 | 305,933 | 868 | 326,338 | 29,522 | 329,349 | 309 | 359,180 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 1.4 |
| 80 y más | 29,255 | 324,493 | 331 | 354,079 | 52,041 | 441,469 | 2,744 | 496,254 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 6.2 | 1.9 |
| Total | 991,653 | 22,354,762 | 43,456 | 23,389,871 | 4,092,225 | 22,189,802 | 44,273 | 26,326,300 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que tiene o ha tenido el colesterol alto**

| Colesterol alto | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 702,637 | 11.8 |
| No | 5,189,338 | 87.1 |
| No sabe | 64,695 | 1.1 |
| Total | 5,956,670 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que tiene o ha tenido el colesterol alto por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 3,484 | 357,652 | - | 361,136 | 11,850 | 396,084 | 4,353 | 412,287 | 1.2 | 14.5 | - | 12.9 | 3.0 | 14.6 | 10.8 | 13.0 |
| 25 a 29 años | 8,706 | 348,449 | - | 357,155 | 13,105 | 356,544 | - | 369,649 | 2.9 | 14.1 | - | 12.8 | 3.3 | 13.1 | - | 11.7 |
| 30 a 34 años | 13,660 | 323,898 | - | 337,558 | 6,968 | 429,228 | - | 436,196 | 4.5 | 13.1 | - | 12.1 | 1.7 | 15.8 | - | 13.8 |
| 35 a 39 años | 21,765 | 280,161 | 10,157 | 312,083 | 14,514 | 284,574 | 6,530 | 305,618 | 7.2 | 11.3 | 41.8 | 11.2 | 3.6 | 10.5 | 16.2 | 9.7 |
| 40 a 44 años | 36,698 | 185,963 | - | 222,661 | 31,350 | 252,340 | 10,883 | 294,573 | 12.1 | 7.5 | - | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 26.9 | 9.3 |
| 45 a 49 años | 72,693 | 225,287 | 2,902 | 300,882 | 54,200 | 196,843 | - | 251,043 | 24.0 | 9.1 | 12.0 | 10.8 | 13.5 | 7.2 | - | 7.9 |
| 50 a 54 años | 34,542 | 214,169 | 1,451 | 250,162 | 47,152 | 214,120 | 9,502 | 270,774 | 11.4 | 8.7 | 6.0 | 8.9 | 11.8 | 7.9 | 23.5 | 8.6 |
| 55 a 59 años | 49,162 | 176,055 | 3,386 | 228,603 | 26,991 | 144,906 | 6,968 | 178,865 | 16.3 | 7.1 | 13.9 | 8.2 | 6.7 | 5.3 | 17.2 | 5.7 |
| 60 a 64 años | 17,166 | 92,036 | 2,902 | 112,104 | 35,121 | 81,088 | - | 116,209 | 5.7 | 3.7 | 12.0 | 4.0 | 8.8 | 3.0 | - | 3.7 |
| 65 a 69 años | 8,706 | 106,177 | - | 114,883 | 74,072 | 95,097 | 2,177 | 171,346 | 2.9 | 4.3 | - | 4.1 | 18.5 | 3.5 | 5.4 | 5.4 |
| 70 a 74 años | 13,059 | 62,327 | - | 75,386 | 39,265 | 110,213 | - | 149,478 | 4.3 | 2.5 | - | 2.7 | 9.8 | 4.1 | - | 4.7 |
| 75 a 79 años | 13,059 | 43,174 | 3,484 | 59,717 | 25,224 | 76,653 | - | 101,877 | 4.3 | 1.7 | 14.3 | 2.1 | 6.3 | 2.8 | - | 3.2 |
| 80 y más | 9,580 | 54,374 | - | 63,954 | 20,545 | 81,926 | - | 102,471 | 3.2 | 2.2 | - | 2.3 | 5.1 | 3.0 | - | 3.2 |
| Total | 302,280 | 2,469,722 | 24,282 | 2,796,284 | 400,357 | 2,719,616 | 40,413 | 3,160,386 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que tiene o ha tenido el colesterol alto**

| Diagnóstico | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 469,201 | 9.6 |
| No | 4,389,478 | 89.9 |
| No sabe | 25,365 | .5 |
| Total | 4,884,044 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que tiene o ha tenido el colesterol alto por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | - | 358,631 | 14,031 | 372,662 | 8,880 | 464,639 | 7,959 | 481,478 | - | 18.6 | 100.0 | 17.4 | 3.4 | 18.9 | 70.2 | 17.6 |
| 25 a 29 años | 12,355 | 336,959 | - | 349,314 | 11,383 | 399,519 | 1,572 | 412,474 | 6.0 | 17.5 | - | 16.3 | 4.3 | 16.2 | 13.9 | 15.1 |
| 30 a 34 años | 15,655 | 283,331 | - | 298,986 | 36,409 | 327,925 | - | 364,334 | 7.6 | 14.7 | - | 13.9 | 13.8 | 13.3 | - | 13.3 |
| 35 a 39 años | 35,676 | 202,726 | - | 238,402 | 20,454 | 316,094 | - | 336,548 | 17.3 | 10.5 | - | 11.1 | 7.8 | 12.8 | - | 12.3 |
| 40 a 44 años | 4,692 | 215,236 | - | 219,928 | 48,920 | 208,749 | - | 257,669 | 2.3 | 11.2 | - | 10.2 | 18.6 | 8.5 | - | 9.4 |
| 45 a 49 años | 13,125 | 148,836 | - | 161,961 | 14,469 | 201,158 | - | 215,627 | 6.4 | 7.7 | - | 7.5 | 5.5 | 8.2 | - | 7.9 |
| 50 a 54 años | 45,644 | 101,530 | - | 147,174 | 43,099 | 128,856 | 1,803 | 173,758 | 22.2 | 5.3 | - | 6.9 | 16.4 | 5.2 | 15.9 | 6.3 |
| 55 a 59 años | 15,751 | 82,935 | - | 98,686 | 25,349 | 100,815 | - | 126,164 | 7.6 | 4.3 | - | 4.6 | 9.6 | 4.1 | - | 4.6 |
| 60 a 64 años | 20,096 | 66,285 | - | 86,381 | 25,848 | 81,194 | - | 107,042 | 9.8 | 3.4 | - | 4.0 | 9.8 | 3.3 | - | 3.9 |
| 65 a 69 años | 16,553 | 45,364 | - | 61,917 | 15,060 | 77,530 | - | 92,590 | 8.0 | 2.4 | - | 2.9 | 5.7 | 3.1 | - | 3.4 |
| 70 a 74 años | 16,614 | 34,491 | - | 51,105 | 4,541 | 65,132 | - | 69,673 | 8.1 | 1.8 | - | 2.4 | 1.7 | 2.6 | - | 2.5 |
| 75 a 79 años | 9,775 | 19,607 | - | 29,382 | 7,717 | 34,706 | - | 42,423 | 4.7 | 1.0 | - | 1.4 | 2.9 | 1.4 | - | 1.6 |
| 80 y más | - | 31,657 | - | 31,657 | 1,136 | 55,573 | - | 56,709 | - | 1.6 | - | 1.5 | 0.4 | 2.3 | - | 2.1 |
| Total | 205,936 | 1,927,588 | 14,031 | 2,147,555 | 263,265 | 2,461,890 | 11,334 | 2,736,489 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que tiene o ha tenido el colesterol alto**

| Colesterol alto | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 5,132,075 | 8.6 |
| No | 54,254,667 | 90.5 |
| No sabe | 535,764 | .9 |
| Total | 59,922,506 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que tiene o ha tenido el colesterol alto por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total | Sí | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 50,141 | 3,740,535 | 26,389 | 3,817,065 | 105,887 | 4,234,580 | 29,488 | 4,369,955 | 2.4 | 15.1 | 11.1 | 14.1 | 3.5 | 14.4 | 9.9 | 13.3 |
| 25 a 29 años | 109,425 | 3,184,130 | 34,525 | 3,328,080 | 130,005 | 3,845,012 | 44,000 | 4,019,017 | 5.3 | 12.8 | 14.5 | 12.3 | 4.3 | 13.1 | 14.8 | 12.3 |
| 30 a 34 años | 162,030 | 3,087,049 | 25,496 | 3,274,575 | 237,546 | 3,813,043 | 32,013 | 4,082,602 | 7.8 | 12.4 | 10.7 | 12.1 | 7.8 | 13.0 | 10.7 | 12.4 |
| 35 a 39 años | 190,659 | 2,828,052 | 24,117 | 3,042,828 | 216,243 | 3,850,163 | 34,992 | 4,101,398 | 9.2 | 11.4 | 10.1 | 11.2 | 7.1 | 13.1 | 11.7 | 12.5 |
| 40 a 44 años | 238,376 | 2,557,014 | 17,888 | 2,813,278 | 325,196 | 3,251,437 | 37,998 | 3,614,631 | 11.5 | 10.3 | 7.5 | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 12.8 | 11.0 |
| 45 a 49 años | 321,007 | 2,153,829 | 20,294 | 2,495,130 | 345,478 | 2,469,503 | 19,531 | 2,834,512 | 15.5 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 11.3 | 8.4 | 6.6 | 8.6 |
| 50 a 54 años | 276,855 | 1,797,951 | 20,349 | 2,095,155 | 409,847 | 1,982,102 | 21,924 | 2,413,873 | 13.3 | 7.2 | 8.6 | 7.7 | 13.4 | 6.7 | 7.4 | 7.4 |
| 55 a 59 años | 257,624 | 1,446,327 | 27,026 | 1,730,977 | 327,583 | 1,462,037 | 18,470 | 1,808,090 | 12.4 | 5.8 | 11.4 | 6.4 | 10.7 | 5.0 | 6.2 | 5.5 |
| 60 a 64 años | 153,008 | 1,188,996 | 9,215 | 1,351,219 | 278,923 | 1,332,013 | 13,210 | 1,624,146 | 7.4 | 4.8 | 3.9 | 5.0 | 9.1 | 4.5 | 4.4 | 5.0 |
| 65 a 69 años | 120,885 | 973,222 | 5,818 | 1,099,925 | 285,535 | 960,568 | 11,179 | 1,257,282 | 5.8 | 3.9 | 2.4 | 4.1 | 9.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 |
| 70 a 74 años | 98,263 | 800,750 | 5,836 | 904,849 | 174,122 | 802,139 | 5,087 | 981,348 | 4.7 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 3.0 |
| 75 a 79 años | 63,648 | 504,602 | 10,001 | 578,251 | 132,028 | 619,648 | 21,150 | 772,826 | 3.1 | 2.0 | 4.2 | 2.1 | 4.3 | 2.1 | 7.1 | 2.4 |
| 80 y más | 33,482 | 550,843 | 10,951 | 595,276 | 88,279 | 819,122 | 8,817 | 916,218 | 1.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.8 |
| Total | 2,075,403 | 24,813,300 | 237,905 | 27,126,608 | 3,056,672 | 29,441,367 | 297,859 | 32,795,898 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que tiene o ha tenido el colesterol alto**

| Diagnóstico | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 3,319,294 | 6.7 |
| No | 45,839,858 | 92.8 |
| No sabe | 245,914 | .5 |
| Total | 49,405,066 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de adultos de 20 años o más que alguna vez le ha dicho un médico u otro personal de salud que tiene o ha tenido el colesterol alto por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total | Si | No | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 57,937 | 4,278,703 | 26,636 | 4,363,276 | 80,222 | 4,938,942 | 17,340 | 5,036,504 | 3.7 | 19.9 | 21.3 | 18.8 | 4.6 | 20.3 | 14.4 | 19.2 |
| 25 a 29 años | 119,392 | 3,489,332 | 23,945 | 3,632,669 | 78,103 | 4,037,169 | 17,288 | 4,132,560 | 7.6 | 16.2 | 19.1 | 15.6 | 4.5 | 16.6 | 14.3 | 15.8 |
| 30 a 34 años | 136,535 | 2,986,786 | 21,268 | 3,144,589 | 133,834 | 3,410,610 | 20,159 | 3,564,603 | 8.7 | 13.9 | 17.0 | 13.5 | 7.7 | 14.0 | 16.7 | 13.6 |
| 35 a 39 años | 174,935 | 2,600,226 | 15,965 | 2,791,126 | 155,142 | 2,994,545 | 12,174 | 3,161,861 | 11.1 | 12.1 | 12.7 | 12.0 | 8.9 | 12.3 | 10.1 | 12.1 |
| 40 a 44 años | 191,895 | 1,969,587 | 11,043 | 2,172,525 | 193,349 | 2,158,565 | 13,136 | 2,365,050 | 12.2 | 9.1 | 8.8 | 9.4 | 11.1 | 8.9 | 10.9 | 9.0 |
| 45 a 49 años | 170,318 | 1,563,205 | 14,482 | 1,748,005 | 192,828 | 1,732,097 | 7,194 | 1,932,119 | 10.8 | 7.3 | 11.6 | 7.5 | 11.1 | 7.1 | 6.0 | 7.4 |
| 50 a 54 años | 220,351 | 1,218,477 | 7,444 | 1,446,272 | 252,057 | 1,275,665 | 8,834 | 1,536,556 | 14.0 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 14.4 | 5.2 | 7.3 | 5.9 |
| 55 a 59 años | 142,500 | 954,259 | 1,026 | 1,097,785 | 189,600 | 985,181 | 5,250 | 1,180,031 | 9.1 | 4.4 | 0.8 | 4.7 | 10.9 | 4.1 | 4.4 | 4.5 |
| 60 a 64 años | 141,242 | 801,104 | 674 | 943,020 | 170,987 | 869,756 | 6,706 | 1,047,449 | 9.0 | 3.7 | 0.5 | 4.1 | 9.8 | 3.6 | 5.6 | 4.0 |
| 65 a 69 años | 97,992 | 589,240 | 825 | 688,057 | 109,730 | 672,814 | 1,774 | 784,318 | 6.2 | 2.7 | 0.7 | 3.0 | 6.3 | 2.8 | 1.5 | 3.0 |
| 70 a 74 años | 61,969 | 467,181 | 982 | 530,132 | 78,837 | 498,278 | 2,871 | 579,986 | 3.9 | 2.2 | 0.8 | 2.3 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
| 75 a 79 años | 44,444 | 279,878 | 642 | 324,964 | 44,856 | 307,580 | 2,616 | 355,052 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 2.2 | 1.4 |
| 80 y más | 14,840 | 337,409 | 377 | 352,626 | 65,399 | 423,269 | 5,263 | 493,931 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 3.7 | 1.7 | 4.4 | 1.9 |
| | 1,574,350 | 21,535,387 | 125,309 | 23,235,046 | 1,744,944 | 24,304,471 | 120,605 | 26,170,020 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de las mujeres de 20 a 49 años, cuyo último hijo nació vivo cinco años previos a la entrevista, según lugar de atención**

| Lugar de atención | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| IMSS | 208,376 | 34.1 |
| Secretaría de Salud | 200,207 | 32.8 |
| SEGURO POPULAR (SSA) | 2,902 | .5 |
| DIF, CRUZ ROJA, INI | 8,171 | 1.3 |
| ISSSTE, ISSSTE ESTATAL | 21,961 | 3.6 |
| MARINA/DEFENSA, PEMEX | 2,902 | .5 |
| PARTICULAR | 144,164 | 23.6 |
| HOSPITAL CIVIL | 7,353 | 1.2 |
| INSTITUTOS NACIONALES | 7,836 | 1.3 |
| Otro lugar | 7,255 | 1.2 |
| Total | 611,127 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de las mujeres de 20 a 49 años, cuyo último hijo nació vivo cinco años previos a la entrevista, según tipo de parto**

| Tipo de parto | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| natural? | 399,633 | 6.7 |
| cesárea por urgencias? | 135,018 | 2.3 |
| cesárea programada? | 76,476 | 1.3 |
| Total | 611,127 | 10.3 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de las mujeres de 20 a 49 años, cuyo último hijo nació vivo cinco años previos a la entrevista, según lugar de atención y tipo de parto**

| Lugar de atención y tipo de parto | Absolutos | | | | Porporciones | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | natural? | cesárea por urgencias? | cesárea programada? | Total | natural? | cesárea por urgencias? | cesárea programada? | Total |
| IMSS | 130,567 | 62,244 | 15,565 | 208,376 | 32.7 | 46.1 | 20.4 | 34.1 |
| Secretaría de Salud | 164,234 | 23,492 | 12,481 | 200,207 | 41.1 | 17.4 | 16.3 | 32.8 |
| SEGURO POPULAR (SSA) | 2,902 | - | - | 2,902 | 0.7 | - | - | 0.5 |
| DIF, CRUZ ROJA, INI | - | - | 8,171 | 8,171 | - | - | 10.7 | 1.3 |
| ISSSTE, ISSSTE ESTATAL | 12,382 | 4,353 | 5,226 | 21,961 | 3.1 | 3.2 | 6.8 | 3.6 |
| MARINA/DEFENSA, PEMEX | - | - | 2,902 | 2,902 | - | - | 3.8 | 0.5 |
| PARTICULAR | 70,973 | 41,060 | 32,131 | 144,164 | 17.8 | 30.4 | 42.0 | 23.6 |
| HOSPITAL CIVIL | 3,484 | 3,869 | - | 7,353 | 0.9 | 2.9 | - | 1.2 |
| INSTITUTOS NACIONALES | 7,836 | - | - | 7,836 | 2.0 | - | - | 1.3 |
| Otro lugar | 7,255 | - | - | 7,255 | 1.8 | - | - | 1.2 |
| Total | 399,633 | 135,018 | 76,476 | 611,127 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Dirección de Estadísticas DF con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de las mujeres de 20 a 49 años, cuyo último hijo nació vivo cinco años previos a la entrevista, según lugar de atención**

| Institución | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| IMSS | 335,273 | 36.6 |
| ISSSTE | 25,863 | 2.8 |
| SSA | 248,862 | 27.2 |
| IMSS Sol. | 10,086 | 1.1 |
| Otra inst de gob | 25,248 | 2.8 |
| Consultorio priv | 246,817 | 27.0 |
| Casa de entrev | 12,701 | 1.4 |
| Otro lugar | 10,172 | 1.1 |
| Total | 915,022 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de las mujeres de 20 a 49 años, cuyo último hijo nació vivo cinco años previos a la entrevista, según tipo de parto**

| Tipo de parto | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Normal | 588,189 | 64.3 |
| Cesárea | 326,833 | 35.7 |
| Total | 915,022 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de las mujeres de 20 a 49 años, cuyo último hijo nació vivo cinco años previos a la entrevista, según lugar de atención y tipo de parto**

| Lugar atención | Absolutos | | | Proporciones | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Normal | Cesárea | Total | Normal | Cesárea | Total |
| IMSS | 214,521 | 120,752 | 335,273 | 36.5 | 36.9 | 36.6 |
| ISSSTE | 17,591 | 8,272 | 25,863 | 3.0 | 2.5 | 2.8 |
| SSA | 186,172 | 62,690 | 248,862 | 31.7 | 19.2 | 27.2 |
| IMSS Sol. | 10,086 | - | 10,086 | 1.7 | - | 1.1 |
| Otra inst de gob | 15,572 | 9,676 | 25,248 | 2.6 | 3.0 | 2.8 |
| Consultorio priv | 124,822 | 121,995 | 246,817 | 21.2 | 37.3 | 27.0 |
| Casa de entrev | 12,701 | - | 12,701 | 2.2 | - | 1.4 |
| Otro lugar | 6,724 | 3,448 | 10,172 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| | 588,189 | 326,833 | 915,022 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de las mujeres de 20 a 49 años, cuyo último hijo nació vivo cinco años previos a la entrevista, según lugar de atención**

| Lugar de atención | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| IMSS OPORTUNIDADES | 60,753 | .8 |
| IMSS | 2,389,554 | 29.7 |
| Secretaría de Salud | 2,177,074 | 27.1 |
| SEGURO POPULAR (SSA) | 201,216 | 2.5 |
| DIF, CRUZ ROJA, INI | 58,555 | .7 |
| ISSSTE, ISSSTE ESTATAL | 188,226 | 2.3 |
| MARINA/DEFENSA, PEMEX | 46,122 | .6 |
| PARTICULAR | 1,937,877 | 24.1 |
| HOSPITAL CIVIL | 229,976 | 2.9 |
| INSTITUTOS NACIONALES | 104,847 | 1.3 |
| Casa de la partera | 149,880 | 1.9 |
| Casa de la entrevistada | 310,311 | 3.9 |
| Otro lugar | 89,145 | 1.1 |
| OTRA INSTITUTCION | 82,346 | 1.0 |
| NO SABE | 18,933 | .2 |
| Total | 8,044,815 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de las mujeres de 20 a 49 años, cuyo último hijo nació vivo cinco años previos a la entrevista, según tipo de parto**

| Tipo de parto | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| natural? | 5,019,808 | 8.4 |
| cesárea por urgencias? | 1,659,765 | 2.8 |
| cesárea programada? | 1,365,242 | 2.3 |
| Total | 8,044,815 | 13.4 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de las mujeres de 20 a 49 años, cuyo último hijo nació vivo cinco años previos a la entrevista, según lugar de atención y tipo de parto**

| Lugar de atención y tipo de parto | Absolutos | | | | Porporciones | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | natural? | cesárea por urgencias? | cesárea programada? | Total | natural? | cesárea por urgencias? | cesárea programada? | Total |
| IMSS OPORTUNIDADES | 47,512 | 10,891 | 2,350 | 60,753 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.8 |
| IMSS | 1,428,307 | 558,531 | 402,716 | 2,389,554 | 28.5 | 33.7 | 29.5 | 29.7 |
| Secretaría de Salud | 1,560,079 | 382,351 | 234,644 | 2,177,074 | 31.1 | 23.0 | 17.2 | 27.1 |
| SEGURO POPULAR (SSA) | 137,907 | 32,795 | 30,514 | 201,216 | 2.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| DIF, CRUZ ROJA, INI | 29,564 | 9,359 | 19,632 | 58,555 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.7 |
| ISSSTE, ISSSTE ESTATAL | 79,228 | 42,865 | 66,133 | 188,226 | 1.6 | 2.6 | 4.8 | 2.3 |
| MARINA/DEFENSA, PEMEX | 19,296 | 17,113 | 9,713 | 46,122 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.6 |
| PARTICULAR | 923,772 | 497,223 | 516,882 | 1,937,877 | 18.4 | 30.0 | 37.9 | 24.1 |
| HOSPITAL CIVIL | 166,564 | 37,286 | 26,126 | 229,976 | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 2.9 |
| INSTITUTOS NACIONALES | 58,330 | 33,277 | 13,240 | 104,847 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.3 |
| Casa de la partera | 147,074 | 2,806 | - | 149,880 | 2.9 | 0.2 | - | 1.9 |
| Casa de la entrevistada | 309,259 | 1,052 | - | 310,311 | 6.2 | 0.1 | - | 3.9 |
| Otro lugar | 61,788 | 12,309 | 15,048 | 89,145 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
| OTRA INSTITUTCION | 40,872 | 17,058 | 24,416 | 82,346 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.0 |
| NO SABE | 10,256 | 4,849 | 3,828 | 18,933 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Total | 5,019,808 | 1,659,765 | 1,365,242 | 8,044,815 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de las mujeres de 20 a 49 años, cuyo último hijo nació vivo cinco años previos a la entrevista, según lugar de atención**

| Institución | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| IMSS | 3,138,914 | 32.0 |
| ISSSTE | 314,583 | 3.2 |
| SSA | 2,457,358 | 25.0 |
| IMSS Sol. | 306,627 | 3.1 |
| Otra inst de gob | 419,699 | 4.3 |
| Consultorio priv | 1,990,605 | 20.3 |
| Casa de partera | 260,855 | 2.7 |
| Casa de entrev | 740,083 | 7.5 |
| Otro lugar | 191,465 | 1.9 |
| No sabe | 2,450 | .0 |
| Total | 9,822,639 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de las mujeres de 20 a 49 años, cuyo último hijo nació vivo cinco años previos a la entrevista, según tipo de parto**

| Tipo de parto | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Normal | 6,838,786.0 | 69.6 |
| Cesárea | 2,969,496.0 | 30.2 |
| No sabe | 17,154.0 | .2 |
| Total | 9,825,436.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de las mujeres de 20 a 49 años, cuyo último hijo nació vivo cinco años previos a la entrevista, según lugar de atención y tipo de parto**

| Lugar atención | Absolutos | | | | Proporciones | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Normal | Cesárea | No sabe | Total | Normal | Cesárea | No sabe | Total |
| IMSS | 2,061,337 | 1,074,920 | 2,657 | 3,138,914 | 30.15 | 36.20 | 15.49 | 31.96 |
| ISSSTE | 174,469 | 140,114 | - | 314,583 | 2.55 | 4.72 | - | 3.20 |
| SSA | 1,842,658 | 611,015 | 3,685 | 2,457,358 | 26.95 | 20.58 | 21.48 | 25.02 |
| IMSS Sol. | 226,354 | 80,130 | 143 | 306,627 | 3.31 | 2.70 | 0.83 | 3.12 |
| Otra inst de gob | 279,604 | 139,375 | 720 | 419,699 | 4.09 | 4.69 | 4.20 | 4.27 |
| Consultorio priv | 1,123,017 | 865,098 | 2,490 | 1,990,605 | 16.43 | 29.14 | 14.52 | 20.27 |
| Casa de partera | 256,816 | 3,634 | 405 | 260,855 | 3.76 | 0.12 | 2.36 | 2.66 |
| Casa de entrev | 729,167 | 8,544 | 2,372 | 740,083 | 10.67 | 0.29 | 13.83 | 7.53 |
| Otro lugar | 142,033 | 46,230 | 3,202 | 191,465 | 2.08 | 1.56 | 18.67 | 1.95 |
| No sabe | 970 | - | 1,480 | 2,450 | 0.01 | - | 8.63 | 0.02 |
| Total | 6,836,425 | 2,969,060 | 17,154 | 9,822,639 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Proporción de Adultos de 20 a 49 años, según método de planificación familiar utilizado**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Operación femenina o ligadura | 601,907 | 36.9 |
| Operación masculina o vasectomía | 71,923 | 4.4 |
| Pastillas o píldoras | 110,762 | 6.8 |
| Inyecciones | 55,020 | 3.4 |
| Norplant | 5,286 | .3 |
| Dispositivo, DIU | 399,832 | 24.5 |
| Preservativo o condón | 266,005 | 16.3 |
| Óvulos, jalea o espumas | 12,524 | .8 |
| Ritmo, calendario, abstinencia periódica, | 68,589 | 4.2 |
| Retiro o coito interrumpido | 14,087 | .9 |
| Pastilla de emergencia | 7,255 | .4 |
| Otro | 18,603 | 1.1 |
| Total | 1,631,793 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de Adultos de 20 a 49 años, según uso actual de algún método de planificación familiar por grupos de edad y sexo**

| Método | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| **Operación femenina o ligadura** | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | - | 93,598 | 93,598 | - | 81,952 | 81,952 | - | 18.3 | 12.3 | - | 20.4 | 10.9 |
| 25 a 29 años | 9,722 | 99,046 | 108,768 | 19,252 | 86,134 | 105,386 | 3.9 | 19.4 | 14.3 | 5.5 | 21.4 | 14.0 |
| 30 a 34 años | 44,320 | 139,935 | 184,255 | 83,146 | 93,466 | 176,612 | 17.7 | 27.4 | 24.2 | 23.7 | 23.2 | 23.4 |
| 35 a 39 años | 57,825 | 77,850 | 135,675 | 83,674 | 67,556 | 151,430 | 23.1 | 15.3 | 17.8 | 23.9 | 16.8 | 20.1 |
| 40 a 44 años | 56,884 | 37,400 | 94,284 | 121,107 | 46,672 | 167,779 | 22.7 | 7.3 | 12.4 | 34.5 | 11.6 | 22.3 |
| 45 a 49 años | 82,044 | 62,560 | 144,604 | 43,733 | 26,514 | 70,247 | 32.7 | 12.3 | 19.0 | 12.5 | 6.6 | 9.3 |
| Total | 250,795 | 510,389 | 761,184 | 351,112 | 402,294 | 753,406 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Operación masculina o vasectomía** | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | - | 93,598 | 93,598 | - | 81,952 | 81,952 | - | 12.7 | 12.3 | - | 11.7 | 10.9 |
| 25 a 29 años | - | 108,768 | 108,768 | 7,160 | 98,226 | 105,386 | - | 14.7 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 14.0 |
| 30 a 34 años | - | 184,255 | 184,255 | 3,869 | 172,743 | 176,612 | - | 24.9 | 24.2 | 7.5 | 24.6 | 23.4 |
| 35 a 39 años | 2,902 | 132,773 | 135,675 | 11,998 | 139,432 | 151,430 | 13.6 | 17.9 | 17.8 | 23.7 | 19.8 | 20.1 |
| 40 a 44 años | 8,128 | 86,156 | 94,284 | 21,042 | 146,737 | 167,779 | 38.0 | 11.6 | 12.4 | 41.6 | 20.9 | 22.3 |
| 45 a 49 años | 10,353 | 134,251 | 144,604 | 6,531 | 63,716 | 70,247 | 48.4 | 18.1 | 19.0 | 12.9 | 9.1 | 9.3 |
| Total | 21,383 | 739,801 | 761,184 | 50,540 | 702,866 | 753,406 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Pastillas o píldoras** | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 20,896 | 72,702 | 93,598 | - | 81,952 | 81,952 | 25.4 | 10.7 | 12.3 | - | 11.3 | 10.9 |
| 25 a 29 años | - | 108,768 | 108,768 | 7,837 | 97,549 | 105,386 | - | 16.0 | 14.3 | 27.5 | 13.5 | 14.0 |
| 30 a 34 años | 16,896 | 167,359 | 184,255 | 8,868 | 167,744 | 176,612 | 20.5 | 24.7 | 24.2 | 31.1 | 23.1 | 23.4 |
| 35 a 39 años | 5,225 | 130,450 | 135,675 | 6,003 | 145,427 | 151,430 | 6.4 | 19.2 | 17.8 | 21.1 | 20.1 | 20.1 |
| 40 a 44 años | 18,723 | 75,561 | 94,284 | - | 167,779 | 167,779 | 22.8 | 11.1 | 12.4 | - | 23.1 | 22.3 |
| 45 a 49 años | 20,509 | 124,095 | 144,604 | 5,804 | 64,443 | 70,247 | 24.9 | 18.3 | 19.0 | 20.4 | 8.9 | 9.3 |
| Total | 82,250 | 678,934 | 761,184 | 28,512 | 724,894 | 753,406 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Inyecciones** | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 10,946 | 82,652 | 93,598 | 8,128 | 73,824 | 81,952 | 38.7 | 11.3 | 12.3 | 30.4 | 10.2 | 10.9 |
| 25 a 29 años | | 108,768 | 108,768 | 3,484 | 101,902 | 105,386 | | 14.8 | 14.3 | 13.0 | 14.0 | 14.0 |
| 30 a 34 años | 2,902 | 181,353 | 184,255 | 13,641 | 162,971 | 176,612 | 10.2 | 24.7 | 24.2 | 51.1 | 22.4 | 23.4 |
| 35 a 39 años | 6,097 | 129,578 | 135,675 | - | 151,430 | 151,430 | 21.5 | 17.7 | 17.8 | - | 20.8 | 20.1 |
| 40 a 44 años | 4,018 | 90,266 | 94,284 | 1,451 | 166,328 | 167,779 | 14.2 | 12.3 | 12.4 | 5.4 | 22.9 | 22.3 |
| 45 a 49 años | 4,253 | 140,251 | 144,604 | - | 70,247 | 70,247 | 15.4 | 19.1 | 19.0 | - | 9.7 | 9.3 |
| Total | 28,316 | 732,868 | 761,184 | 26,704 | 726,702 | 753,406 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Norplant** | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | | 93,598 | 93,598 | 5,286 | 76,666 | 81,952 | | 12.3 | 12.3 | 100.0 | 10.2 | 10.9 |
| 25 a 29 años | | 108,768 | 108,768 | - | 105,386 | 105,386 | | 14.3 | 14.3 | - | 14.1 | 14.0 |
| 30 a 34 años | | 184,255 | 184,255 | - | 176,612 | 176,612 | | 24.2 | 24.2 | - | 23.6 | 23.4 |
| 35 a 39 años | | 135,675 | 135,675 | - | 151,430 | 151,430 | | 17.8 | 17.8 | - | 20.2 | 20.1 |
| 40 a 44 años | | 94,284 | 94,284 | - | 167,779 | 167,779 | | 12.4 | 12.4 | - | 22.4 | 22.3 |
| 45 a 49 años | | 144,604 | 144,604 | - | 70,247 | 70,247 | | 19.0 | 19.0 | - | 9.4 | 9.3 |
| Total | | 761,184 | 761,184 | 5,286 | 748,120 | 753,406 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Dispositivo, DIU** | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 34,278 | 59,320 | 93,598 | 51,126 | 30,826 | 81,952 | 20.5 | 10.0 | 12.3 | 22.0 | 5.9 | 10.9 |
| 25 a 29 años | 46,435 | 62,333 | 108,768 | 58,427 | 46,959 | 105,386 | 27.8 | 10.5 | 14.3 | 25.1 | 9.0 | 14.0 |
| 30 a 34 años | 49,339 | 134,916 | 184,255 | 52,415 | 124,197 | 176,612 | 29.5 | 22.7 | 24.2 | 22.5 | 23.8 | 23.4 |
| 35 a 39 años | 19,445 | 116,230 | 135,675 | 30,979 | 120,451 | 151,430 | 11.6 | 19.6 | 17.8 | 13.3 | 23.1 | 20.1 |
| 40 a 44 años | 2,902 | 91,382 | 94,284 | 27,081 | 140,698 | 167,779 | 1.7 | 15.4 | 12.4 | 11.6 | 27.0 | 22.3 |
| 45 a 49 años | 14,804 | 129,800 | 144,604 | 12,601 | 57,646 | 70,247 | 8.9 | 21.9 | 19.0 | 5.4 | 11.1 | 9.3 |
| Total | 167,203 | 593,981 | 761,184 | 232,629 | 520,777 | 753,406 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Preservativo o condón** | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 47,118 | 46,480 | 93,598 | 17,994 | 63,958 | 81,952 | 20.6 | 8.7 | 12.3 | 48.1 | 8.9 | 10.9 |
| 25 a 29 años | 48,258 | 60,510 | 108,768 | 4,353 | 101,033 | 105,386 | 21.1 | 11.4 | 14.3 | 11.6 | 14.1 | 14.0 |
| 30 a 34 años | 76,495 | 107,760 | 184,255 | 8,706 | 167,906 | 176,612 | 33.5 | 20.2 | 24.2 | 23.3 | 23.5 | 23.4 |
| 35 a 39 años | 38,455 | 97,219 | 135,675 | 6,386 | 145,044 | 151,430 | 16.8 | 18.3 | 17.8 | 17.1 | 20.3 | 20.1 |
| 40 a 44 años | 6,920 | 87,364 | 94,284 | - | 167,779 | 167,779 | 3.0 | 16.4 | 12.4 | - | 23.4 | 22.3 |
| 45 a 49 años | 11,319 | 133,285 | 144,604 | - | 70,247 | 70,247 | 5.0 | 25.0 | 19.0 | - | 9.8 | 9.3 |
| Total | 228,568 | 532,618 | 761,184 | 37,439 | 715,967 | 753,406 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Óvulos, jalea o espumas** | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | - | 93,598 | 93,598 | - | 81,952 | 81,952 | - | 12.4 | 12.3 | - | 11.0 | 10.9 |
| 25 a 29 años | 4,353 | 104,415 | 108,768 | 5,269 | 100,117 | 105,386 | 60.0 | 13.8 | 14.3 | 100.0 | 13.4 | 14.0 |
| 30 a 34 años | 2,902 | 181,353 | 184,255 | - | 176,612 | 176,612 | 40.0 | 24.1 | 24.2 | - | 23.6 | 23.4 |
| 35 a 39 años | - | 135,675 | 135,675 | - | 151,430 | 151,430 | - | 18.0 | 17.8 | - | 20.2 | 20.1 |
| 40 a 44 años | - | 94,284 | 94,284 | - | 167,779 | 167,779 | - | 12.5 | 12.4 | - | 22.4 | 22.3 |
| 45 a 49 años | - | 144,604 | 144,604 | - | 70,247 | 70,247 | - | 19.2 | 19.0 | - | 9.4 | 9.3 |
| Total | 7,255 | 753,929 | 761,184 | 5,269 | 748,137 | 753,406 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billings** | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 7,637 | 85,961 | 93,598 | 2,902 | 79,050 | 81,952 | 17.2 | 12.0 | 12.3 | 12.0 | 10.8 | 10.9 |
| 25 a 29 años | 4,353 | 104,415 | 108,768 | 3,957 | 101,429 | 105,386 | 9.8 | 14.6 | 14.3 | 16.3 | 13.9 | 14.0 |
| 30 a 34 años | 14,723 | 169,532 | 184,255 | 6,027 | 170,585 | 176,612 | 33.2 | 23.6 | 24.2 | 24.9 | 23.4 | 23.4 |
| 35 a 39 años | 2,902 | 132,773 | 135,675 | 11,321 | 140,109 | 151,430 | 6.5 | 18.5 | 17.8 | 46.8 | 19.2 | 20.1 |
| 40 a 44 años | 10,404 | 83,880 | 94,284 | - | 167,779 | 167,779 | 23.4 | 11.7 | 12.4 | - | 23.0 | 22.3 |
| 45 a 49 años | 4,353 | 140,251 | 144,604 | - | 70,247 | 70,247 | 9.8 | 19.5 | 19.0 | - | 9.6 | 9.3 |
| Total | 44,382 | 716,802 | 761,184 | 24,207 | 729,199 | 753,406 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Retiro o coito interrumpido** | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | - | 93,598 | 93,598 | - | 81,952 | 81,952 | - | 12.4 | 12.3 | - | 11.0 | 10.9 |
| 25 a 29 años | 4,353 | 104,415 | 108,768 | - | 105,386 | 105,386 | 58.2 | 13.9 | 14.3 | - | 14.1 | 14.0 |
| 30 a 34 años | 3,125 | 181,130 | 184,255 | 3,125 | 173,487 | 176,612 | 41.8 | 24.0 | 24.2 | 47.3 | 23.2 | 23.4 |
| 35 a 39 años | - | 135,675 | 135,675 | 3,484 | 147,946 | 151,430 | - | 18.0 | 17.8 | 52.7 | 19.8 | 20.1 |
| 40 a 44 años | - | 94,284 | 94,284 | - | 167,779 | 167,779 | - | 12.5 | 12.4 | - | 22.5 | 22.3 |
| 45 a 49 años | - | 144,604 | 144,604 | - | 70,247 | 70,247 | - | 19.2 | 19.0 | - | 9.4 | 9.3 |
| Total | 7,478 | 753,706 | 761,184 | 6,609 | 746,797 | 753,406 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Pastilla de emergencia** | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | - | 93,598 | 93,598 | | 81,952 | 81,952 | - | 12.4 | 12.3 | | 10.9 | 10.9 |
| 25 a 29 años | 4,353 | 104,415 | 108,768 | | 105,386 | 105,386 | 60.0 | 13.8 | 14.3 | | 14.0 | 14.0 |
| 30 a 34 años | 2,902 | 181,353 | 184,255 | | 176,612 | 176,612 | 40.0 | 24.1 | 24.2 | | 23.4 | 23.4 |
| 35 a 39 años | - | 135,675 | 135,675 | | 151,430 | 151,430 | - | 18.0 | 17.8 | | 20.1 | 20.1 |
| 40 a 44 años | - | 94,284 | 94,284 | | 167,779 | 167,779 | - | 12.5 | 12.4 | | 22.3 | 22.3 |
| 45 a 49 años | - | 144,604 | 144,604 | | 70,247 | 70,247 | - | 19.2 | 19.0 | | 9.3 | 9.3 |
| Total | 7,255 | 753,929 | 761,184 | | 753,406 | 753,406 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | 100.0 |
| **Otro** | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 1,838 | 91,760 | 93,598 | - | 81,952 | 81,952 | 17.5 | 12.2 | 12.3 | - | 11.0 | 10.9 |
| 25 a 29 años | - | 108,768 | 108,768 | - | 105,386 | 105,386 | - | 14.5 | 14.3 | - | 14.1 | 14.0 |
| 30 a 34 años | 3,430 | 180,825 | 184,255 | - | 176,612 | 176,612 | 32.7 | 24.1 | 24.2 | - | 23.7 | 23.4 |
| 35 a 39 años | - | 135,675 | 135,675 | - | 151,430 | 151,430 | - | 18.1 | 17.8 | - | 20.3 | 20.1 |
| 40 a 44 años | 5,226 | 89,058 | 94,284 | - | 167,779 | 167,779 | 49.8 | 11.9 | 12.4 | - | 22.5 | 22.3 |
| 45 a 49 años | - | 144,604 | 144,604 | 8,109 | 62,138 | 70,247 | - | 19.3 | 19.0 | 100.0 | 8.3 | 9.3 |
| Total | 10,494 | 750,690 | 761,184 | 8,109 | 745,297 | 753,406 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente:Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

Distrito Federal. Proporción de Adultos de 20 a 49 años, según uso actual de algún método de planificación familiar

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ligadura | 564,257 | 32.7 |
| Vasectomia | 59,540 | 3.5 |
| Pastillas | 76,145 | 4.4 |
| Inyección | 70,420 | 4.1 |
| Norplant | 3,256 | .2 |
| Dispositivo | 479,422 | 27.8 |
| Preservativo | 257,570 | 14.9 |
| Tópicos | 899 | .1 |
| Ritmo | 138,841 | 8.1 |
| Retiro | 54,281 | 3.1 |
| Otro | 7,309 | .4 |
| No responde | 11,848 | .7 |
| Total | 1,723,788 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

Distrito Federal. Proporción de Adultos de 20 a 49 años, según uso actual de algún método de planificación familiar por grupo de edad y sexo

| Sexo | Método | Absolutos | | | | | | | Proporciones | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 a 44 años | 45 a 49 años | Total | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 a 44 años | 45 a 49 años | Total |
| HOMBRE | Ligadura | 7,975 | 7,041 | 64,315 | 52,278 | 74,538 | 56,981 | 263,128 | 8.97 | 3.55 | 43.86 | 40.05 | 55.00 | 73.32 | 33.84 |
| | Vasectomia | - | - | 7,773 | 12,972 | 8,960 | - | 29,705 | - | - | 5.30 | 9.94 | 6.61 | - | 3.82 |
| | Pastillas | 6,884 | 6,873 | - | - | 4,268 | - | 18,025 | 7.74 | 3.47 | - | - | 3.15 | - | 2.32 |
| | Inyección | 13,291 | 7,024 | - | 10,560 | - | - | 30,875 | 14.95 | 3.54 | - | 8.09 | - | - | 3.97 |
| | Dispositivo | 32,752 | 85,523 | 24,011 | 28,306 | 15,009 | - | 185,601 | 36.84 | 43.14 | 16.38 | 21.69 | 11.07 | - | 23.87 |
| | Preservativo | 28,008 | 84,839 | 17,387 | 19,104 | 4,268 | 10,939 | 164,545 | 31.50 | 42.79 | 11.86 | 14.64 | 3.15 | 14.08 | 21.16 |
| | Ritmo | - | - | 33,140 | - | 19,018 | - | 52,158 | - | - | 22.60 | - | 14.03 | - | 6.71 |
| | Retiro | - | 6,968 | - | - | 5,194 | 5,421 | 17,583 | - | 3.51 | - | - | 3.83 | 6.98 | 2.26 |
| | Otro | - | - | - | 7,309 | - | - | 7,309 | - | - | - | 5.60 | - | - | 0.94 |
| | No responde | - | - | - | - | 4,268 | 4,375 | 8,643 | - | - | - | - | 3.15 | 5.63 | 1.11 |
| | Total | 88,910 | 198,268 | 146,626 | 130,529 | 135,523 | 77,716 | 777,572 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| MUJER | Ligadura | 19,860 | 52,568 | 63,445 | 67,595 | 57,632 | 40,029 | 301,129 | 11.62 | 24.14 | 29.64 | 40.92 | 53.14 | 57.33 | 31.82 |
| | Vasectomia | 3,629 | 9,469 | 6,574 | 2,642 | 2,454 | 5,067 | 29,835 | 2.12 | 4.35 | 3.07 | 1.60 | 2.26 | 7.26 | 3.15 |
| | Pastillas | 9,642 | 13,701 | 16,904 | 7,127 | 3,878 | 6,868 | 58,120 | 5.64 | 6.29 | 7.90 | 4.31 | 3.58 | 9.84 | 6.14 |
| | Inyección | 8,200 | 26,258 | - | 2,680 | 2,407 | - | 39,545 | 4.80 | 12.06 | - | 1.62 | 2.22 | - | 4.18 |
| | Norplant | - | - | 3,256 | - | - | - | 3,256 | - | - | 1.52 | - | - | - | 0.34 |
| | Dispositivo | 79,128 | 78,204 | 76,385 | 30,402 | 18,676 | 11,026 | 293,821 | 46.29 | 35.92 | 35.68 | 18.40 | 17.22 | 15.79 | 31.05 |
| | Preservativo | 28,258 | 11,942 | 21,962 | 25,727 | 5,136 | - | 93,025 | 16.53 | 5.49 | 10.26 | 15.57 | 4.74 | - | 9.83 |
| | Tópicos | - | - | - | - | - | 899 | 899 | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.10 |
| | Ritmo | 10,825 | 13,846 | 13,707 | 26,176 | 18,278 | 3,851 | 86,683 | 6.33 | 6.36 | 6.40 | 15.85 | 16.85 | 5.52 | 9.16 |
| | Retiro | 11,405 | 8,527 | 11,845 | 2,845 | - | 2,076 | 36,698 | 6.67 | 3.92 | 5.53 | 1.72 | - | 2.97 | 3.88 |
| | No responde | - | 3,205 | - | - | - | - | 3,205 | - | 1.47 | - | - | - | - | 0.34 |
| | Total | 170,947 | 217,720 | 214,078 | 165,194 | 108,461 | 69,816 | 946,216 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de Adultos de 20 a 49 años, según método de planificación familiar utilizado**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Operación femenina o ligadura | 7,536,949 | 43.0 |
| Operación masculina o vasectomía | 542,511 | 3.1 |
| Pastillas o píldoras | 1,305,750 | 7.4 |
| Inyecciones | 1,046,684 | 6.0 |
| Norplant | 94,086 | .5 |
| Dispositivo, DIU | 3,160,532 | 18.0 |
| Preservativo o condón | 2,448,606 | 14.0 |
| Óvulos, jalea o espumas | 53,215 | .3 |
| Ritmo, calendario, abstinencia periódica, termómetro, billings | 739,630 | 4.2 |
| Retiro o coito interrumpido | 353,749 | 2.0 |
| Pastilla de emergencia | 42,462 | .2 |
| Otro | 210,388 | 1.2 |
| Total | 17,534,562 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de Adultos de 20 a 49 años, según uso actual de algún método de planificación familiar por grupos de edad y sexo**

| Método | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| Operación femenina o ligadura | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 73,495 | 733,828 | 807,323 | 112,119 | 870,159 | 982,278 | 2.35 | 16.61 | 10.70 | 2.55 | 19.42 | 11.06 |
| 25 a 29 años | 210,040 | 972,255 | 1,182,295 | 423,722 | 1,159,003 | 1,582,725 | 6.72 | 22.01 | 15.68 | 9.64 | 25.87 | 17.83 |
| 30 a 34 años | 506,055 | 1,033,722 | 1,539,777 | 868,491 | 1,014,267 | 1,882,758 | 16.20 | 23.40 | 20.42 | 19.75 | 22.64 | 21.21 |
| 35 a 39 años | 711,408 | 790,159 | 1,501,567 | 1,271,914 | 798,574 | 2,070,488 | 22.77 | 17.89 | 19.91 | 28.92 | 17.82 | 23.32 |
| 40 a 44 años | 844,179 | 532,667 | 1,376,846 | 1,107,541 | 443,778 | 1,551,319 | 27.02 | 12.06 | 18.26 | 25.19 | 9.90 | 17.47 |
| 45 a 49 años | 779,095 | 354,695 | 1,133,791 | 613,771 | 194,758 | 808,529 | 24.94 | 8.03 | 15.03 | 13.96 | 4.35 | 9.11 |
| Total | 3,124,273 | 4,417,326 | 7,541,599 | 4,397,558 | 4,480,539 | 8,878,097 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Operación masculina o vasectomía | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 7,415 | 799,908 | 807,323 | 16,431 | 965,847 | 982,278 | 3.20 | 10.94 | 10.70 | 5.28 | 11.27 | 11.06 |
| 25 a 29 años | 18,406 | 1,163,889 | 1,182,295 | 37,858 | 1,544,867 | 1,582,725 | 7.95 | 15.92 | 15.68 | 12.17 | 18.03 | 17.83 |
| 30 a 34 años | 34,694 | 1,505,083 | 1,539,777 | 65,131 | 1,817,627 | 1,882,758 | 14.99 | 20.59 | 20.42 | 20.94 | 21.22 | 21.21 |
| 35 a 39 años | 58,879 | 1,442,689 | 1,501,567 | 114,324 | 1,956,164 | 2,070,488 | 25.44 | 19.74 | 19.91 | 36.75 | 22.83 | 23.32 |
| 40 a 44 años | 79,727 | 1,298,119 | 1,376,846 | 57,933 | 1,493,386 | 1,551,319 | 34.42 | 17.76 | 18.26 | 18.63 | 17.43 | 17.47 |
| 45 a 49 años | 33,312 | 1,100,479 | 1,133,791 | 19,402 | 789,127 | 808,529 | 14.39 | 15.05 | 15.03 | 6.24 | 9.21 | 9.11 |
| Total | 231,432 | 7,310,167 | 7,541,599 | 311,079 | 8,567,018 | 8,878,097 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Pastillas o píldoras | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 99,740 | 707,583 | 807,323 | 94,086 | 888,192 | 982,278 | 14.85 | 10.30 | 10.70 | 14.84 | 10.77 | 11.06 |
| 25 a 29 años | 114,989 | 1,067,306 | 1,182,295 | 165,701 | 1,417,024 | 1,582,725 | 17.12 | 15.54 | 15.68 | 26.14 | 17.18 | 17.83 |
| 30 a 34 años | 163,255 | 1,376,522 | 1,539,777 | 157,430 | 1,725,328 | 1,882,758 | 24.30 | 20.04 | 20.42 | 24.84 | 20.93 | 21.21 |
| 35 a 39 años | 124,060 | 1,377,507 | 1,501,567 | 128,539 | 1,941,949 | 2,070,488 | 18.46 | 20.05 | 19.91 | 20.29 | 23.55 | 23.32 |
| 40 a 44 años | 99,263 | 1,277,583 | 1,376,846 | 55,565 | 1,495,754 | 1,551,319 | 14.77 | 18.60 | 18.26 | 8.77 | 18.14 | 17.47 |
| 45 a 49 años | 70,610 | 1,063,181 | 1,133,791 | 32,473 | 776,057 | 808,529 | 10.51 | 15.48 | 15.03 | 5.12 | 9.41 | 9.11 |
| Total | 671,857 | 6,869,742 | 7,541,599 | 633,893 | 8,244,204 | 8,878,097 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Inyecciones | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 95,728 | 711,595 | 807,323 | 119,519 | 862,759 | 982,278 | 19.76 | 10.08 | 10.70 | 21.26 | 10.37 | 11.06 |
| 25 a 29 años | 116,992 | 1,065,303 | 1,182,295 | 184,890 | 1,397,835 | 1,582,725 | 24.14 | 15.10 | 15.68 | 32.89 | 16.81 | 17.83 |
| 30 a 34 años | 106,854 | 1,430,923 | 1,539,777 | 134,245 | 1,748,513 | 1,882,758 | 22.49 | 20.28 | 20.42 | 23.89 | 21.03 | 21.21 |
| 35 a 39 años | 98,107 | 1,403,460 | 1,501,567 | 73,475 | 1,997,013 | 2,070,488 | 20.25 | 19.89 | 19.91 | 13.07 | 24.01 | 23.32 |
| 40 a 44 años | 37,960 | 1,338,886 | 1,376,846 | 41,230 | 1,510,089 | 1,551,319 | 7.83 | 18.97 | 18.26 | 7.33 | 18.16 | 17.47 |
| 45 a 49 años | 26,812 | 1,106,979 | 1,133,791 | 8,752 | 799,777 | 808,529 | 5.53 | 15.69 | 15.03 | 1.56 | 9.62 | 9.11 |
| Total | 484,553 | 7,057,046 | 7,541,599 | 562,131 | 8,315,966 | 8,878,097 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Norplant | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 7,956 | 799,367 | 807,323 | 13,742 | 968,536 | 982,278 | 19.89 | 10.66 | 10.70 | 25.43 | 10.98 | 11.06 |
| 25 a 29 años | 19,538 | 1,162,757 | 1,182,295 | 12,103 | 1,570,622 | 1,582,725 | 48.78 | 15.50 | 15.68 | 22.40 | 17.80 | 17.83 |
| 30 a 34 años | 6,584 | 1,533,193 | 1,539,777 | 21,987 | 1,860,771 | 1,882,758 | 16.44 | 20.44 | 20.42 | 40.69 | 21.09 | 21.21 |
| 35 a 39 años | 1,062 | 1,500,505 | 1,501,567 | 5,237 | 2,065,251 | 2,070,488 | 2.65 | 20.00 | 19.91 | 9.69 | 23.40 | 23.32 |
| 40 a 44 años | 3,653 | 1,373,243 | 1,376,846 | 963 | 1,550,357 | 1,551,319 | 9.00 | 18.31 | 18.26 | 1.78 | 17.57 | 17.47 |
| 45 a 49 años | 1,302 | 1,132,489 | 1,133,791 | - | 808,529 | 808,529 | 3.25 | 15.10 | 15.03 | - | 9.16 | 9.11 |
| Total | 40,055 | 7,501,544 | 7,541,599 | 54,031 | 8,824,066 | 8,878,097 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dispositivo, DIU | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 208,406 | 598,917 | 807,323 | 428,028 | 554,250 | 982,278 | 15.09 | 9.72 | 10.70 | 24.05 | 7.81 | 11.06 |
| 25 a 29 años | 337,040 | 845,255 | 1,182,295 | 458,351 | 1,124,374 | 1,582,725 | 24.41 | 13.72 | 15.68 | 25.75 | 15.84 | 17.83 |
| 30 a 34 años | 371,873 | 1,167,904 | 1,539,777 | 388,754 | 1,494,004 | 1,882,758 | 26.93 | 18.96 | 20.42 | 21.84 | 21.05 | 21.21 |
| 35 a 39 años | 243,371 | 1,258,196 | 1,501,567 | 297,241 | 1,773,247 | 2,070,488 | 17.63 | 20.42 | 19.91 | 16.70 | 24.98 | 23.32 |
| 40 a 44 años | 142,680 | 1,234,166 | 1,376,846 | 150,325 | 1,400,994 | 1,551,319 | 10.33 | 20.03 | 18.26 | 8.45 | 19.74 | 17.47 |
| 45 a 49 años | 77,362 | 1,056,429 | 1,133,791 | 57,104 | 751,429 | 808,529 | 5.60 | 17.15 | 15.03 | 3.21 | 10.59 | 9.11 |
| Total | 1,380,732 | 6,160,867 | 7,541,599 | 1,779,803 | 7,098,297 | 8,878,097 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Preservativo o condón | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 376,460 | 430,863 | 807,323 | 175,198 | 807,080 | 982,278 | 25.12 | 7.13 | 10.70 | 18.44 | 10.18 | 11.06 |
| 25 a 29 años | 347,049 | 835,246 | 1,182,295 | 270,275 | 1,312,450 | 1,582,725 | 23.16 | 13.82 | 15.68 | 28.45 | 16.55 | 17.83 |
| 30 a 34 años | 355,669 | 1,184,108 | 1,539,777 | 218,431 | 1,664,327 | 1,882,758 | 23.73 | 19.60 | 20.42 | 22.99 | 20.99 | 21.21 |
| 35 a 39 años | 201,562 | 1,300,005 | 1,501,567 | 149,872 | 1,920,616 | 2,070,488 | 13.45 | 21.51 | 19.91 | 15.77 | 24.23 | 23.32 |
| 40 a 44 años | 131,660 | 1,245,186 | 1,376,846 | 87,685 | 1,463,634 | 1,551,319 | 8.79 | 20.60 | 18.26 | 9.23 | 18.46 | 17.47 |
| 45 a 49 años | 85,133 | 1,047,658 | 1,133,791 | 48,672 | 759,857 | 808,529 | 5.68 | 17.34 | 15.03 | 5.12 | 9.58 | 9.11 |
| Total | 1,498,473 | 6,043,126 | 7,541,599 | 950,133 | 7,927,964 | 8,878,097 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Óvulos, jalea o espumas | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 10,971 | 796,352 | 807,323 | 3,138 | 979,140 | 982,278 | 34.43 | 10.60 | 10.70 | 14.70 | 11.06 | 11.06 |
| 25 a 29 años | 8,846 | 1,173,449 | 1,182,295 | 11,481 | 1,571,244 | 1,582,725 | 27.76 | 15.63 | 15.68 | 53.77 | 17.74 | 17.83 |
| 30 a 34 años | 4,836 | 1,534,941 | 1,539,777 | 6,127 | 1,876,631 | 1,882,758 | 15.18 | 20.44 | 20.42 | 28.69 | 21.19 | 21.21 |
| 35 a 39 años | 706 | 1,500,861 | 1,501,567 | - | 2,070,488 | 2,070,488 | 2.22 | 19.99 | 19.91 | - | 23.38 | 23.32 |
| 40 a 44 años | 4,346 | 1,372,500 | 1,376,846 | - | 1,551,319 | 1,551,319 | 13.64 | 18.28 | 18.26 | - | 17.52 | 17.47 |
| 45 a 49 años | 2,156 | 1,131,635 | 1,133,791 | 608 | 807,921 | 808,529 | 6.77 | 15.07 | 15.03 | 2.85 | 9.12 | 9.11 |
| Total | 31,861 | 7,509,738 | 7,541,599 | 21,354 | 8,856,743 | 8,878,097 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rítmo, calendario, abstinencia | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 43,032 | 764,291 | 807,323 | 38,888 | 943,390 | 982,278 | 11.01 | 10.69 | 10.70 | 11.24 | 11.06 | 11.06 |
| 25 a 29 años | 74,408 | 1,107,887 | 1,182,295 | 96,485 | 1,486,239 | 1,582,725 | 19.04 | 15.49 | 15.68 | 27.89 | 17.42 | 17.83 |
| 30 a 34 años | 79,605 | 1,460,172 | 1,539,777 | 69,564 | 1,813,194 | 1,882,758 | 20.37 | 20.42 | 20.42 | 20.10 | 21.25 | 21.21 |
| 35 a 39 años | 73,559 | 1,428,008 | 1,501,567 | 74,823 | 1,995,665 | 2,070,488 | 18.82 | 19.97 | 19.91 | 21.63 | 23.39 | 23.32 |
| 40 a 44 años | 61,822 | 1,315,024 | 1,376,846 | 51,251 | 1,500,068 | 1,551,319 | 15.82 | 18.39 | 18.26 | 14.81 | 17.58 | 17.47 |
| 45 a 49 años | 58,331 | 1,075,460 | 1,133,791 | 14,994 | 793,535 | 808,529 | 14.93 | 15.04 | 15.03 | 4.33 | 9.30 | 9.11 |
| Total | 390,757 | 7,150,842 | 7,541,599 | 346,005 | 8,532,089 | 8,878,097 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Retiro o coito interrumpido | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 28,217 | 779,106 | 807,323 | 35,705 | 946,573 | 982,278 | 15.35 | 10.59 | 10.70 | 21.01 | 10.87 | 11.06 |
| 25 a 29 años | 42,259 | 1,140,036 | 1,182,295 | 57,966 | 1,524,759 | 1,582,725 | 22.99 | 15.49 | 15.68 | 34.10 | 17.51 | 17.83 |
| 30 a 34 años | 48,512 | 1,491,265 | 1,539,777 | 35,221 | 1,847,537 | 1,882,758 | 26.40 | 20.27 | 20.42 | 20.72 | 21.21 | 21.21 |
| 35 a 39 años | 29,578 | 1,471,989 | 1,501,567 | 16,308 | 2,054,180 | 2,070,488 | 16.09 | 20.01 | 19.91 | 9.59 | 23.59 | 23.32 |
| 40 a 44 años | 19,060 | 1,357,786 | 1,376,846 | 17,298 | 1,534,021 | 1,551,319 | 10.37 | 18.45 | 18.26 | 10.18 | 17.62 | 17.47 |
| 45 a 49 años | 16,150 | 1,117,641 | 1,133,791 | 7,475 | 801,054 | 808,529 | 8.79 | 15.19 | 15.03 | 4.40 | 9.20 | 9.11 |
| Total | 183,776 | 7,357,823 | 7,541,599 | 169,973 | 8,708,124 | 8,878,097 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Pastilla de emergencia | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 7,474 | 799,849 | 807,323 | - | 982,278 | 982,278 | 29.05 | 10.64 | 10.70 | - | 11.08 | 11.06 |
| 25 a 29 años | 9,005 | 1,173,290 | 1,182,295 | 4,210 | 1,578,515 | 1,582,725 | 35.00 | 15.61 | 15.68 | 25.16 | 17.81 | 17.83 |
| 30 a 34 años | 3,850 | 1,535,927 | 1,539,777 | 10,629 | 1,872,129 | 1,882,758 | 14.97 | 20.44 | 20.42 | 63.52 | 21.13 | 21.21 |
| 35 a 39 años | 2,372 | 1,499,195 | 1,501,567 | 200 | 2,070,288 | 2,070,488 | 9.22 | 19.95 | 19.91 | 1.20 | 23.36 | 23.32 |
| 40 a 44 años | 1,960 | 1,374,886 | 1,376,846 | 1,162 | 1,550,157 | 1,551,319 | 7.73 | 18.29 | 18.26 | 6.94 | 17.49 | 17.47 |
| 45 a 49 años | 1,088 | 1,132,703 | 1,133,791 | 532 | 807,997 | 808,529 | 4.23 | 15.07 | 15.03 | 3.18 | 9.12 | 9.11 |
| Total | 25,729 | 7,515,870 | 7,541,599 | 16,733 | 8,861,364 | 8,878,097 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Otro | | | | | | | | | | | | |
| 20 a 24 años | 15,248 | 792,075 | 807,323 | 11,367 | 970,911 | 982,278 | 16.60 | 10.63 | 10.70 | 9.80 | 11.08 | 11.06 |
| 25 a 29 años | 14,249 | 1,168,046 | 1,182,295 | 20,411 | 1,562,314 | 1,582,725 | 15.51 | 15.68 | 15.68 | 17.61 | 17.83 | 17.83 |
| 30 a 34 años | 13,931 | 1,525,846 | 1,539,777 | 24,127 | 1,858,631 | 1,882,758 | 15.16 | 20.48 | 20.42 | 20.81 | 21.21 | 21.21 |
| 35 a 39 años | 11,525 | 1,490,042 | 1,501,567 | 19,044 | 2,051,444 | 2,070,488 | 12.55 | 20.00 | 19.91 | 16.43 | 23.41 | 23.32 |
| 40 a 44 años | 25,098 | 1,351,748 | 1,376,846 | 17,527 | 1,533,792 | 1,551,319 | 27.32 | 18.14 | 18.26 | 15.12 | 17.50 | 17.47 |
| 45 a 49 años | 11,815 | 1,121,976 | 1,133,791 | 23,458 | 785,071 | 808,529 | 12.86 | 15.06 | 15.03 | 20.23 | 8.96 | 9.11 |
| Total | 91,866 | 7,449,733 | 7,541,599 | 115,934 | 8,762,163 | 8,878,097 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Proporción de Adultos de 20 a 49 años, según uso actual de algún método de planificación familiar**

| Método | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ligadura | 4,951,219 | 28.2 |
| Vasectomia | 359,251 | 2.0 |
| Pastillas | 1,902,247 | 10.8 |
| Inyección | 1,233,957 | 7.0 |
| Norplant | 28,580 | .2 |
| Dispositivo | 4,078,414 | 23.2 |
| Preservativo | 1,942,928 | 11.1 |
| Tópicos | 36,202 | .2 |
| Ritmo | 1,258,378 | 7.2 |
| Retiro | 722,214 | 4.1 |
| Otro | 480,588 | 2.7 |
| No responde | 588,286 | 3.3 |
| Total | 17,582,264 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Proporción de Adultos de 20 a 49 años, según uso actual de algún método de planificación familiar por grupo de edad y sexo**

| Sexo | Método | Absolutos | | | | | | | Proporciones | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 a 44 años | 45 a 49 años | Total | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 a 44 años | 45 a 49 años | Total |
| Hombre | Ligadura | 43,016 | 164,738 | 422,976 | 558,618 | 506,301 | 426,980 | 2,122,629 | 3.6 | 10.1 | 24.6 | 36.0 | 42.6 | 52.2 | 26.2 |
| | Vasectomia | 7,340 | 15,574 | 38,002 | 61,280 | 50,067 | 21,263 | 193,526 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 4.0 | 4.2 | 2.6 | 2.4 |
| | Pastillas | 160,045 | 233,203 | 203,210 | 141,243 | 108,348 | 48,804 | 894,853 | 13.4 | 14.3 | 11.8 | 9.1 | 9.1 | 6.0 | 11.1 |
| | Inyección | 120,049 | 153,998 | 105,879 | 84,011 | 27,927 | 20,833 | 512,697 | 10.1 | 9.4 | 6.2 | 5.4 | 2.4 | 2.5 | 6.3 |
| | Norplant | 3,946 | 3,278 | 2,850 | - | 677 | - | 10,751 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 |
| | Dispositivo | 325,273 | 492,590 | 386,072 | 231,164 | 160,170 | 51,584 | 1,646,853 | 27.3 | 30.2 | 22.5 | 14.9 | 13.5 | 6.3 | 20.3 |
| | Preservativo | 327,606 | 308,518 | 189,119 | 183,783 | 86,890 | 63,102 | 1,159,018 | 27.5 | 18.9 | 11.0 | 11.9 | 7.3 | 7.7 | 14.3 |
| | Tópicos | - | 10,545 | 331 | 966 | 4,275 | 5,078 | 21,195 | - | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
| | Ritmo | 70,516 | 75,094 | 195,650 | 115,564 | 96,281 | 49,130 | 602,235 | 5.9 | 4.6 | 11.4 | 7.5 | 8.1 | 6.0 | 7.4 |
| | Retiro | 52,235 | 91,583 | 79,876 | 42,441 | 63,071 | 20,239 | 349,445 | 4.4 | 5.6 | 4.7 | 2.7 | 5.3 | 2.5 | 4.3 |
| | Otro | 31,111 | 38,803 | 30,078 | 57,011 | 25,600 | 25,956 | 208,559 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 3.7 | 2.2 | 3.2 | 2.6 |
| | No responde | 51,266 | 43,904 | 63,579 | 74,206 | 58,327 | 85,144 | 376,426 | 4.3 | 2.7 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 10.4 | 4.6 |
| | Total | 1,192,403 | 1,631,828 | 1,717,622 | 1,550,287 | 1,187,934 | 818,113 | 8,098,187 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mujer | Ligadura | 118,462 | 381,932 | 617,039 | 710,961 | 602,619 | 389,546 | 2,820,559 | 5.8 | 17.8 | 32.2 | 46.1 | 54.2 | 60.2 | 29.9 |
| | Vasectomia | 12,329 | 38,045 | 52,698 | 28,084 | 19,000 | 9,439 | 159,595 | 0.6 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
| | Pastillas | 256,810 | 270,374 | 209,420 | 149,823 | 92,102 | 23,617 | 1,002,146 | 12.5 | 12.6 | 10.9 | 9.7 | 8.3 | 3.7 | 10.6 |
| | Inyección | 245,603 | 220,049 | 128,896 | 66,820 | 39,957 | 17,160 | 718,485 | 11.9 | 10.2 | 6.7 | 4.3 | 3.6 | 2.7 | 7.6 |
| | Norplant | 8,521 | 2,588 | 5,268 | 453 | 999 | - | 17,829 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | - | 0.2 |
| | Dispositivo | 839,565 | 687,886 | 484,418 | 239,544 | 114,581 | 53,372 | 2,419,366 | 40.8 | 32.0 | 25.3 | 15.5 | 10.3 | 8.3 | 25.7 |
| | Preservativo | 243,677 | 212,460 | 140,391 | 110,780 | 45,835 | 28,588 | 781,731 | 11.8 | 9.9 | 7.3 | 7.2 | 4.1 | 4.4 | 8.3 |
| | Tópicos | 4,628 | 430 | 1,952 | 2,262 | 3,185 | 2,550 | 15,007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| | Ritmo | 135,318 | 156,117 | 128,302 | 118,535 | 82,850 | 35,021 | 656,143 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 7.7 | 7.5 | 5.4 | 7.0 |
| | Retiro | 87,701 | 104,506 | 61,190 | 56,545 | 41,338 | 21,144 | 372,424 | 4.3 | 4.9 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 4.0 |
| | Otro | 56,620 | 47,011 | 53,764 | 27,914 | 40,037 | 43,039 | 268,385 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 6.7 | 2.8 |
| | No responde | 47,824 | 29,846 | 34,915 | 31,599 | 28,336 | 23,132 | 195,652 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 3.6 | 2.1 |
| | Total | 2,057,058 | 2,151,244 | 1,918,253 | 1,543,320 | 1,110,839 | 646,608 | 9,427,322 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según tabaquismo actual**

| Tabaquismo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 2,438,216 | 40.9 |
| No | 1,045,905 | 17.6 |
| Nunca ha fumado | 2,472,549 | 41.5 |
| Total | 5,956,670 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según tabaquismo actual, por grupo de edad y sexo**

| Grrupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Sí | No | Nunca ha fumado | Total | Sí | No | Nunca ha fumado | Total | Sí | No | Nunca ha fumado | Total | Sí | No | Nunca ha fumado | Total |
| 20 a 24 años | 191,584 | 71,364 | 98,188 | 361,136 | 137,547 | 40,368 | 234,372 | 412,287 | 12.35 | 13.90 | 13.41 | 12.91 | 15.50 | 7.58 | 13.47 | 13.05 |
| 25 a 29 años | 160,566 | 96,537 | 100,052 | 357,155 | 102,925 | 86,531 | 180,193 | 369,649 | 10.35 | 18.81 | 13.66 | 12.77 | 11.60 | 16.25 | 10.35 | 11.70 |
| 30 a 34 años | 179,106 | 70,258 | 88,194 | 337,558 | 112,256 | 82,158 | 241,782 | 436,196 | 11.55 | 13.69 | 12.04 | 12.07 | 12.65 | 15.42 | 13.89 | 13.80 |
| 35 a 39 años | 193,227 | 56,706 | 62,150 | 312,083 | 96,281 | 44,939 | 164,398 | 305,618 | 12.46 | 11.05 | 8.49 | 11.16 | 10.85 | 8.44 | 9.45 | 9.67 |
| 40 a 44 años | 107,475 | 46,613 | 68,573 | 222,661 | 121,745 | 38,311 | 134,517 | 294,573 | 6.93 | 9.08 | 9.36 | 7.96 | 13.72 | 7.19 | 7.73 | 9.32 |
| 45 a 49 años | 200,508 | 38,514 | 61,860 | 300,882 | 78,819 | 46,180 | 126,044 | 251,043 | 12.93 | 7.50 | 8.45 | 10.76 | 8.88 | 8.67 | 7.24 | 7.94 |
| 50 a 54 años | 142,679 | 40,058 | 67,425 | 250,162 | 84,602 | 53,984 | 132,188 | 270,774 | 9.20 | 7.80 | 9.21 | 8.95 | 9.53 | 10.13 | 7.60 | 8.57 |
| 55 a 59 años | 153,941 | 20,128 | 54,534 | 228,603 | 40,289 | 32,688 | 105,888 | 178,865 | 9.93 | 3.92 | 7.45 | 8.18 | 4.54 | 6.14 | 6.08 | 5.66 |
| 60 a 64 años | 63,580 | 5,804 | 42,720 | 112,104 | 26,620 | 7,837 | 81,752 | 116,209 | 4.10 | 1.13 | 5.83 | 4.01 | 3.00 | 1.47 | 4.70 | 3.68 |
| 65 a 69 años | 47,765 | 22,351 | 44,767 | 114,883 | 20,028 | 28,737 | 122,581 | 171,346 | 3.08 | 4.35 | 6.11 | 4.11 | 2.26 | 5.39 | 7.04 | 5.42 |
| 70 a 74 años | 50,595 | 14,805 | 9,986 | 75,386 | 17,703 | 39,041 | 92,734 | 149,478 | 3.26 | 2.88 | 1.36 | 2.70 | 1.99 | 7.33 | 5.33 | 4.73 |
| 75 a 79 años | 26,377 | 18,495 | 14,845 | 59,717 | 25,876 | 13,597 | 62,404 | 101,877 | 1.70 | 3.60 | 2.03 | 2.14 | 2.92 | 2.55 | 3.59 | 3.22 |
| 80 y más | 33,382 | 11,612 | 18,960 | 63,954 | 22,740 | 18,289 | 61,442 | 102,471 | 2.15 | 2.26 | 2.59 | 2.29 | 2.56 | 3.43 | 3.53 | 3.24 |
| Total | 1,550,785 | 513,245 | 732,254 | 2,796,284 | 887,431 | 532,660 | 1,740,295 | 3,160,386 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según tabaquismo actual**

| Consumo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nunca | 1,323,193 | 27.0 |
| Sí | 2,123,928 | 43.4 |
| No | 1,448,494 | 29.6 |
| Total | 4,895,615 | 100.0 |

Fuente:Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según tabaquismo actual, por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Nunca | Sí | No | Total | Nunca | Sí | No | Total | Nunca | Sí | No | Total | Nunca | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 45,169 | 228,426 | 103,256 | 376,851 | 170,195 | 128,647 | 182,636 | 481,478 | 15.13 | 17.39 | 18.99 | 17.48 | 16.61 | 15.88 | 20.19 | 17.57 |
| 25 a 29 años | 55,329 | 197,033 | 96,952 | 349,314 | 138,557 | 121,337 | 152,580 | 412,474 | 18.54 | 15.00 | 17.83 | 16.20 | 13.52 | 14.97 | 16.86 | 15.05 |
| 30 a 34 años | 19,796 | 180,327 | 98,863 | 298,986 | 117,274 | 128,301 | 122,121 | 367,696 | 6.63 | 13.73 | 18.18 | 13.87 | 11.44 | 15.83 | 13.50 | 13.42 |
| 35 a 39 años | 42,877 | 130,627 | 68,918 | 242,422 | 97,098 | 140,334 | 99,116 | 336,548 | 14.37 | 9.94 | 12.68 | 11.25 | 9.48 | 17.32 | 10.95 | 12.28 |
| 40 a 44 años | 4,921 | 174,449 | 40,558 | 219,928 | 98,340 | 87,948 | 71,381 | 257,669 | 1.65 | 13.28 | 7.46 | 10.20 | 9.60 | 10.85 | 7.89 | 9.40 |
| 45 a 49 años | - | 119,810 | 42,151 | 161,961 | 65,570 | 52,503 | 97,554 | 215,627 | - | 9.12 | 7.75 | 7.51 | 6.40 | 6.48 | 10.78 | 7.87 |
| 50 a 54 años | 34,311 | 93,239 | 19,624 | 147,174 | 60,823 | 64,673 | 48,262 | 173,758 | 11.50 | 7.10 | 3.61 | 6.83 | 5.94 | 7.98 | 5.33 | 6.34 |
| 55 a 59 años | 26,192 | 65,725 | 6,769 | 98,686 | 54,278 | 34,882 | 37,004 | 126,164 | 8.78 | 5.00 | 1.25 | 4.58 | 5.30 | 4.30 | 4.09 | 4.60 |
| 60 a 64 años | 25,648 | 44,341 | 16,392 | 86,381 | 71,295 | 12,218 | 23,529 | 107,042 | 8.59 | 3.38 | 3.01 | 4.01 | 6.96 | 1.51 | 2.60 | 3.91 |
| 65 a 69 años | 16,159 | 27,905 | 17,853 | 61,917 | 48,336 | 18,448 | 25,806 | 92,590 | 5.41 | 2.12 | 3.28 | 2.87 | 4.72 | 2.28 | 2.85 | 3.38 |
| 70 a 74 años | 19,593 | 19,632 | 11,880 | 51,105 | 43,560 | 8,363 | 17,750 | 69,673 | 6.56 | 1.49 | 2.19 | 2.37 | 4.25 | 1.03 | 1.96 | 2.54 |
| 75 a 79 años | 4,947 | 11,169 | 13,266 | 29,382 | 26,253 | 4,106 | 12,064 | 42,423 | 1.66 | 0.85 | 2.44 | 1.36 | 2.56 | 0.51 | 1.33 | 1.55 |
| 80 y más | 3,517 | 20,928 | 7,212 | 31,657 | 33,155 | 8,557 | 14,997 | 56,709 | 1.18 | 1.59 | 1.33 | 1.47 | 3.24 | 1.06 | 1.66 | 2.07 |
| Total | 298,459 | 1,313,611 | 543,694 | 2,155,764 | 1,024,734 | 810,317 | 904,800 | 2,739,851 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según tabaquismo actual**

| Tabaquismo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 17,801,757 | 29.7 |
| No | 7,714,391 | 12.9 |
| Nunca ha fumado | 34,406,106 | 57.4 |
| Total | 59,922,254 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según tabaquismo actual, por grupo de edad y sexo**

| Grrupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Sí | No | Nunca ha fumado | Total | Sí | No | Nunca ha fumado | Total | Sí | No | Nunca ha fumado | Total | Sí | No | Nunca ha fumado | Total |
| 20 a 24 años | 1,629,714 | 590,217 | 1,597,134 | 3,817,065 | 801,129 | 560,235 | 3,008,591 | 4,369,955 | 12.83 | 14.43 | 15.45 | 14.07 | 15.71 | 15.45 | 12.50 | 13.32 |
| 25 a 29 años | 1,477,315 | 542,656 | 1,307,857 | 3,327,828 | 572,725 | 472,249 | 2,974,043 | 4,019,017 | 11.63 | 13.27 | 12.65 | 12.27 | 11.23 | 13.03 | 12.36 | 12.25 |
| 30 a 34 años | 1,465,203 | 545,285 | 1,264,087 | 3,274,575 | 526,718 | 491,561 | 3,064,323 | 4,082,602 | 11.54 | 13.33 | 12.23 | 12.07 | 10.33 | 13.56 | 12.73 | 12.45 |
| 35 a 39 años | 1,444,072 | 497,720 | 1,101,036 | 3,042,828 | 610,055 | 487,104 | 3,004,239 | 4,101,398 | 11.37 | 12.17 | 10.65 | 11.22 | 11.96 | 13.44 | 12.48 | 12.51 |
| 40 a 44 años | 1,274,776 | 427,766 | 1,110,736 | 2,813,278 | 612,497 | 411,588 | 2,590,546 | 3,614,631 | 10.04 | 10.46 | 10.75 | 10.37 | 12.01 | 11.35 | 10.76 | 11.02 |
| 45 a 49 años | 1,237,143 | 341,985 | 916,002 | 2,495,130 | 478,144 | 298,521 | 2,057,847 | 2,834,512 | 9.74 | 8.36 | 8.86 | 9.20 | 9.37 | 8.24 | 8.55 | 8.64 |
| 50 a 54 años | 1,013,555 | 332,271 | 749,329 | 2,095,155 | 494,866 | 280,278 | 1,638,729 | 2,413,873 | 7.98 | 8.13 | 7.25 | 7.72 | 9.70 | 7.73 | 6.81 | 7.36 |
| 55 a 59 años | 950,030 | 214,808 | 566,139 | 1,730,977 | 250,885 | 164,486 | 1,392,719 | 1,808,090 | 7.48 | 5.25 | 5.48 | 6.38 | 4.92 | 4.54 | 5.79 | 5.51 |
| 60 a 64 años | 678,505 | 187,141 | 485,573 | 1,351,219 | 203,522 | 142,758 | 1,277,866 | 1,624,146 | 5.34 | 4.58 | 4.70 | 4.98 | 3.99 | 3.94 | 5.31 | 4.95 |
| 65 a 69 años | 525,846 | 136,212 | 437,867 | 1,099,925 | 160,852 | 102,114 | 994,316 | 1,257,282 | 4.14 | 3.33 | 4.24 | 4.05 | 3.15 | 2.82 | 4.13 | 3.83 |
| 70 a 74 años | 430,191 | 120,677 | 353,981 | 904,849 | 146,891 | 105,260 | 729,197 | 981,348 | 3.39 | 2.95 | 3.42 | 3.34 | 2.88 | 2.90 | 3.03 | 2.99 |
| 75 a 79 años | 289,293 | 79,228 | 209,730 | 578,251 | 111,049 | 55,593 | 606,184 | 772,826 | 2.28 | 1.94 | 2.03 | 2.13 | 2.18 | 1.53 | 2.52 | 2.36 |
| 80 y más | 285,885 | 73,461 | 235,930 | 595,276 | 130,896 | 53,217 | 732,105 | 916,218 | 2.25 | 1.80 | 2.28 | 2.19 | 2.57 | 1.47 | 3.04 | 2.79 |
| Total | 12,701,528 | 4,089,427 | 10,335,401 | 27,126,356 | 5,100,229 | 3,624,964 | 24,070,705 | 32,795,898 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según tabaquismo actual**

| Consumo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nunca | 15,450,183 | 31.1 |
| Sí | 17,972,550 | 36.1 |
| No | 16,298,675 | 32.8 |
| No responde | 2,053 | .0 |
| Total | 49,723,461 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 20

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según tabaquismo actual, por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | | MUJER | | | | | HOMBRE | | | | | MUJER | | | | |
| | Nunca | Sí | No | No responde | Total | Nunca | Sí | No | No responde | Total | Nunca | Sí | No | No responde | Total | Nunca | Sí | No | No responde | Total |
| 20 a 24 años | 717,506 | 2,151,087 | 1,524,601 | - | 4,393,194 | 2,211,505 | 749,098 | 2,111,823 | - | 5,072,426 | 20.1 | 16.0 | 23.9 | - | 18.8 | 18.6 | 16.5 | 21.3 | - | 19.3 |
| 25 a 29 años | 582,474 | 2,034,504 | 1,039,779 | - | 3,656,757 | 1,903,676 | 558,860 | 1,682,855 | - | 4,145,391 | 16.3 | 15.1 | 16.3 | - | 15.6 | 16.0 | 12.3 | 17.0 | - | 15.7 |
| 30 a 34 años | 489,471 | 1,707,159 | 964,860 | - | 3,161,490 | 1,613,988 | 637,890 | 1,335,236 | - | 3,587,114 | 13.7 | 12.7 | 15.1 | - | 13.5 | 13.6 | 14.1 | 13.5 | - | 13.6 |
| 35 a 39 años | 431,589 | 1,648,768 | 727,670 | - | 2,808,027 | 1,290,448 | 637,278 | 1,254,775 | - | 3,182,501 | 12.1 | 12.3 | 11.4 | - | 12.0 | 10.9 | 14.1 | 12.7 | - | 12.1 |
| 40 a 44 años | 264,372 | 1,310,331 | 603,795 | - | 2,178,498 | 1,039,658 | 493,581 | 839,991 | - | 2,373,230 | 7.4 | 9.8 | 9.5 | - | 9.3 | 8.8 | 10.9 | 8.5 | - | 9.0 |
| 45 a 49 años | 233,932 | 1,191,580 | 353,329 | - | 1,778,841 | 844,372 | 358,967 | 738,983 | - | 1,942,322 | 6.5 | 8.9 | 5.5 | - | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 7.5 | - | 7.4 |
| 50 a 54 años | 218,074 | 909,797 | 319,239 | - | 1,447,110 | 705,429 | 328,845 | 515,965 | - | 1,550,239 | 6.1 | 6.8 | 5.0 | - | 6.2 | 5.9 | 7.3 | 5.2 | - | 5.9 |
| 55 a 59 años | 166,448 | 714,710 | 227,405 | 1,746 | 1,110,309 | 550,304 | 213,194 | 433,744 | - | 1,197,242 | 4.7 | 5.3 | 3.6 | 100.0 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | - | 4.5 |
| 60 a 64 años | 160,470 | 583,986 | 205,737 | - | 950,193 | 531,870 | 196,891 | 323,549 | 307 | 1,052,617 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | - | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 3.3 | 100.0 | 4.0 |
| 65 a 69 años | 111,938 | 436,396 | 144,160 | - | 692,494 | 421,849 | 131,728 | 235,570 | - | 789,147 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | - | 3.0 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | - | 3.0 |
| 70 a 74 años | 83,711 | 325,586 | 126,725 | - | 536,022 | 309,734 | 106,296 | 164,734 | - | 580,764 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | - | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | - | 2.2 |
| 75 a 79 años | 53,511 | 206,988 | 65,839 | - | 326,338 | 186,151 | 57,838 | 115,191 | - | 359,180 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | - | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | - | 1.4 |
| 80 y más | 60,778 | 217,470 | 76,542 | - | 354,790 | 266,925 | 63,722 | 166,578 | - | 497,225 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | - | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | - | 1.9 |
| Total | 3,574,274 | 13,438,362 | 6,379,681 | 1,746 | 23,394,063 | 11,875,909 | 4,534,188 | 9,918,994 | 307 | 26,329,398 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según consumo de alcohol**

| Alcoholismo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nunca ha tomado | 2,391,740 | 40.2 |
| Sí | 2,296,452 | 38.6 |
| No | 1,268,478 | 21.3 |
| Total | 5,956,670 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según consumo de alcohol, por grupo de edad y sexo**

| Grrupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Nunca ha tomado | Sí | No | Total | Nunca ha tomado | Sí | No | Total | Nunca ha tomado | Sí | No | Total | Nunca ha tomado | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 84,450 | 191,099 | 85,587 | 361,136 | 186,824 | 149,772 | 75,691 | 412,287 | 14.5 | 12.9 | 11.7 | 12.9 | 10.3 | 18.5 | 14.1 | 13.0 |
| 25 a 29 años | 48,689 | 252,142 | 56,324 | 357,155 | 155,269 | 126,693 | 87,687 | 369,649 | 8.4 | 17.0 | 7.7 | 12.8 | 8.6 | 15.6 | 16.3 | 11.7 |
| 30 a 34 años | 64,136 | 177,298 | 96,124 | 337,558 | 252,645 | 150,751 | 32,800 | 436,196 | 11.0 | 11.9 | 13.2 | 12.1 | 13.9 | 18.6 | 6.1 | 13.8 |
| 35 a 39 años | 62,646 | 137,652 | 111,785 | 312,083 | 137,392 | 90,727 | 77,499 | 305,618 | 10.8 | 9.3 | 15.3 | 11.2 | 7.6 | 11.2 | 14.4 | 9.7 |
| 40 a 44 años | 53,749 | 123,420 | 45,492 | 222,661 | 148,072 | 67,432 | 79,069 | 294,573 | 9.3 | 8.3 | 6.2 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 14.7 | 9.3 |
| 45 a 49 años | 54,051 | 188,751 | 58,080 | 300,882 | 172,247 | 54,231 | 24,565 | 251,043 | 9.3 | 12.7 | 7.9 | 10.8 | 9.5 | 6.7 | 4.6 | 7.9 |
| 50 a 54 años | 64,954 | 149,941 | 35,267 | 250,162 | 164,514 | 65,503 | 40,757 | 270,774 | 11.2 | 10.1 | 4.8 | 8.9 | 9.1 | 8.1 | 7.6 | 8.6 |
| 55 a 59 años | 47,162 | 97,731 | 83,710 | 228,603 | 115,514 | 35,406 | 27,945 | 178,865 | 8.1 | 6.6 | 11.5 | 8.2 | 6.4 | 4.4 | 5.2 | 5.7 |
| 60 a 64 años | 15,046 | 62,897 | 34,161 | 112,104 | 70,434 | 24,874 | 20,901 | 116,209 | 2.6 | 4.2 | 4.7 | 4.0 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.7 |
| 65 a 69 años | 34,162 | 44,413 | 36,308 | 114,883 | 131,866 | 19,160 | 20,320 | 171,346 | 5.9 | 3.0 | 5.0 | 4.1 | 7.3 | 2.4 | 3.8 | 5.4 |
| 70 a 74 años | 1,451 | 38,090 | 35,845 | 75,386 | 113,490 | 17,412 | 18,576 | 149,478 | 0.2 | 2.6 | 4.9 | 2.7 | 6.3 | 2.1 | 3.5 | 4.7 |
| 75 a 79 años | 16,472 | 10,739 | 32,506 | 59,717 | 85,749 | 7,837 | 8,291 | 101,877 | 2.8 | 0.7 | 4.4 | 2.1 | 4.7 | 1.0 | 1.5 | 3.2 |
| 80 y más | 33,475 | 11,030 | 19,449 | 63,954 | 77,281 | 1,451 | 23,739 | 102,471 | 5.8 | 0.7 | 2.7 | 2.3 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 3.2 |
| Total | 580,443 | 1,485,203 | 730,638 | 2,796,284 | 1,811,297 | 811,249 | 537,840 | 3,160,386 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según consumo de alcohol**

| Consumo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 2,196,224 | 65.4 |
| No | 1,161,161 | 34.6 |
| No responde | 2,642 | .1 |
| Total | 3,360,027 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según consumo de alcohol, por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | Proporciones | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | MUJER | | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | No responde | Total | Sí | No | Total | Sí | No | responde | Total |
| 20 a 24 años | 205,491 | 104,108 | 309,599 | 136,496 | 132,196 | - | 268,692 | 16.3 | 17.7 | 16.8 | 14.6 | 23.0 | - | 17.7 |
| 25 a 29 años | 188,447 | 88,562 | 277,009 | 126,203 | 92,989 | - | 219,192 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 13.5 | 16.2 | - | 14.5 |
| 30 a 34 años | 188,822 | 89,462 | 278,284 | 138,761 | 69,934 | - | 208,695 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 12.2 | - | 13.8 |
| 35 a 39 años | 138,288 | 79,629 | 217,917 | 135,497 | 77,006 | 2,642 | 215,145 | 11.0 | 13.6 | 11.8 | 14.5 | 13.4 | 100.0 | 14.2 |
| 40 a 44 años | 183,685 | 31,322 | 215,007 | 99,774 | 45,545 | - | 145,319 | 14.6 | 5.3 | 11.6 | 10.6 | 7.9 | - | 9.6 |
| 45 a 49 años | 104,853 | 53,162 | 158,015 | 71,626 | 47,432 | - | 119,058 | 8.3 | 9.1 | 8.6 | 7.6 | 8.3 | - | 7.9 |
| 50 a 54 años | 76,962 | 23,384 | 100,346 | 88,105 | 41,704 | - | 129,809 | 6.1 | 4.0 | 5.4 | 9.4 | 7.3 | - | 8.6 |
| 55 a 59 años | 71,743 | 13,761 | 85,504 | 39,412 | 20,036 | - | 59,448 | 5.7 | 2.3 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | - | 3.9 |
| 60 a 64 años | 45,720 | 23,380 | 69,100 | 40,955 | 10,468 | - | 51,423 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 1.8 | - | 3.4 |
| 65 a 69 años | 12,976 | 33,370 | 46,346 | 31,208 | 11,900 | - | 43,108 | 1.0 | 5.7 | 2.5 | 3.3 | 2.1 | - | 2.8 |
| 70 a 74 años | 15,807 | 29,217 | 45,024 | 14,463 | 5,947 | - | 20,410 | 1.3 | 5.0 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | - | 1.3 |
| 75 a 79 años | 13,001 | 7,360 | 20,361 | 5,751 | 5,160 | - | 10,911 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | - | 0.7 |
| 80 y más | 13,174 | 10,059 | 23,233 | 9,004 | 14,068 | - | 23,072 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | - | 1.5 |
| Total | 1,258,969 | 586,776 | 1,845,745 | 937,255 | 574,385 | 2,642 | 1,514,282 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según consumo de alcohol**

| Alcoholismo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nunca ha tomado | 30,388,916 | 50.7 |
| Sí | 20,460,034 | 34.1 |
| No | 9,073,304 | 15.1 |
| Total | 59,922,254 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según consumo de alcohol, por grupo de edad y sexo**

| Grrupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Nunca ha tomado | Sí | No | Total | Nunca ha tomado | Sí | No | Total | Nunca ha tomado | Sí | No | Total | Nunca ha tomado | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 1,179,604 | 2,180,943 | 456,518 | 3,817,065 | 2,769,425 | 1,128,956 | 471,574 | 4,369,955 | 16.9 | 15.1 | 8.0 | 14.1 | 11.8 | 18.6 | 14.1 | 13.3 |
| 25 a 29 años | 882,311 | 1,896,851 | 548,666 | 3,327,828 | 2,829,646 | 802,411 | 386,960 | 4,019,017 | 12.6 | 13.2 | 9.6 | 12.3 | 12.1 | 13.2 | 11.6 | 12.3 |
| 30 a 34 años | 819,142 | 1,818,419 | 637,014 | 3,274,575 | 2,850,792 | 866,677 | 365,133 | 4,082,602 | 11.7 | 12.6 | 11.1 | 12.1 | 12.2 | 14.3 | 11.0 | 12.4 |
| 35 a 39 años | 699,762 | 1,779,342 | 563,724 | 3,042,828 | 2,783,112 | 877,292 | 440,994 | 4,101,398 | 10.0 | 12.4 | 9.8 | 11.2 | 11.9 | 14.5 | 13.2 | 12.5 |
| 40 a 44 años | 628,930 | 1,596,268 | 588,080 | 2,813,278 | 2,531,708 | 678,407 | 404,516 | 3,614,631 | 9.0 | 11.1 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 12.1 | 11.0 |
| 45 a 49 años | 553,068 | 1,402,184 | 539,878 | 2,495,130 | 2,035,324 | 500,738 | 298,450 | 2,834,512 | 7.9 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 9.0 | 8.6 |
| 50 a 54 años | 480,641 | 1,115,420 | 499,094 | 2,095,155 | 1,724,736 | 393,084 | 296,053 | 2,413,873 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 7.7 | 7.4 | 6.5 | 8.9 | 7.4 |
| 55 a 59 años | 388,402 | 930,428 | 412,147 | 1,730,977 | 1,368,497 | 240,533 | 199,060 | 1,808,090 | 5.6 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 4.0 | 6.0 | 5.5 |
| 60 a 64 años | 334,158 | 627,887 | 389,174 | 1,351,219 | 1,286,202 | 191,782 | 146,162 | 1,624,146 | 4.8 | 4.4 | 6.8 | 5.0 | 5.5 | 3.2 | 4.4 | 5.0 |
| 65 a 69 años | 349,661 | 435,182 | 315,082 | 1,099,925 | 1,001,285 | 145,682 | 110,315 | 1,257,282 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 4.1 | 4.3 | 2.4 | 3.3 | 3.8 |
| 70 a 74 años | 260,990 | 297,379 | 346,480 | 904,849 | 799,789 | 99,263 | 82,296 | 981,348 | 3.7 | 2.1 | 6.0 | 3.3 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 3.0 |
| 75 a 79 años | 168,537 | 174,158 | 235,556 | 578,251 | 648,035 | 65,993 | 58,798 | 772,826 | 2.4 | 1.2 | 4.1 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 2.4 |
| 80 y más | 242,404 | 145,241 | 207,631 | 595,276 | 772,755 | 69,514 | 73,949 | 916,218 | 3.5 | 1.0 | 3.6 | 2.2 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | 2.8 |
| Total | 6,987,610 | 14,399,702 | 5,739,044 | 27,126,356 | 23,401,306 | 6,060,332 | 3,334,260 | 32,795,898 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según consumo de alcohol**

| Consumo | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nunca | 168 | .0 |
| Sí | 20,479,395 | 65.9 |
| No | 10,585,877 | 34.1 |
| No sabe | 763 | .0 |
| No responde | 20,582 | .1 |
| Total | 31,086,785 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 20 años o más, según consumo de alcohol, por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | | MUJER | | | | | HOMBRE | | | | | MUJER | | | | |
| | Sí | No | No sabe | No responde | Total | Nunca | Sí | No | No responde | Total | Sí | No | No sabe | responde | Total | Nunca | Sí | No | responde | Total |
| 20 a 24 años | 2,573,312 | 934,021 | - | - | 3,507,333 | - | 1,238,487 | 973,112 | - | 2,211,599 | 18.4 | 15.2 | - | - | 17.4 | - | 19.0 | 22.0 | - | 20.2 |
| 25 a 29 años | 2,417,835 | 732,767 | - | - | 3,150,602 | - | 998,445 | 712,355 | 972 | 1,711,772 | 17.3 | 11.9 | - | - | 15.6 | - | 15.3 | 16.1 | 8.7 | 15.6 |
| 30 a 34 años | 2,048,392 | 695,431 | - | - | 2,743,823 | 168 | 950,035 | 590,591 | 2,672 | 1,543,466 | 14.7 | 11.3 | - | - | 13.6 | 100.0 | 14.6 | 13.3 | 23.8 | 14.1 |
| 35 a 39 años | 1,842,875 | 651,521 | - | 3,087 | 2,497,483 | - | 948,840 | 501,353 | 2,642 | 1,452,835 | 13.2 | 10.6 | - | 32.9 | 12.4 | - | 14.6 | 11.3 | 23.6 | 13.3 |
| 40 a 44 años | 1,444,709 | 535,264 | - | 788 | 1,980,761 | - | 673,427 | 350,089 | 819 | 1,024,335 | 10.3 | 8.7 | - | 8.4 | 9.8 | - | 10.3 | 7.9 | 7.3 | 9.4 |
| 45 a 49 años | 1,132,443 | 497,572 | - | - | 1,630,015 | - | 503,804 | 332,057 | 521 | 836,382 | 8.1 | 8.1 | - | - | 8.1 | - | 7.7 | 7.5 | 4.6 | 7.6 |
| 50 a 54 años | 823,334 | 398,949 | - | - | 1,222,283 | - | 420,129 | 279,108 | 961 | 700,198 | 5.9 | 6.5 | - | - | 6.1 | - | 6.5 | 6.3 | 8.6 | 6.4 |
| 55 a 59 años | 614,962 | 366,633 | - | 3,993 | 985,588 | - | 238,082 | 203,660 | 1,516 | 443,258 | 4.4 | 6.0 | - | 42.6 | 4.9 | - | 3.7 | 4.6 | 13.5 | 4.0 |
| 60 a 64 años | 461,982 | 357,893 | - | - | 819,875 | - | 217,677 | 173,255 | - | 390,932 | 3.3 | 5.8 | - | - | 4.1 | - | 3.3 | 3.9 | - | 3.6 |
| 65 a 69 años | 258,014 | 324,862 | - | - | 582,876 | - | 141,552 | 105,596 | - | 247,148 | 1.8 | 5.3 | - | - | 2.9 | - | 2.2 | 2.4 | - | 2.3 |
| 70 a 74 años | 190,129 | 272,071 | 763 | - | 462,963 | - | 77,416 | 77,568 | - | 154,984 | 1.4 | 4.4 | 100.0 | - | 2.3 | - | 1.2 | 1.8 | - | 1.4 |
| 75 a 79 años | 81,510 | 180,023 | - | - | 261,533 | - | 39,062 | 42,276 | - | 81,338 | 0.6 | 2.9 | - | - | 1.3 | - | 0.6 | 1.0 | - | 0.7 |
| 80 y más | 77,733 | 212,809 | - | 1,501 | 292,043 | - | 65,209 | 85,041 | 1,110 | 151,360 | 0.6 | 3.5 | - | 16.0 | 1.5 | - | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 1.4 |
| Total | 13,967,230 | 6,159,816 | 763 | 9,369 | 20,137,178 | 168 | 6,512,165 | 4,426,061 | 11,213 | 10,949,607 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 20 años o más que sufrió daño a su salud por algún accidente en el último año**

| Accidentes | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 330,526 | 5.5 |
| No | 5,626,144 | 94.5 |
| Total | 5,956,670 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 20 años o más que sufrió daño a su salud por algún accidente en el último año, por grupo de edad y sexo**

| Grrupos quinquenales | Absolutos | | | | | | Proporciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | HOMBRE | | | MUJER | | |
| | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total | Sí | No | Total |
| 20 a 24 años | 11,321 | 349,815 | 361,136 | 32,343 | 379,944 | 412,287 | 6.30 | 13.37 | 12.91 | 21.43 | 12.62 | 13.05 |
| 25 a 29 años | 32,386 | 324,769 | 357,155 | 6,095 | 363,554 | 369,649 | 18.03 | 12.41 | 12.77 | 4.04 | 12.08 | 11.70 |
| 30 a 34 años | 18,481 | 319,077 | 337,558 | 5,806 | 430,390 | 436,196 | 10.29 | 12.19 | 12.07 | 3.85 | 14.30 | 13.80 |
| 35 a 39 años | 46,284 | 265,799 | 312,083 | 10,284 | 295,334 | 305,618 | 25.77 | 10.16 | 11.16 | 6.82 | 9.81 | 9.67 |
| 40 a 44 años | 28,399 | 194,262 | 222,661 | 15,343 | 279,230 | 294,573 | 15.81 | 7.42 | 7.96 | 10.17 | 9.28 | 9.32 |
| 45 a 49 años | 9,291 | 291,591 | 300,882 | 14,341 | 236,702 | 251,043 | 5.17 | 11.14 | 10.76 | 9.50 | 7.87 | 7.94 |
| 50 a 54 años | 12,287 | 237,875 | 250,162 | 9,502 | 261,272 | 270,774 | 6.84 | 9.09 | 8.95 | 6.30 | 8.68 | 8.57 |
| 55 a 59 años | 2,902 | 225,701 | 228,603 | 18,863 | 160,002 | 178,865 | 1.62 | 8.63 | 8.18 | 12.50 | 5.32 | 5.66 |
| 60 a 64 años | 5,804 | 106,300 | 112,104 | 12,481 | 103,728 | 116,209 | 3.23 | 4.06 | 4.01 | 8.27 | 3.45 | 3.68 |
| 65 a 69 años | - | 114,883 | 114,883 | 10,158 | 161,188 | 171,346 | - | 4.39 | 4.11 | 6.73 | 5.36 | 5.42 |
| 70 a 74 años | - | 75,386 | 75,386 | 8,706 | 140,772 | 149,478 | - | 2.88 | 2.70 | 5.77 | 4.68 | 4.73 |
| 75 a 79 años | 7,255 | 52,462 | 59,717 | - | 101,877 | 101,877 | 4.04 | 2.00 | 2.14 | - | 3.39 | 3.22 |
| 80 y más | 5,226 | 58,728 | 63,954 | 6,968 | 95,503 | 102,471 | 2.91 | 2.24 | 2.29 | 4.62 | 3.17 | 3.24 |
| Total | 179,636 | 2,616,648 | 2,796,284 | 150,890 | 3,009,496 | 3,160,386 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 20 años o más que sufrió daño a su salud por algún accidente en el último año**

| Accidentes | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 348,411 | 7.1 |
| No | 4,541,073 | 92.8 |
| No responde | 6,131 | .1 |
| Total | 4,895,615 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Distrito Federal. Distribución porcentual de la población de 20 años o más que sufrió daño a su salud por algún accidente en el último año, por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | Proporciones | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | MUJER | | | |
| | Si | No | Total | Si | No | responde | Total | Si | No | Total | Si | No | responde | Total |
| 20 a 24 años | 44,155 | 332,696 | 376,851 | 22,989 | 452,358 | 6,131 | 481,478 | 26.4 | 16.7 | 17.5 | 12.7 | 17.7 | 100.0 | 17.6 |
| 25 a 29 años | 9,713 | 339,601 | 349,314 | 15,917 | 396,557 | - | 412,474 | 5.8 | 17.1 | 16.2 | 8.8 | 15.5 | 0.0 | 15.1 |
| 30 a 34 años | 29,450 | 269,536 | 298,986 | 26,014 | 341,682 | - | 367,696 | 17.6 | 13.6 | 13.9 | 14.4 | 13.4 | 0.0 | 13.4 |
| 35 a 39 años | 36,312 | 206,110 | 242,422 | 19,509 | 317,039 | - | 336,548 | 21.7 | 10.4 | 11.2 | 10.8 | 12.4 | 0.0 | 12.3 |
| 40 a 44 años | 16,737 | 203,191 | 219,928 | 23,040 | 234,629 | - | 257,669 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 12.7 | 9.2 | 0.0 | 9.4 |
| 45 a 49 años | - | 161,961 | 161,961 | 24,190 | 191,437 | - | 215,627 | 0.0 | 8.1 | 7.5 | 13.4 | 7.5 | 0.0 | 7.9 |
| 50 a 54 años | 20,123 | 127,051 | 147,174 | 16,612 | 157,146 | - | 173,758 | 12.0 | 6.4 | 6.8 | 9.2 | 6.2 | 0.0 | 6.3 |
| 55 a 59 años | 2,616 | 96,070 | 98,686 | 9,569 | 116,595 | - | 126,164 | 1.6 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 0.0 | 4.6 |
| 60 a 64 años | 2,198 | 84,183 | 86,381 | 5,600 | 101,442 | - | 107,042 | 1.3 | 4.2 | 4.0 | 3.1 | 4.0 | 0.0 | 3.9 |
| 65 a 69 años | 2,438 | 59,479 | 61,917 | 4,499 | 88,091 | - | 92,590 | 1.5 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 3.4 |
| 70 a 74 años | - | 51,105 | 51,105 | 8,349 | 61,324 | - | 69,673 | 0.0 | 2.6 | 2.4 | 4.6 | 2.4 | 0.0 | 2.5 |
| 75 a 79 años | - | 29,382 | 29,382 | 643 | 41,780 | - | 42,423 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 1.5 |
| 80 y más | 3,605 | 28,052 | 31,657 | 4,133 | 52,576 | - | 56,709 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| Total | 167,347 | 1,988,417 | 2,155,764 | 181,064 | 2,552,656 | 6,131 | 2,739,851 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 20 años o más que sufrió daño a su salud por algún accidente en el último año**

| Accidentes | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 3,107,793 | 5.2 |
| No | 56,749,681 | 94.7 |
| No responde | 42,306 | .1 |
| No sabe | 22,474 | .0 |
| Total | 59,922,254 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 20 años o más que sufrió daño a su salud por algún accidente en el último año, por grupo de edad y sexo**

| Grrupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | | MUJER | | | | | HOMBRE | | | | | MUJER | | | | |
| | Sí | No | No responde | No sabe | Total | Sí | No | No responde | No sabe | Total | Sí | No | responde | No sabe | Total | Sí | No | responde | No sabe | Total |
| 20 a 24 años | 328,583 | 3,476,475 | 12,007 | 0 | 3,817,065 | 168,841 | 4,195,769 | 5,345 | 0 | 4,369,955 | 18.3 | 13.7 | 49.3 | 0.0 | 14.1 | 12.9 | 13.3 | 29.8 | 0.0 | 13.3 |
| 25 a 29 años | 249,218 | 3,078,298 | 312 | 0 | 3,327,828 | 116,915 | 3,900,867 | 1,235 | 0 | 4,019,017 | 13.8 | 12.2 | 1.3 | 0.0 | 12.3 | 8.9 | 12.4 | 6.9 | 0.0 | 12.3 |
| 30 a 34 años | 194,802 | 3,076,673 | 1,776 | 1,324 | 3,274,575 | 130,297 | 3,946,491 | 2,676 | 3,138 | 4,082,602 | 10.8 | 12.2 | 7.3 | 15.4 | 12.1 | 10.0 | 12.5 | 14.9 | 22.6 | 12.4 |
| 35 a 39 años | 217,763 | 2,825,065 | 0 | 0 | 3,042,828 | 126,191 | 3,971,104 | 2,957 | 1,146 | 4,101,398 | 12.1 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 9.6 | 12.6 | 16.5 | 8.3 | 12.5 |
| 40 a 44 años | 173,377 | 2,636,817 | 2,056 | 1,028 | 2,813,278 | 122,393 | 3,490,195 | 2,043 | 0 | 3,614,631 | 9.6 | 10.4 | 8.4 | 12.0 | 10.4 | 9.4 | 11.1 | 11.4 | 0.0 | 11.0 |
| 45 a 49 años | 128,055 | 2,364,509 | 1,386 | 1,180 | 2,495,130 | 99,923 | 2,731,468 | 0 | 3,121 | 2,834,512 | 7.1 | 9.3 | 5.7 | 13.7 | 9.2 | 7.6 | 8.7 | 0.0 | 22.5 | 8.6 |
| 50 a 54 años | 105,011 | 1,987,765 | 0 | 2,379 | 2,095,155 | 97,890 | 2,314,727 | 1,256 | 0 | 2,413,873 | 5.8 | 7.9 | 0.0 | 27.7 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 0.0 | 7.4 |
| 55 a 59 años | 138,869 | 1,588,216 | 3,268 | 624 | 1,730,977 | 95,558 | 1,712,532 | 0 | 0 | 1,808,090 | 7.7 | 6.3 | 13.4 | 7.3 | 6.4 | 7.3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 60 a 64 años | 82,791 | 1,264,117 | 3,561 | 750 | 1,351,219 | 82,925 | 1,540,485 | 0 | 736 | 1,624,146 | 4.6 | 5.0 | 14.6 | 8.7 | 5.0 | 6.3 | 4.9 | 0.0 | 5.3 | 5.0 |
| 65 a 69 años | 33,516 | 1,066,409 | 0 | 0 | 1,099,925 | 66,150 | 1,190,348 | 0 | 784 | 1,257,282 | 1.9 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 5.1 | 3.8 | 0.0 | 5.6 | 3.8 |
| 70 a 74 años | 65,841 | 837,709 | 0 | 1,299 | 904,849 | 57,806 | 922,230 | 1,312 | 0 | 981,348 | 3.7 | 3.3 | 0.0 | 15.1 | 3.3 | 4.4 | 2.9 | 7.3 | 0.0 | 3.0 |
| 75 a 79 años | 37,118 | 541,133 | 0 | 0 | 578,251 | 40,807 | 726,313 | 741 | 4,965 | 772,826 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 4.1 | 35.7 | 2.4 |
| 80 y más | 44,954 | 550,322 | 0 | 0 | 595,276 | 102,199 | 813,644 | 375 | 0 | 916,218 | 2.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 7.8 | 2.6 | 2.1 | 0.0 | 2.8 |
| Total | 1,799,898 | 25,293,508 | 24,366 | 8,584 | 27,126,356 | 1,307,895 | 31,456,173 | 17,940 | 13,890 | 32,795,898 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSANUT 2006.

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 20 años o más que sufrió daño a su salud por algún accidente en el último año**

| Accidentes | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Si | 2,875,111 | 5.8 |
| No | 46,811,824 | 94.1 |
| No responde | 38,882 | .1 |
| Total | 49,725,817 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

**Nacional. Distribución porcentual de la población de 20 años o más que sufrió daño a su salud por algún accidente en el último año, por grupo de edad y sexo**

| Grupos quinquenales | Absolutos | | | | | | | | Proporciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOMBRE | | | | MUJER | | | | HOMBRE | | | | MUJER | | | |
| | Si | No | No responde | Total | Si | No | No responde | Total | Si | No | responde | Total | Si | No | responde | Total |
| 20 a 24 años | 384,803 | 4,004,457 | 3,934 | 4,393,194 | 137,956 | 4,926,828 | 7,642 | 5,072,426 | 21.7 | 18.5 | 18.4 | 18.8 | 12.6 | 19.5 | 43.7 | 19.3 |
| 25 a 29 años | 253,708 | 3,403,049 | - | 3,656,757 | 126,042 | 4,021,322 | 2,841 | 4,150,205 | 14.3 | 15.8 | - | 15.6 | 11.5 | 15.9 | 16.2 | 15.8 |
| 30 a 34 años | 201,966 | 2,956,146 | 3,378 | 3,161,490 | 109,993 | 3,475,768 | 1,353 | 3,587,114 | 11.4 | 13.7 | 15.8 | 13.5 | 10.0 | 13.8 | 7.7 | 13.6 |
| 35 a 39 años | 239,969 | 2,567,260 | 798 | 2,808,027 | 135,259 | 3,044,258 | 1,429 | 3,180,946 | 13.5 | 11.9 | 3.7 | 12.0 | 12.3 | 12.1 | 8.2 | 12.1 |
| 40 a 44 años | 186,890 | 1,980,583 | 11,025 | 2,178,498 | 77,287 | 2,294,031 | 1,912 | 2,373,230 | 10.5 | 9.2 | 51.6 | 9.3 | 7.0 | 9.1 | 10.9 | 9.0 |
| 45 a 49 años | 116,366 | 1,662,475 | - | 1,778,841 | 93,562 | 1,848,760 | - | 1,942,322 | 6.6 | 7.7 | - | 7.6 | 8.5 | 7.3 | - | 7.4 |
| 50 a 54 años | 118,069 | 1,329,041 | - | 1,447,110 | 92,836 | 1,457,403 | - | 1,550,239 | 6.6 | 6.2 | - | 6.2 | 8.4 | 5.8 | - | 5.9 |
| 55 a 59 años | 51,126 | 1,059,183 | - | 1,110,309 | 74,800 | 1,122,442 | - | 1,197,242 | 2.9 | 4.9 | - | 4.7 | 6.8 | 4.5 | - | 4.5 |
| 60 a 64 años | 79,637 | 869,437 | 1,119 | 950,193 | 62,583 | 989,933 | 101 | 1,052,617 | 4.5 | 4.0 | 5.2 | 4.1 | 5.7 | 3.9 | 0.6 | 4.0 |
| 65 a 69 años | 59,880 | 631,558 | 1,056 | 692,494 | 53,016 | 736,131 | - | 789,147 | 3.4 | 2.9 | 4.9 | 3.0 | 4.8 | 2.9 | - | 3.0 |
| 70 a 74 años | 29,740 | 506,282 | - | 536,022 | 60,844 | 519,920 | - | 580,764 | 1.7 | 2.3 | - | 2.3 | 5.5 | 2.1 | - | 2.2 |
| 75 a 79 años | 22,085 | 304,253 | - | 326,338 | 21,414 | 337,716 | 50 | 359,180 | 1.2 | 1.4 | - | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 1.4 |
| 80 y más | 31,794 | 322,924 | 72 | 354,790 | 53,486 | 440,664 | 2,172 | 496,322 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4.9 | 1.7 | 12.4 | 1.9 |
| Total | 1,776,033 | 21,596,648 | 21,382 | 23,394,063 | 1,099,078 | 25,215,176 | 17,500 | 26,331,754 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con base en SSA.ENSA 2000.

## 2006

*Aspectos relevantes:*

i. **La proporción de adultos mayores de 20 años que más buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos durante los últimos doce meses, según el tipo de servicio, fueron en primer lugar, para prueba de Papanicolaou con un 38.1% y el servicio al que menos asistieron fue: detección de cáncer de próstata con 6.3%**

ii. **El porcentaje de mujeres que más buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos fueron las de los grupos quinquenales entre 20 y 24 y 35 y 39 años con un 13% y 13.8% respectivamente.**

iii. **En relación a los que asisten a los servicios preventivos para detección de diabetes son hombres quienes asisten más tempranamente, en comparación a las mujeres; el porcentaje de hombres que acude es de 46.4% sobre el 43% de las mujeres, sin embargo, el porcentaje de mujeres se eleva considerablemente en el grupo quinquenal de mujeres entre 50 y 54 años. Lo mismo ocurre en el caso de la diabetes, los hombres asisten más a los servicios preventivos después de los 20 y antes de los 49; el porcentaje es 54.3% superior al 50.8% de las mujeres**

iv. **De manera general los hombres empiezan a buscar atención médica en los servicios preventivos por cáncer de próstata después de los 40 años; de 20 a 29% no se registra ningún porcentaje, entre 30 y 34 se indica un porcentaje de 8.7%.**

v. **Los problemas de salud entre la población de adultos menores de 20 años que indicaron tener en las dos últimas semanas previas a la encuesta, son: en primer lugar; infecciones respiratorias con un 31,5%, en segundo; tos, catarro y dolor de garganta, en tercer lugar; lesiones físicas por accidentes, seguido de hipertensión arterial.**

vi. **La enfermedad crónica qué tiene un mayor porcentaje de haber sido diagnosticada, por un médico fue la hipertensión (presión alta) con 4.8%.**

vii. **Sólo el 12. 8% de los adultos fue diagnosticado de obesidad por un médico, aunque si lo comparamos con el porcentaje nacional de 8.8%, tendríamos que decir que el Distrito Federal está por arriba en 4 puntos porcentuales de los diagnosticados a nivel nacional**

viii. **Sobre la manifestación de problemas en depresión, el nivel de incidencia aumenta en el distrito federal, con respecto al promedio nacional.**

ix. **Otro de las enfermedades en las que el distrito federal está por arriba del porcentaje nacional es la diabetes mellitus con 1.9 puntos porcentuales. Además de 2000 a 2006 el porcentaje de adultos que manifestó sufrir o haber sufrido este padecimiento aumentó**

x. **El 5.5% de los adultos en el Distrito federal ha sufrido daño a su salud por algún accidente en el último año (previo a la encuesta)**

## Comparativos:

i. **Entre 2000 y 2006, la proporción de adultos mayores de 20 años que buscó o recibió atención en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, según tipo de servicio, aumentó en todos los rubros; donde se hace más notorio el incremento es en diabetes e hipertensión. En el año 2000 el porcentaje que recibió atención por hipertensión fue de 17.9%, en 2006, creció hasta llegar a 25.6% y en diabetes de 13.9% se elevó a 25.2%.**

ii. **Haciendo un comparativo a nivel nacional, en el 2006, el Distrito Federal estaba por arriba 5.1% de los que manifestaron algún problema de salud en las dos últimas semanas previas a la encuesta. A nivel nacional el porcentaje es de 12.9% mientras que en el Distrito Federal es de 18%**

iii. **Ha habido un aumento en el Distrito Federal de 2.7% entre 2000 y 2006 de adultos que le manifestaron a un médico u otro personal de salud haber sufrido enfermedades del riñón como infección en vías urinarias. A nivel nacional en 2006 el porcentaje del Distrito Federal es mayor, 15.4% contra 13.6%.**

iv. **Aumento, en términos de los adultos que manifestaron tener el colesterol alto; en 2000 el porcentaje fue de 9.6% en 2006 aumentó 2.2% quedando en 11.8%**

v. **En 2006 .el Distrito federal se encontraba por arriba del porcentaje nacional en relación a los adultos que manifestaron tener problemas de colesterol, el porcentaje nacional es de 8,6% contra el 11.8% en el Distrito Federal y lo mismo sucede en el caso de los que manifestaron sufrir o haber sufrido depresión a nivel nacional el porcentaje es de 10.7% mientras que en distrito federal es mayor con un 12.9%.**

*Aspectos relevantes*

vi. **En 2006, en la Ciudad, el 12.9% de adultos alguna vez le ha dicho a un médico u otro personal de salud que sufre o ha sufrido depresión, en comparación con el porcentaje nacional de 10.7%**

vii. **Los niveles porcentuales en adultos que manifestaron depresión en relación al género varían por grupo quinquenal, así, entre el grupo de los hombres, es en los de 45 a 49 años dónde se localizan los mayores porcentajes; en las mujeres las proporciones mayores se distribuyen en varios grupos quinquenales correspondientes a los años de juventud y hasta adultez; desde 20 hasta los 39 años.**

viii. **En el año 2000 las mujeres adultas cuyo último hijo nació vivo cinco años, recibieron atención principalmente en el IMSS (36.6%), seguido de la SSA (27.2%), en tercer lugar está el consultorio privado con 27%, en 2006 el IMSS disminuyó su atención 2.5 puntos porcentuales, la SSA aumentó su atención en 5.6%, los consultorios privados o particulares disminuyeron su atención en 3.4%.**

ix. **Comparando 2000 y 2006, en el Distrito Federal, el tabaquismo en los adultos, disminuyó porcentualmente de 43,4% a 40.9%, también a la baja están los que nunca han fumado, mientras que en 2000 era el 27% en 2006, aumentó más de 30 puntos porcentuales, quedando en 57.4%.**

x. **En el Distrito Federal la incidencia de tabaquismo, independientemente del género, se da más en las etapas de vida joven y adulta, disminuye porcentualmente después de los 49 años.**

*Aspectos relevantes*

**xi. El consumo de alcohol en los habitantes del Distrito Federal disminuyó sustancialmente de 2000 a 2006 de 65.4% a 38.6%, sin embargo, haciendo un comparativo con el porcentaje nacional, el Distrito Federal se encuentra 4. 5 puntos porcentuales por arriba.**

**xii. Del 2000 al 2006 en el Distrito Federal disminuyó el porcentaje de población que sufrió daño a su salud por algún accidente, en el último año, de 7.1% a 5.5%**

**xiii. En 2000, el grupo quinquenal de 20 a 24 años, era el que registraba mayor porcentaje en relación a daños a la salud por accidente, está situación cambió en 2006, disminuyó más de 20 puntos porcentuales.**

**xiv. La variación entre los puntos porcentuales a nivel nacional con respecto al Distrito Federal es muy pequeña (0.3%) en relación a daños a la salud por accidente en el último año**